



WEENER/EMS

Übersichtskarte
von
Nordwest-Deutschland
mit den
wichtigsten Verkehrslinien







Picea Breweriana Watson

Mutterpflanze in meiner Baumschule. Aufgenommen Mai 1926.

Beschreibung siehe Seite 240.

Herbst 1926 — Frühjahr 1927

Haupt- Preis- und Sortenliste über winterharte Freilandpflanzen

aller Art von

HERM. A. HESSE

Baumschulen

Ostfriesland **WEENER/EMS** Prov. Hannover

Bankverbindungen: Ostfriesische Bank — Zweigstelle der Osnabrücker
Bank in Weener/Ems — Spar- und Leihkasse, Weener/Ems, Neue Straße 26
Telegr.-Adr.: Hesse Baumschulen Weener — Postscheckkonto: Hannover 1342

Fernsprecher 17 — Gegründet 1879

*

Deutscher, englischer und
französischer Schriftverkehr

*

Mitglied des Bundes

Deutscher Baumschulenbesitzer, der Deutschen
Dendrologischen Gesellschaft, des Bundes
Deutscher Staudenzüchter und zahl-
reicher weiterer Fachverbände

*

Zur gefälligen Beachtung:

Weener/Ems ist deutsche Grenzstation, an der Eisenbahnlinie Oldenburg i. O. nach Neuschanz (Holland) gelegen, also an der großen Strecke Hamburg-Amsterdam und mit allen Zügen gut zu erreichen. Von Bremen 2½ Stunden Fahrzeit. Die Vielseitigkeit meiner Kulturen machen einen Besuch jederzeit durchaus lohnend. Jeder Interessent ist mir — nach Möglichkeit an Wochentagen zur üblichen Arbeitszeit — stets freundlichst willkommen. Vorherige Anmeldung jedoch erwünscht und ratsam.

An meine sehr verehrten Kunden!

Nachdem mein letztjähriger Katalog in der gesamten Fachwelt so freudige Aufnahme gefunden hat, eine Folge seiner sachgemässen und reichhaltigen Ausarbeitung, wird der aufmerksame Leser bemerken, dass bereits wieder wesentliche Verbesserungen und Erweiterungen des Inhalts vorgenommen sind, die den vorliegenden Jahrgang ganz besonders wertvoll gestalten. Auch dies neue Verzeichnis enthält jedoch bei weitem nicht alle Sorten, die hier in meinen bekannt umfangreichen Sortimenten enthalten sind, sondern lediglich diejenigen, welche in grösseren Mengen bereits wieder verkaufsfertig vorrätig sind.

Infolge ihrer Reichhaltigkeit hatten meine Kataloge der Vorkriegszeit in Fachkreisen weit über Deutschlands Grenzen hinaus eine gewisse Popularität erlangt, und es ist mein ganz besonderes Bestreben, auch heute wieder durch gewissenhafte, persönliche Bearbeitung, Prüfung und Sichtung all der grossen Sortimente, stets das Beste an Pflanzenmaterial anzubieten und meinen Katalog durch peinliche, wissenschaftliche Ausarbeitung immer mehr zu einem willkommenen Nachschlagewerk besonderer Art für jeden Berufskollegen wie auch für jeden Gartenbesitzer und Pflanzenfreund zu gestalten.

Selbstverständlich bin ich auch gerne bereit, jede gewünschte Auskunft zu erteilen, und mache auf die Fussnotiz der ersten Seite in bezug auf den Besuch meiner Baumschulen nochmals besonders aufmerksam.

Infolge der Vielseitigkeit meiner ausgedehnten Kulturen und besonders durch die Verschiedenheit meiner Kulturböden — ca. 80 ha Sand-, Lehm- und Moorboden — bringe ich durchaus einwandfreies Pflanzenmaterial mit tadelloser Bewurzelung zum Verkauf, und mein langjährig geschultes Personal verbürgt sorgfältigste Verpackung, so dass, wie alljährlich zahlreiche, freiwillige Dankschreiben beweisen, selbst auf weiteste Entfernungen die Pflanzen tadellos reisen und bei sachgemässer Weiterbehandlung auch sicher anwachsen.

Wenn ich in diesem Jahre meinen Katalog wiederum kostenlos zum Versand bringe, so tue ich es, um all den herrlichen Florenkindern immer mehr Eingang in unsere Gärten zu verschaffen, was mit dazu beitragen möge, dass die Liebe zur Natur und zur engeren Heimat in steigendem Masse Allgemeingut werde.

Ich danke für das mir seither entgegengebrachte Vertrauen und werde stets bemüht bleiben, meine sehr verehrte Kundschaft in jeder Weise zu befriedigen. Mit der höflichen Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne ich

mit vorzüglicher Hochachtung

Herm. A. Hesse
Baumschulen, Weener/Ems.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Obstwildlinge	4
Obstsortiment	5—21
Diverse Fruchtarten	21
Junge Koniferen	22—26
Junge Laubhölzer	27—48
Hecken- und Lauben-Gehölze	48—53
Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen	54—138
Ziersträucher-Sortimente	54
Baumartige Gehölze-Sortiment	54
Felsenpflanzen-Gehölze, Zusammenstellung	139
Zierfrucht-Gehölze, Zusammenstellung	139—140
Herbstfärbungs-Gehölze, Zusammenstellung	140
Immergrüne Gehölze, Zusammenstellung	140—141
Schatten-Gehölze, Zusammenstellung	141—142
Vogelschutz-Gehölze, Zusammenstellung	142
Bienen-Nährgehölze, Zusammenstellung	143
Rauchharte Gehölze für Industrie-Anlagen, Zusammenstellung	143—144
Trauerbäume	144—146
Schlingpflanzen	146—151
Stauden	152—208
Farne	208—211
Ziergräser	211
Treib-Stauden, Zusammenstellung	212
Rasenersatz- und Polster-Stauden, Zusammenstellung	212—213
Plattenweg-Stauden, Zusammenstellung	213
Schatten-Stauden, Zusammenstellung	214
Rosen, Busch- und Hochstamm	215—232
Koniferen, Nadelhölzer, Ballenpflanzen	233—249
Rauchharte Nadelhölzer, Zusammenstellung	249
Frachttarif	251—252
Bücherliste	vorletzte Umschlagseite

Obstwildlinge.

Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.

Wüchsige Ware aus dem Freiland mit bester Faserbewurzelung.

		100 Stück M. Pf.	1000 Stück M. Pf.
Castanea vesca, Edelkastanie	ca. 15—30 cm hohe, 1jährige	6.—	40.—
	» 30—60 » » 2 »	8.—	70.—
Cerasus, siehe unter Prunus.			
Juglans regia, Walnuss	bis 40 cm hohe, 1jährige	8.—	70.—
	ca. 50—100 » » 2 »	10.—	90.—
Pirus communis, Birne	ca. 5—7 mm, verpflanzte 2jährige	4.—	35.—
	» 7—12 » » 2 »	7.—	60.—
» Malus, Apfel	ca. 5—7 mm, verpflanzte 2jährige	3.—	25.—
	» 7—10 » » 2 »	4.—	35.—
Prunus avium, echte, rotfleischige Vogelkirsche mit weisser Rinde	ca. 3—5 mm, 1jährige	1.50	12.—
	» 5—6 » 1 »	3.—	25.—
	» 6—10 » 1 »	4.—	30.—
	ca. 5—7 mm, verpflanzte 2 »	3.50	30.—
	» 7—12 » » 2 »	4.—	35.—
» Myrobalana	ca. 3—5 mm, 1jährige	2.—	—
	» 7—12 » 1 »	4.—	—
	ca. 7—10 mm, verpflanzte 2 »	5.—	40.—
» spinosa, Schlehe, besonders für Hecken geeignet	ca. 40—70 cm hohe, 1jährige	2.—	15.—
	ca. 80—120 cm hohe, verpflanzte 3 »	2.—	18.—
	10000 Stück M. 150.—		
» St. Julien	ca. 3—5 mm, 1jährige	1.50	12.—
	» 5—8 » 1 »	3.—	25.—
	ca. 5—7 mm, verpflanzte 2 »	2.50	20.—
	» 7—12 » » 2 »	4.—	30.—
Ribes aureum	2jährig verpflanzte Abrisse ca. 70—100 cm hoch	7.—	60.—
Rosa, zu Unterlagen, siehe Seite 43.			

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Qualität vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.
Bei Mengen unter 50 Stück erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Obstsortiment.

Äpfel.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—8 cm Umfang
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—, 100 St. M. 225.—

Mit guten Kronen, 8—9 cm Umfang
pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.—

Mittelstämme (Stammhöhe 140—180 cm):

Mit guten Kronen, 7—8 cm Umfang
pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

Mit guten Kronen, 8—9 cm Umfang
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—

Pyramiden, verpflanzte, auf Doucin:

Mit zwei Astserien
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—

Mit drei Astserien
pro St. M. 4.—, 10 » » 38.—

Buschobst auf Doucin:

2—3jährig pro St. M. 1.50, 10 » » 12.—, 100 » » 100.—

3—4 » » » 1.75, 10 » » 15.—, 100 » » 125.—

4—5 » » » 2.—, 10 » » 16.—, 100 » » 140.—

Buschobst, auf Paradies:

2—3jährig pro St. M. 1.50, 10 » » 12.—

3—4 » » » 1.75, 10 » » 15.—

Spaliere auf Doucin:

Palmetten mit zwei Etagen
pro St. M. 2.75, 10 St. M. 25.—, 100 » » 240.—

Palmetten mit drei Etagen
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—, 100 » » 260.—

Palmetten mit vier Etagen
pro St. M. 3 50

U-Form, auf Doucin, kräftige Ware
pro St. M. 2.75, 10 St. M. 25.—, 100 » » 240.—

Cordons (Schnurbäumchen), auf Doucin:

Senkrechte, 2—3jährige
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—, 100 » » 100.—

Einarmige, wagerechte, kräftige Ware
pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 » » 150.—

Zweiarmige, wagerechte, kräftige Ware
pro St. M. 2.50, 10 St. M. 20.—, 100 » » 180.—

Apfel (Fortsetzung):

Die Buchstaben H., P., B., S., U., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Büsche, Spaliere, U-Formen, Cordons** auf Wildling oder Doucin abgebar sind.

B.	Alantapfel (grosser, edler Prinzessin-Apfel), hochfeiner Taubenapfel, auf der Sonnenseite leicht gerötet. Fleisch gelblich, ziemlich saftreich, von delikatem Geschmack. Ende Okt.—Febr.
B. S. U. C.	Alexander (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schauf Frucht. Baum reichtragend. Sept.—Dez.
H. P. B. S. U. C.	Apfel aus Croncels , einfarbiger, gelber, wohlschmeckender Apfel, vornehm in Form und Farbe; gute Marktsorte. Ende Aug.—Okt.
B.	Arreskow (Grafensteinerkind), Frucht gross, gelb mit roten Streifen. Feiner Herbstapfel. Sept.—Okt.
H. C.	Astrachan , weisser, mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.
B. S.	Bellefleur , gelber, vortrefflicher Winterapfel. Nov.—April.
H. P. B. S. U. C.	Bismarck , grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—März.
H. B. S.	Bohnapfel , grosser, ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.
H. P. B. S. U. C.	Bolken , ausgezeichnet, grosser, grüner Gulderling, weissfleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.
B.	Borsdorfer, Doberaner , hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht.
H. B. S. U. C.	Calvill, Aderslebener , hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. Nov.—Jan.
H. P. B. S. U. C.	» Ostfriesischer , mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echtem Calvillengeschmack. Okt.—Jan.
B. C.	» roter Herbst -, grosser, dunkelroter Herbstapfel. Okt.—Nov.
B.	» Uelzener , wertvolle Sorte. Fleisch fest, weiss, sehr wohlschmeckend, dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Jan.—April.
H. B.	Cardinal , geflammt, sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt.—Febr.
H. B. S. U. C.	Cellini , sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirtschafts- und Marktf Frucht. Sept.—Nov.
H. B. S. U. C.	Charlamowsky (Borowitzky), grosser, säuerlicher Rosenapfel. Eine der besten, frühreifenden Handelssorten. Aug.—Sept.
H.	Codlin, Keswick , grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.
H. B. S. C.	» Manks , sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.
H.	Eiserapfel, roter (Paradies-) , bekannter, haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte. Dez.—Sommer.
H. P. B. S. U. C.	Fiessers Erstling , sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr frühtragend. Nov.—Febr.
B.	Früher Victoria , mittelgrosse und rosa gefärbte Frucht; sehr früh- und reichtragende Sorte.
H. B.	Fürstenapfel , grüner, mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Febr.—Sommer.
H. B. S.	Gelber Richard , sehr grosser, schöner, edler und ansehnlicher Apfel. Baum dankbar tragend. Okt.—Jan.
H. P. B. S. U. C.	Grahams Jubiläumsapfel , sehr frühtragende, ertragreiche, wertvolle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischem Geschmack. Okt.—Jan.

Äpfel (Fortsetzung):

- H.P.B.S.U.C.* **Gravensteiner**, Frucht I. Ranges, sehr schön und gross, Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt.—Dez.
- H.P.B.S.U.C.* **Groninger Krone**, grosser bis sehr grosser, hochfeiner Tafelapfel von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum wächst stark, bildet pyramidale Kronen und bleibt überall gesund. März—April.
- H.P.B.S.U.C.* **Grossherzog Friedrich von Baden**, grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Sept.—Okt.
- H.P.B.S.U.C.* **Hawthornden**, sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich. Okt.—Nov.
- H.B.S.* **Herbstapfel, Cludius**, mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend. Sept.—Nov.
- B.* **Himbeerapfel von Holovous**, Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack.
- H.P.B.C.* **Jakob Lebel**, guter Winterapfel, starkwachsend. Okt.—Dez.
- H.B.S.* **Kantapfel, Danziger**, vorzüglicher, dunkelroter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Okt.—Jan.
- B.* **Königinapfel**, auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack. Okt.—Nov.
- B.* **Königin Louise von Dänemark**, mittelgrosse, feine und hübsche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und dankbar tragend.
- B.S.* **Kurzstiel, königlicher**, mittelgrosse, edle, plattrunde Goldrenette. Dez.—April.
- H.B.S.C.* **Leven-alma**, Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Äpfel. Baum stark wachsend. Herbst bis Winter.
- B.S.* **Lord Suffield**, sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Anf. Sept.—Okt.
- B.* **Odenwälder**, mittelgrosser Apfel mit leicht rötlichem Anflug. Fleisch weiss und locker von angenehmer Säure. Baum fruchtbar. Reifezeit Winter.
- H.B.S.C.* **Ontario**, grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichem Geschmack. Dez.—April.
- H.P.B.S.U.C.* **Pärmäne, Winter-Gold-**, grosser, sehr schöner, Winterapfel. Fleisch mattweiss, sehr fein, von edlem, gewürzhaftem, wenigem Zuckergeschmack. Okt.—Febr.
- B.* **Pepping, London**, grosser, calvillenartiger Gulderling. Dez.—April.
- H.B.C.* » **Parkers**, gute, haltbare, graue Renette. Dez.—April.
- H.P.B.S.U.C.* » **Ribston-**, mittelgross, eine der schönsten Goldrenetten. Okt.—Nov.
- B.S.U.C.* **Pfirsichroter Sommerapfel**, sehr schöner, früher Sommerapfel; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.—Sept.
- H.P.B.S.U.C.* **Prinzenapfel**, grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblichweiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.—Nov.
- H.B.S.C.* **Renette, Baumanns**, mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan.—Mai.
- B.S.C.* » **Blenheimer Gold-**, grosse, schöne, edle Goldrenette. Nov.—April.
- B.S.C.* » **Canada (Pariser Rambour)**, eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
- H.P.B.S.C.* » **Coulon-**, sehr dauerhafter, grosser Winterapfel. Dez.—April.
- B.S.U.C.* » **Cox Orangen-**, einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
- H.B.* » **graue**, guter Wirtschaftsapfel. Dez.—Mai.
- H.B.S.C.* » **grosse Casseler**, grosse, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht, zum Massenanbau geeignet. Febr.—August.



Äpfel (Fortsetzung):

<i>H. B. S. C.</i>	Renette, Harberts , grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend. Dez.—Febr.
<i>H. P. B. S. U. C.</i>	» Landsberger , mittelgrosser, wohlschmeckender Tafelapfel. Nov.—Febr.
<i>B.</i>	» Muskat- , mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Renette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept.—Nov.
<i>H.</i>	» Oberdiek , mittelgrosser, schöner Tafelapfel. [Baum] starkwüchsig und reichtragend.
<i>H.</i>	» Osnabrücker , grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
<i>B. S. U. C.</i>	» Peasgoods Gold- , sehr gross und schön, I. Ranges. Anfang Nov.—Febr.
<i>H. B. S.</i>	» Zuccalmaglio , mittelgrosse, feine Tafelfrucht. Baum dankbar tragend. Nov.—März.
<i>H. B.</i>	Rosenapfel, Moringer , grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
<i>H.</i>	» neuer Berner , mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr.—April.
<i>B. C.</i>	» virginischer , mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner edler Rosenapfel. Sept.
<i>H. P. B. S.</i>	Ruhm von Winschoten , mittelgrosser, gelbgefärbter Süssapfel. Aug.—Sept.
<i>H. P. B. S. U. C.</i>	Schöner von Boskoop , sehr edle, gerötete, oft lederfarbige, grosse Rambour-Renette, mit festem, mildem Fleisch. I. Ranges. Baum reichtragend. Dez.—Mai.
<i>H.</i>	Schöner von Nordhausen , grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan.—Juni.
<i>B.</i>	Schwarzwälder , Frucht mittelgross, calvillartig gerippt, Sonnenseite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiss, zart, von angenehmem Geschmack.
<i>P. B. S. U. C.</i>	Signe Tillisch , grosser, flachgebauter, gelblichgrüner Apfel von feinem, weinsäuerlichem Geschmack. Okt.—Dez.
<i>P. B. S. C.</i>	Taubenapfel, Nathusius , grosse, schön gefärbte, wohlschmeckende Frucht. Nov.—März.
<i>H. B. S. C.</i>	» Schieblers , Fleisch sehr fein, weiss und wohlschmeckend. Okt.—Febr.
<i>H. P. B. S. U. C.</i>	Weisser Klarapfel , einer der allerbesten Frühäpfel, sehr früh- und reichtragend. Juli—Anfang August.

Praktisches Lehrbuch des Obstbaues

von Johannes Böttner

7. Auflage, mit 553 Abbildungen


Siehe vorletzte Umschlagseite.


Aprikosen.

1jährige Veredelungen (1j.), starke pro St. M. 2.50, 10 St. M. 20.--
 Büsche (B.), 2jährige » » » 3.—, 10 » » 28.--
 Spaliere (S.), niedrige, breitgezogene
 pro » » 4.—

- | | |
|----------|---|
| 1j. B.S. | Ambrosia, sehr gross, prachtvoll gefärbt, saftig und gewürzreich.
Juli—Anfang August. |
| 1j. B.S. | Frühe Moorpark, mittelgross, festes, gelbes, edles Fleisch. Juli bis
Anfang August. |
| 1j. B. | Frühe Grosse, sehr gross, eine der besten Sorten. Juli. |
| 1j. B.S. | Luizet, sehr gross, rund, saftreich von feinem Geschmack. Ende Juli. |
| 1j. | Re Umberto, enorme, ovale Frucht, Schale gelb, auf der Sonnenseite
rot. Juli. |
| 1j. B. | Ruhm von Dürrgoy, sehr winterharte Sorte. Frucht oval, ziemlich
gross, gelb und rot an der Basis. Anfang August. |
| 1j. | Triumph von Trier, ähnlich Pfirsich-Aprikose, jedoch früher reifend
als diese. |
| 1j. | von Breda, mittelgross, gelb, sonnenwärts schwach gerötet. Mitte
August. |
| 1j. B. | von Nancy, gross, orange-gelb, sonnenwärts rot punktiert, vorzüglich.
Ende Juli—Anfang August. |

Berberitzen, siehe „Verschiedene Fruchtarten“.

Birnen.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

- | | |
|---|--|
| Mit guten Kronen, 6—7 cm Umfang | |
| pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.— | |
| Mit guten Kronen, 7—8 cm Umfang | |
| pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—, 100 » » 225.— | |

Mittelstämme (Stammhöhe 140—180 cm):

- | | |
|--|--|
| Mit guten Kronen, 6—7 cm Umfang | |
| pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 » » 175.— | |
| Mit guten Kronen, 7—8 cm Umfang | |
| pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—, 100 » » 200.— | |

Halbstämme (Stammhöhe 100—140 cm):

- | | |
|---------------------------------|--|
| Mit guten Kronen, 6—7 cm Umfang | |
| pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.— | |

Pyramiden, verpflanzte, auf Wildling

- | | |
|--|--|
| Mit zwei Astserien, pro St. M. 3.50, 10 » » 32.— | |
|--|--|

Buschobst, verpflanzt, auf Quitte

- | | |
|--|--|
| 2—3jährig pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.— | |
|--|--|

» verpflanzt, auf Wildling

- | | |
|--|--|
| 2—3jährig pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—, 100 » » 125.— | |
| 3—4 » » » 2.50, 10 » » 20.—, 100 » » 175.— | |

Birnen (Fortsetzung):**Spaliere**, Palmetten auf Wildling mit 2 Etagen

pro St. M. 3.50, 10 St. M. 32.—, 100 St. M. 300.—

U-Form auf Quitte, kräftige Ware

pro St. M. 3.50, 10 St. M. 32.—

Cordons (Schnurbäumchen) auf Quitte**Senkrechte** 2—3jährige

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—, 100 » » 125.—

Einarmige, wagerechte, kräftige Ware

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 20.—

Zweiarmige, wagerechte, kräftige Ware

pro St. M. 3.—, 10 St. M. 25.—

Die Buchstaben *H., P., B., S., U., C.* vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Buschobst, Spaliere, U-Formen, Cordons** abgebar sind.

<i>H. B. S. C.</i>	Andenken an den Kongress , sehr grosse, bauchige, starkgewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend. Mitte Sept. bis Anfang Okt.
<i>H. B.</i>	Baronsbirne , grosse vorzügliche Kochbirne, welche sich beim Kochen schön rot färbt Jan.—April.
<i>H. B.</i>	Boscs Flaschenbirne , grosse, vortreffliche Tafel- und gute Marktf Frucht. Okt.—Mitte Nov.
<i>H. P. B.</i>	Butterbirne, Amanlis , grosse, grünlichgelbe Tafelfrucht, von gutem Geschmack. Sept.
<i>H.</i>	» Bacheliers , sehr grosse, hellgelbgrüne, dickbauchige, völlig schmelzende Birne von süss-säuerlichem Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
<i>H. B. S. U. C.</i>	» Beuckes , Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. Sept.
<i>H. B. C.</i>	» Blumenbachs , mittelgross, gelb, grau berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
<i>H. P. B. S.</i>	» Clairgeaus , grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafelfrucht, früh und reichtragend. Nov.—Dez.
<i>H. B. S.</i>	» Colomas Herbst- (Urbaniste), mittelgrosse, gelblichgrüne, delikate Herbstbirne. Okt.
<i>H. P. B. S. C.</i>	» Diels , alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov.—Dez.
<i>H. P. B. S. U. C.</i>	» Gellerts , grosse, sehr edle Tafel- und Marktf Frucht. Baum sehr fruchtbar. Eine der besten frühen Herbstbirnen. Sept.—Okt.
<i>H.</i>	» graue Herbst- , mittelgross, rostfarbig, sehr wohlschmeckend, regelmässig und gut tragend. Okt.
<i>H. P. B. S. C.</i>	» graue Sommer- (Jüttbirne), klein, ziemlich schmelzend, überfliegend von Saft und sehr angenehm zimtartig gewürzt. Aug.—Sept.
<i>H. P. B. S. U.</i>	» Liegels Winter- , mittelgross, eirund; Fleisch grünlich weiss, fein, schmelzend, sehr saftreich. Nov.
<i>H. B.</i>	» Napoleons- , mittelgrosse, grüngelbe Frucht; Fleisch fein schmelzend, delikat. Okt.—Nov.
<i>H. P. B. S. C.</i>	Christbirne, Williams , grosse, ansehnliche, stark müskierte, bekannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.

Birnen (Fortsetzung):

- H. P. B. S. C.** **Clapps Liebling**, grosse, sehr schöne und vortreffliche Sommerbirne. Baum reichtragend. Aug.—Sept.
- H. P. B. S. C.** **Comtesse de Paris**, gross, gelbgrün, schmelzend, trägt gut, selbst in rauen Lagen. Dez.—Jan.
- H.** **Dechantsbirne, Vereins-**, sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche, schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch. Okt. bis Ende Nov.
- H.** **Ender Kochbirne**, vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen schön rot färbt.
- H. B. S.** **Esperens Herrenbirne**, mittelgross, rauhschalig, gelbgrau berostet, sehr edel, fein müskierte, schmalzige Birne. Sept.—Okt.
- H.** **Forellenbirne**, runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne; Fleisch fein, schmelzend, saftreich, von sehr angenehm erhabenem Geschmack. Nov.—Dez.
- H. C.** **General Tottleben** (Apothekerbirne), sehr gross, dickbauchig; Fleisch fein, schmelzend, sehr saftreich. Baum sehr kräftig und fruchtbar.
- H.** **Grosser Katzenkopf**, eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter-Kochbirne. Dez.—Anfang Sommer.
- H. B. S. U. C.** **Grüne Sommer-Magdalene**, mittelgrosse Frucht, apfelgrün in zitronengelb übergehend. Fleisch schmelzend, etwas gewürzt, durch eine feine Säure gehoben.
- H.** **Gute Charlotte**, Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
- H. P. B. S. U. C.** **Gute Louise von Avranches**, mittelgross, länglich, gerötet. Bekannte, allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar. Okt.
- H. B.** **Hofratsbirne**, sehr grosse, grünlichgraue, grüngefleckte, dankbare, süss-säuerliche Langbirne. Okt.—Nov.
- H. B. S.** **Holländische Zuckerbirne**, etwas rundlicher wie „Köstliche von Charneau“, von wundervollem Geschmack und sehr feinem Aroma, Färbung wachsgelb, sehr stark wachsende Sorte, daher zur Zwischenveredlung empfohlen. Ende Aug.—Mitte Sept.
- H. B. S. U. C.** **Josephine von Mecheln**, klein bis mittelgross, gelbgrün, fein berostet, überflüssend von Saft, von ausgezeichnetem Gewürz. Jan.—März.
- H. B. S. C.** **Köstliche von Charneau**, grosse, langstielige, längliche, gelbe, grau punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
- H. P. B. S. U. C.** **Mad. Verté**, mittelgross, grau berostet; Fleisch fein schmelzend und sehr saftreich. Dez.—Jan.
- H.** **Marie Louise**, sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne, edles, schmelzendes Fleisch. Ende Sept.—Mitte Nov.
- H. P. B. S. U. C.** **Neue Poiteau**, Frucht sehr gross, saftig und wohlschmeckend, vorzügliche Tafelfrucht. Baum früh- und reichtragend. Nov.
- H. B.** **Nordhäuser Winterforelle**, mittelgrosse, wertvolle Wirtschafts- und Tafelfrucht. Reichtragend. Jan.—April.
- B. U. C.** **Olivier de Serres**, mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig, bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Jan. bis März.
- H. P. B. S. C.** **Pastorenbirne**, gute Koch- und Tafelbirne, Baum sehr fruchtbar. Ende Okt.—Jan.
- H.** **Pfirsichbirne**, Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmem Geschmack. August.
- H. B. S.** **Schmelzende von Thirriot**, Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert. Okt.—Nov.
- H. B.** **Sparbirne** (Frühe Brüsseler), hochfeine, flaschenförmige, saftige Sommerbirne. Juli—Aug.
- H. B. S. C.** **Stuttgarter Gaishirtl**, eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Ende Aug.—Mitte Sept.
- H. C.** **Triumph von Viennes**, sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.

Brombeeren.

Starke, regelrecht gezogene Kultursträucher

pro St. M. —50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 35.—, 1000 St. M. 300.—

Crataegifolius, Beere mittelgross, korallenrot, Strauch sehr fruchtbar und dekorativ.

Dorchester, sehr grosse und süsse Frucht, von früher Reife.

Eldorado, Frucht länglich und unregelmässig, gross. Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte und fruchtbare Sorte.

Erie, tiefschwarze, frühreifende Frucht von gutem Geschmack. Strauch kräftig wachsend.

Hansell, grosse, schwarze Frucht von guter Qualität; die früheste Brombeere.

Hosacks dornlose, dornloser Strauch, Frucht mittelgross, dunkelbraun.

Kittatiny, glänzenschwarz, sehr wohlschmeckend, früh- und reichtragend.

Laciniatus, geschlitztblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.

Lawton (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August.

Loganbeere, ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere,

pro St. M. —75, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—.

Lucretia, Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlich-süss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August.

Mammoth, eine der grossfrüchtigsten Brombeeren. Frucht tiefschwarz, von erfrischendem Geschmack. Strauch reichtragend.

Minne Waski, grossfrüchtig, schwarz. Der Strauch wächst aufrecht und ist sehr fruchtbar.

Newmans dornlose, starkwachsend, mittelgrosse, gute Frucht.

Philadelphia, Frucht mittelgross bis gross, dunkelrot, rund.

Phoenicolasius, sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend. pro St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—.

Rathbun, sehr grosse, glänzend-schwarze Frucht, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend.

Sandbrombeere, Beere gross bis sehr gross, rundlich, auch länglich, glänzenschwarz. Strauch wächst sehr kräftig.

Snyder, Frucht mittelgross, schwarz, süss. Strauch reichtragend.

Theodor Reimers, Frucht glänzenschwarz, von angenehmem Geschmack. Ausserordentlich starkwüchsig und reichtragend, liefert alljährlich sicher reiche Erträge und ist sowohl für die Tafel wie für wirtschaftliche Zwecke zweifellos die empfehlenswerteste rankende Brombeere.

Ward, grosse, längliche, glänzend schwarze Frucht von süssem Geschmack. Stark wachsende und reichtragende Sorte.

Weisse Kristall, Frucht gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün.

Wilsons Frühe, vortreffliche, grosse, tiefschwarze, im August reifende Frucht.

Hagebutten, siehe „Verschiedene Fruchtarten“.

Haselnüsse.

Geschlitztblättrige, Sträucher pro St. M. 150.

Goldhaselnüsse, wurzelechte Sträucher

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—

Rotblättrige Zellernuss, starkwachsend, Blätter bis zum Herbst dunkelrot gefärbt; vollständig winterhart. Bester

Ersatz für *Corylus Avellana atropurpurea*, starke Sträucher

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 16.—, 100 St. M. 150.—

Haselnüsse (Fortsetzung):**Grossfrüchtige in besten Sorten nach meiner Wahl:****Besonders starke Sträucher****pro St. M. 1.20, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—****1000 » » 750.—****2jährige verpflanzte, starke Ableger****100 St. in 5—10 Sorten meiner Wahl » 20.—****1000 » » 10—20 » » » 180.—****Sortiment:****Apolda-Nuss.**

Badem Funduk, eine äusserst wohl-schmeckende und dabei sehr reichtragende früh reife, mandelartige Lam-berts-nuss.

Bandnuss, durch Grösse und Schönheit hervorragende Lamberts-nuss, die aber guten Boden und Standort verlangt, wenn sie ihre Vollkommenheit erreichen soll.

Barcellonaer, eckige, eine sehr reichtragende ansehnliche und wohl-schmeckende Nuss. Durch die grossen ausgebreiteten Hülsen leicht von anderen Sorten zu unterscheiden.

Barcellonaer, grosse, reichtragende, an-sehnliche und wohl-schmeckende Zeller-nuss.

Barcellonaer, Gubener, mittelgrosse Nuss. Der Strauch ist ziemlich tragbar.

Barrs spanische, bekannte, mittelgrosse bis grosse Zeller-nuss, die wegen ihrer guten Eigenschaften Verbreitung ver-dient.

Barrs Zeller-nuss, der vorigen ähnlich, dürfte hiermit identisch sein.

Beethes Zeller, sehr grosse Nuss. Strauch kräftig und recht ertragreich.

Bergers Zeller-nuss, eine wegen ihrer ansehnlich grossen Früchte und reichen Fruchtbarkeit beachtenswerte Haselnuss, die mehr Verbreitung verdient.

Braunschweigische.

Burchardts Zeller-nuss, ziemlich grosse, rundlich-spitze Nuss, Strauch recht fruchtbar.

Cosford, mittelgrosse, längliche Zeller-nuss, mit dünner Schale und schmackhaftem Kern. Strauch von üppigem Wuchs und grosser Fruchtbarkeit.

Cosford, verbesserte, auffallend dünne Schale mit grossem Kern von süssem angenehmen Geschmack. Hat im übrigen die guten Eigenschaften der gewöhnlichen Cosford.

Daviana, wegen ihrer grossen Früchte und reichen Fruchtbarkeit sehr empfeh-lenswerte Zeller-nuss.

Einzeltragende kegelförmige, schön aus-sehende Zeller-nuss, mittelgross, mit gros-sem, wohl-schmeckendem Kern.

Englische Zeller-nuss, grosse, fast runde Nuss von gutem Geschmack.

Fichtwerdersche Zeller-nuss, dankbare Ha-selnuss I. Ranges, die auch zur Gross-kultur zu empfehlen ist.

Fruchtbare (Fertile), ziemlich grosse, dünn-schalige Bastardnuss.

Frühe lange Zeller-nuss, wegen ihres rei-chen Tragens und des vorzüglichen Wohl-geschmackes der ansehnlichen Früchte eine Haselnuss I. Ranges.

Frühe von Frauendorf, sehr frühreifende, gute Zeller-nuss.

Gekräuselte Nuss (Friszled), sehr fruchtbare, mittelgrosse Bastardnuss. Kern fest, sehr süss und wohl-schmeckend.

Grandis.

Grosse bunte Zeller-nuss. Der Strauch zeichnet sich durch reichliches Tragen aus; Früchte gross bis sehr gross.

Grosse Kugelnuss, diese rundliche Zeller-nuss ist wegen Grösse, Schönheit und Wohlgeschmack der Früchte besonders empfehlenswert.

Gunslebener Zeller-nuss, ansehnlich grosse Nüsse mit dünner Schale und grossem Kern von gutem angenehmen Geschmack.

Gustav Zeller-nuss, sehr grosse, langovale Früchte, Strauch zeichnet sich durch kräf-tigen Wuchs und grosse Fruchtbarkeit aus.

Hallesche Riesennuss, eine der schönsten und grössten Haselnüsse und daher all-gemein geschätzt.

Hempels Zeller-nuss, eine dankbare und feinschmeckende, dünn-schalige Hasel-nuss I. Ranges.

Heynicks Zeller-nuss, prächtige, ansehn-liche Nuss mit wohl-schmeckendem Kern; spätreifende Sorte.

Jeves Sämling, ganz vortreffliche Bastard-nuss, die sich sowohl durch reiches Tragen, wie auch durch Schönheit und Wohlge-schmack der grossen Früchte auszeichnet

Haselnüsse (Fortsetzung):

- Kaiserin Eugenie**, sehr früh- und reichtragende Lambertsnuss, gross, länglich, mit festem und sehr wohlschmeckendem Kern.
- Kaiserliche (Emperor)**, ansehnlich grosse, ovale Zellernuss, reichtragend.
- Kirchsens Zeller**.
- Königliche Prinzessin (Princess Royal)**, mittelgrosse bis grosse Zellernuss, mit festem, sehr süss schmeckendem Kern. Strauch sehr zeitig und dankbar tragend.
- Lambert Cols**, mittelgrosse, gute Nuss.
- Lange Landsberger**, Zellernuss, flach, walzenförmig, von erster Grösse, sehr empfehlenswert.
- Längliche Riesennuss**, diese Zellernuss sichert sich durch Grösse und Wohlgeschmack der Früchte einen ersten Platz in jedem Garten.
- Louisens Zellernuss**, eine empfehlenswerte sehr schöne grosse, wohlschmeckende Nuss.
- Lucas Zellernuss**, diese Nuss zeichnet sich durch grosse schöne, wohlschmeckende Früchte aus, welche zahlreich erscheinen.
- Ludolphs Zellernuss**, grosse, prächtige, meist lang eiförmige Früchte, mit sehr wohlschmeckendem Kern.
- Mandelnuss** siehe **Badem Funduk**.
- Messmers Zellernuss**, mittelgrosse, gute Sorte.
- Minnas Zellernuss**, eine sehr schöne und ansehnliche Nuss, mit gelblichweissm Kern, von gutem Geschmack.
- Mogulnuss**, grosse rundliche Zellernuss mit mandelförmigem Kern von sehr schönem, süssm Geschmack.
- Multiflorum**, mittelgrosse, kurzovale Nuss. Strauch sehr fruchtbar.
- Northamptonshire prolific**, schon als junger Strauch reichlich tragend und später über und über mit Früchten beladen, besonders an den unteren Zweigen.
- Nottingham**, ziemlich grosse, längliche Bastardnuss von lieblichem Geschmack. Schon als junger Strauch reichlich tragend.
- Riekhens Zellernuss**, eine grosse prächtige, sehr dankbar tragende Haselnuss, die allgemeine Empfehlung verdient.
- Römische Nuss**, die Früchte dieser Haselnuss kommen massenhaft, aus dem Süden importiert, auf den Markt und finden wegen ihrer ansehnlichen Grösse und ihres vortrefflichen Geschmackes gern Abnehmer.
- Rotblättrige Lambertsnuss**. Nuss mittelgross, dünnchalig. Strauch von grosser Fruchtbarkeit und mittlerem Umfang.
- Rudolphs Lambertsnuss (Rudolphinnuss)**, sehr grosse, in der Form veränderlich Bastardnuss, mit länglich-mandelförmigem, süssm Kern.
- Schlesierin**, grosse, ansehnliche, breit-rundliche Zellernuss mit dünner Schale und festem, sehr wohlschmeckendem Kern.
- Sicilische**, ähnlich der römischen Nuss, oder mit dieser identisch.
- Spanische Lambertsnuss (Spanische Nuss)**, eine sehr schöne und grosse ansehnliche Nuss, die wegen ihres reichen Tragens und ihres guten Geschmackes allgemein Anpflanzung verdient.
- Sturms breite Zellernuss**, grosse, spitzförmige, dünnchalige Nuß. Strauch kräftig wachsend und reichtragend.
- Trapezunter Kaiserhasel**, sehr grosse und schöne länglich-kegelförmige Zellernuss, mit dünner Schale und sehr wohlschmeckendem, süssm Kern. Frühzeitig und dankbar tragend.
- Truchsess Zellernuss**, riesige Früchte, länglich zugespitzt, kegelförmig. Im Verhältnis zur Grösse der Nuss ist der Kern immer noch wohlschmeckend.
- Volle Zellernuss**, obwohl die Nuss nicht zu den grössten gehört, so hat sie doch wegen ihres reichen Tragens und ihres vorzüglichen Wohlgeschmacks allgemeine Verbreitung gefunden.
- Vollkugel**, eine prächtige Haselnuss von seltener Grösse und Schönheit. Früchte rundlich mit süss- und wohlschmeckendem Kern.
- von Mehl**, sehr grosse, rundlich bis stumpfkegelförmige Bastardnuss. Empfehlenswerte, kräftigwachsende und sehr fruchtbare Sorte von grosser Güte.
- Wallys grosse Zellernuss**, grosse Nuss, frühreifend; Strauch stark- und hochwachsend, hart, fruchtbar.
- Waterloo**, eine ganz ansehnliche Nuss, die in keiner Sammlung fehlen sollte.
- Webbs Preisnuss**, grosse bis sehr grosse, langovale Bastardlambertsnuss, reichtragend. Eine der besten Haselnuss-sorten.
- Weisse Lambertsnuss**, mittelgrosse, langzugespitzt-eiförmige Früchte, frühreifend.
- Wunder von Bollweiler**, kurzkegelförmige, oft fast runde Zellernuss, die mit zu den grössten unter den Haselnüssen zählt. Als Schaufucht vorzüglich.
- Zartschalige**.

Himbeeren.

Kräftige, reichbewurzelte Pflanzen.

1. Einmaltragende.

a) Rotfrüchtige Sorten:

In Sorten meiner Wahl: pro St. M. —.20, 10 St. M. 1.50, 100 St. M. 12.—, 1000 St. M. 100.—.

Carters Fruchtbare, gross bis sehr gross, rundlich, dunkelrot, saftreich. Schösslinge kräftig, aufrecht, fast stachellos. Eine ausgezeichnete fruchtbare Sorte.

Cuthbert, gross, kegelförmig, dunkelrot, süss. Schösslinge sehr kräftig, aufrecht, mit wenigen kurzen Stacheln.

Fastolf, mittelgross bis gross, rundlich, dunkelrot, schwach blau bereift, saftreich, süss, aromatisch. Schösslinge kräftig, mit kurzen Stacheln dicht besetzt. Allbekannte, reichtragende, vorzügliche Sorte, für Massenkulturen.

Fürst Anatol Gagarin, sehr gross, rundlich, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Schösslinge sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit.

Harzjuwel, sehr gross, dunkelrot, festes Fleisch, von köstlichem Geschmack, von Hornet wenig verschieden.

Herrenhäuser Königshimbeere, sehr gross, spitzkegelförmig, dunkelrot glänzend, reich aromatisch. Schösslinge ungemein kräftig, mit kurzen spärlichen Stacheln. Eine ausgezeichnete Himbeere, besonders für die Tafel.

Hornet, sehr gross, kegelförmig, dunkelrot, etwas spätreifend. Schösslinge kräftig, aufrecht, mit nur wenigen kurzen braunroten Stacheln. Eine der grossfrüchtigen roten Sorten, als Tafelfrucht hochgeschätzt. Für Massenkulturen.

Marlborough, gross bis sehr gross, rundlich, mitunter kegelförmig, hellrot, fleischig, süss aromatisch. Schösslinge äusserst kräftig, aufrecht, fast unbewehrt, von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Für Massenkulturen.

Superlative, sehr gross, abgerundet kegelförmig, dunkelrot, sehr saftreich, süss und aromatisch. Schösslinge kräftig, aufrecht, sehr fruchtbar. Vorzügliche Himbeere für Hausgärten und Massenkulturen.

Vorsters Himbeere, sehr gross, rundlich, selten kegelförmig, purpurrot, saftreich, aromatisch. Schösslinge kräftig, mit kurzen, spärlichen Stacheln. Eine sehr fruchtbare Himbeere.

b) Gelbfrüchtige Sorten:

In Sorten meiner Wahl: pro St. M. —.20, 10 St. M. 1.50, 100 St. M. 12.—, 1000 St. M. 100.—.

Colonel Wilder, mittelgross, selten gross, rundlich, hellgelb. Schösslinge sehr kräftig, meist verästelt, mit kurzen, scharfen Stacheln dicht besetzt. Sehr empfehlenswerte amerikanische Sorte.

Gelbe Antwerpener, mittelgross, auch gross, rundlich, hell- bis rötlichgelb, ziemlich fest, süss und wohlschmeckend. Schösslinge kräftig und aufrecht. Stacheln ziemlich dicht und sehr kurz. Die ertragreichste gelbe Himbeere für Massenanbau.

Magnum bonum, gross, dunkelgelb, kegelförmig. Schösslinge kräftig aufrecht, fruchtbar.

c) Sorten mit fleischfarbigen Früchten.

pro St. M. —.20, 10 St. M. 1.50, 100 St. M. 12.—.

Golden Queen, gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar, Schösslinge kräftig.

Salmon Queen, mittelgross, rundlich, fleischfarben, weich, saftreich.

d) Schwarzfrüchtige Sorten:

Kräftige, reichbewurzelte Ware.

pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 30.—.

First and best, ältere, schwarzfrüchtige Sorte, früh- und reichtragend.

Gregg, mittelgross, schwarzbraun glänzend, rund. Schösslinge kräftig, weiss bereift, fruchtbar.

Shaffers Colossal, gross bis sehr gross, dunkelpurpurn, sehr tragbar. Bastard zwischen einer roten und einer schwarzen amerikanischen Himbeere. Macht keine Ausläufer.

Himbeeren (Fortsetzung):**2. Remontierende (zweimaltragende).**

pro St. M. —.20, 10 St. M. 1.50, 100 St. M. 12.—, 1000 St. M. 100.—.

Billards Immertragende (Immertragende von Feldbrunnen), Frucht sehr gross, rundlich, oft schief, dunkelrot, saftreich, gewürzt. Schösslinge sehr kräftig, aufrecht, wenig bewehrt. Ausgezeichnete Sorte.

Surpasse Fastolf, gross, kegelförmig, dunkelrot, fest. Schösslinge kräftig, fruchtbar.

Johannisbeeren.

Prima Qualität, wüchsige junge Kulturware mit langen Trieben.

Holländische rote.

Büsche, 2jähr., mit 3—5 Trieben

pro St. M. —.30, 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—,
1000 » » 175.—

» verpflanzte, mit 5—8 Trieben

pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 28.—,
1000 » » 250.—

» verpflanzte, mit 8—12 Trieben

pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 38.—,
1000 » » 350.—

Halbstämme, wurzelecht, 40—60 cm Stammhöhe, besonders gute Qualität, mit starken 3—4 jähr. Kronen, die schon reiche Erträge lieferten

pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—,

Hochstämme, veredelt, mit guten 2jährigen Kronen

pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. » 125.—

a) Rote Johannisbeeren.

Verpflanzte Büsche pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 28.—.

Caucasische, Beere sehr gross, dunkelrot glänzend; Traube mittellang, Strauch kräftig und fruchtbar.

Chenonceau, besonders grosse Beere von säuerlichem Geschmack; reichtragend.

Fays new prolific, Beere dunkelrot, gross. Traube lang bis sehr lang. Strauch kräftig wachsend.

Grosse rote von Boulogne, Beere dunkelleuchtendrot, sehr gross. Traube ziemlich lang. Strauch kräftig.

Holländische rote, Beere gross, hellrot, glänzend durchscheinend. Traube lang, an älterem Holz oft zu dichten Massen gehäuft. Strauch kräftig und gedungen wachsend. Für Massenanbau. Vorrätige Qualitäten und Preise siehe vorher.

Kirschjohannisbeere, Beere mittelgross, dunkelrot. Traube mittellang. Strauch fruchtbar

Loppersumer Gelbstiel, empfehlenswerte, reichtragende, rotfrüchtige Lokalsorte.

Schöne von St. Gilles, empfehlenswerte, grossfrüchtige Sorte.

Versailler rote, Beere gross bis sehr gross, glänzend, dunkelrot, äusserst saftreich, von angenehmer, milder Säure. Traube lang. Strauch kräftig wachsend und fruchtbar.

Johannisbeeren (Fortsetzung):**b) Weisse Johannisbeeren.**

Verpflanzte Büsche pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 35.—.
 Hochstämme (H.) » » » 2.—, 10 » » 18.—.

Holländische weisse, Beere gross bis sehr gross, gelblichweiss, durchsichtig, von äusserst angenehmem, mildem Geschmack. Traube lang. Strauch kräftig, von erstaunlicher Fruchtbarkeit (H.).

Weisse aus Bar le Duc, Beere gross, fast weiss, durchsichtig, dünnchalig, sehr mild-säuerlich. Strauch kräftig. Der Wert dieser Johannisbeere besteht in der geringen Samenzahl.

c) Schwarze Johannisbeeren (Ahlbeeren).

Extra starke, bewurzelte Stecklingspflanzen, ca. 40—70 cm hoch
 100 St. M. 10.—, 1000 St. M. 80.—.

Verpflanzte, starke Büsche
 pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—, 1000 St. M. 180.—.

Bang up, Beere gross bis sehr gross, schwarz. Traube mittellang. Strauch kräftig und fruchtbar.

Boskoop Giant, siehe Schwarze Traube.

Goliath, Beere sehr gross, von angenehmem Geschmack. Traube kurz. Strauch aufrechtwachsend und sehr fruchtbar.

Lees schwarze, Beere gross bis sehr gross, schwarzglänzend. Traube lang. Strauch aufrecht, von grösster Fruchtbarkeit.

Neapolitanische, Beere mittelgross, schwarz. Traube lang. Strauch kräftig und fruchtbar.

Schwarze Traube (Boskoop Giant), Beere gross bis sehr gross, gleichmässig entwickelt, frühreifend. Traube lang. Strauch kräftig und recht fruchtbar.

Junibeere (Amelanchier), siehe „Verschiedene Fruchtarten“.

Kirschäpfel.

Pyramiden, 100—150 cm hoch, pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—.

Malus baccata fructu flavo, gelbfrüchtig.

» » » **maximo**, grossfrüchtig.

» **flavescens**, gelbfrüchtig.

» **Orange**, dunkelorangefarben, saftreich, von angenehmem Geschmack.

» **Ringo**, rundlich, nach oben spitzer, gelb, 14—20 mm im Durchmesser.

» **The Fairy**, Frucht hält sich bis tief in den Winter hinein und soll ein vorzügliches Gelee geben.

Kirschen.

Hochstämme (H.), Stammhöhe 180—200 cm, 8—10 cm Umfang
 pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—.

Mittelstämme (M.), Stammhöhe 140—180 cm, 6—8 » »
 pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—.

Büsche (B.), 2—3 jährig
 pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—.

Kirschen (Fortsetzung):

- H.** **Badacsoner Riesenkirsche**, eine sehr grosse, schwarzbraun gefärbte, festfleischige, sehr wohlschmeckende, ungarische Süsskirsche von grosser Fruchtbarkeit. Anfang—Mitte August.
- H. M. B.** **Büttners späte Knorpelkirsche**, sehr festfleischige, fast dunkelrot marmoriert gefärbte, grosse Knorpelkirsche. Empfehlenswerte Sorte. Anfang—Mitte August.
- B.** **Coburger Mai-Herzkirsche**, schwarzbraune, später schwarze Kirsche. Ende Mai.
- B.** **Dönissens gelbe Knorpelkirsche**, mittelgrosse, festfleischige Kirsche. Baum reichtragend. Ende Juli—Anfang August.
- H. B.** **Eltonkirsche**, grosse, gelb und rote Herzkirsche, mit ziemlich festem Fleisch. Anfang—Mitte Juli.
- M. B.** **Farnstädter schwarze Bigarreau** (Schwarze Herzkirsche), Wuchs kräftig, Tragbarkeit regelmässig und sehr reich. Frucht etwas bitter, bei Regen nicht platzend. 3. Kirschwoche.
- H. B.** **Fromms Herzkirsche**, grosse, schwarze, weichfleischige, sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Mitte Juni—Anfang Juli.
- B.** **Frühe französische**, schwarze Herzkirsche, grösser als „Früheste der Mark“, Stiel sehr lang, meist etwas gekrümmt, feinschmeckend. 1. bis 2. Kirschwoche.
- B.** **Früheste der Mark**, mittelgross, schwarzrot, weichfleischig. Anfang bis Mitte Juni.
- B.** **Grosse Germersdorfer**, grosse, schwarzbraune, festfleischige Knorpelkirsche. Mitte—Ende Juli.
- B.** **Grosse schwarze Knorpelkirsche**, vortreffliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Grosse und festfleischige Kirsche. Ende Juli—Anfang August.
- H. M. B.** **Hedelfinger Riesenkirsche**, sehr gross, schwarzrot, festfleischig, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang—Mitte Juni.
- H.** **Kassins frühe Herzkirsche**, sehr schätzenswerte, grosse, schwarzrote, weichfleischige Frühlkirsche. Mitte Juni.
- M. B.** **Königin Hortense**, unter den Glaskirschen ist die Sorte am verbreitetsten. Grosse bis sehr grosse, hellrote, vortreffliche Tafelfrucht. Mitte Juli—Anfang August.
- H.** **Kronprinz von Hannover**, frühreifende Kirsche, gelb mit leuchtendroten Backen. Baum kräftig und reichtragend. Mitte Juni—Juli.
- M. B.** **Lucienkirsche**, ziemlich grosse Süsskirsche, gelb und rot, weichfleischig. Anfang—Mitte Juli.
- M. B.** **Maikirsche**, rote, holländische, bekannte, sehr gute Sorte. Juni.
- H.** **Münsterkirsche**, gross, herzförmig abgerundet, weisslich gelb und blassrosa mit festem Fleisch von erster Qualität. Mitte Juli—Anfang August.
- B.** **Neue Königliche**, sehr grosse, dunkelrote Glaskirsche. Ende Juli.
- M. B.** **Schneiders späte Knorpelkirsche**, breitherzförmige, dunkelbraunrote, fein weiss punktierte Frucht von auffallender Grösse.
- B.** **Türkine**, gross, gelb und rot, weichfleischig. Ende Juni—Anfang Juli.
- H.** **Wils frühe Herzkirsche**, ziemlich gross, schwarzrot, weichfleischig, sehr schätzbare Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar. Anfang—Mitte Juni.
- B.** **Winklers weisse Herzkirsche**, eine prächtige, hellbunte Kirsche, gelb, schön rot punktierte und verwaschene Frucht. Ende Juni.
- H.** **Zeissberger Riesenkirsche**, dunkelrot, punktiert. Empfehlenswerte Sorte. Anfang bis Mitte August.

Kirschen (Fortsetzung):**Schattenmorelle.**

(Grosse lange Lotkirsche.)

Bekannte und vielverbreitete Sauerkirsche für Massenanbau. August—Sept.

Starke 3jährige Büsche pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—.

Spaliermorellen, Fächer auf Mahaleb pro St. M. 3.—.

Loganbeere, siehe „Brombeeren“.**Mandeln.**

1jährige Veredelungen pro St. M. 3.—, Büsche pro St. M. 4.—.

Pêche (Pfirsich-Mandel), sonderbare Kreuzung zwischen Mandel und Pfirsich. Das Fleisch, welches den Stein umschliesst, ist essbar. Baum sehr starkwachsend und sehr fruchtbar.**Mispeln.**

Hochstämme (H.), pro St. M. 2.25, 10 St. 20.—.

Halbstämme (h.), „ „ „ 1.75, 10 „ 15.—.

H. h.	Grossfrüchtige, sehr grosse Frucht. Baum reichtragend.
H. h.	Holländische, sehr grosse, dunkelbraune Früchte.
H. h.	Kernlose, klein, aber wohlschmeckend.
H. h.	Königliche, grosse, wohlschmeckende Frucht. Baum reichtragend.
h.	Nottingham.

Moosbeere, siehe „Verschiedene Fruchtarten“.**Pfirsiche.****1jährige Veredelungen, starke**

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 20.—.

Amsden, alte, jedoch noch heute begehrte Sorte. Frucht mittelgross, weisslichgelb, sonnenwärts tief karminrot gefärbt, wohlschmeckend. Eine der frühesten Sorten.**Cumberland**, sehr grosse und schön gefärbte Frucht. August.**Frühe Alexander**, ähnlich Amsden. Frucht ziemlich gross, weisslichgelb, sonnenwärts karminrot, saftreich. Juli—Anfang August.» **Rivers**, blassgelbe, leicht rot verwaschene Frucht, sehr saftreich, von ausgezeichnetem, fein gewürztem Geschmack. Juli.» **von Cronenstein**, in derselben Grösse wie „Amsden“, gelb, sonnenwärts rötlich, von ausgezeichnetem Geschmack. Ende Juli.» **von Hales**, mittelgrosse Frucht, fast rund, schön dunkelblutrot überzogen, saftiges, wohlschmeckendes Fleisch. Mitte August.**Le Vainqueur** (Der Sieger), noch neuere Sorte, welche die bis jetzt frühreifendste Varietät „Sneed“ übertrifft. Reift noch einige Tage früher als diese, ist lebhafter gefärbt und von besserer Qualität. Vollständig steinlösend.**Präsident Griepenkerl**, gross, hellgelb, sonnenwärts schön dunkelrot, sehr saftreich, süssweinig und fein gewürzt. Ende August.**Proskauer Pfirsich**, Frucht gross, purpurrot mit durchscheinendem Gelb, saftreich, sehr angenehm gewürzt. Widerstandsfähig gegen Winterkälte.**Rivers frühe York**, mittelgross, eine der besten Einlegepfirsiche. Mitte—Ende August.**Triumph**, reift zur gleichen Zeit wie „Frühe Alexander“, die Frucht ist jedoch bedeutend grösser und hat den Vorzug, dass sie sich leicht vom Stein löst. Fleisch gelb.

Pflaumen.

Hochstämme (H.), 6—8 cm Umfang

pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—, 100 St. M. 250.—

Mittelstämme, 6—8 cm Umfang

pro St. M. 2.75, 10 St. M. 25.—, 100 » » 230.—

Halbstämme (h.), 6—8 cm Umfang

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 20.—, 100 » » 180.—

Büsche (B.), 2—3jährig

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 20.—, 100 » » 180.—

a) Pflaumen.

H.	Angelina Burdett , ziemlich gross, rötlichschwarzblau, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang—Mitte September.
H. h. B.	Anna Späth , gross, rötlichblau, für alle Zwecke vorzüglich geeignet. Baum früh- und ausserordentlich reichtragend. Ende Sept. bis Anfang Okt.
H. h.	Bunter Perdrigon , gross, violettblau und hellrot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum reichtragend. Ende August.
H. h.	Cochet père , gross bis sehr gross, gelb und rot, Tafelzierge. Baum sehr fruchtbar. Ende August.
H.	Emma Leppermann , sehr gross, kurzoval, lachsfarben und rot, saftig, süss, schwach gewürzt. Baum sehr fruchtbar.
h. B.	Frühe Fruchtbare , mittelgross, schwarzblau, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang August.
H. B.	Gelbe Elerpflaume , gross bis sehr gross, gelb, schön, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang Sept.
h.	Grossherzog , sehr gross, dunkelviolet bis schwarzblau, stark bläulich beduftet. Baum gut tragend. September.
H. h. B.	Harris Monarch , wunderschöne, grosse, ovale Pflaume, dunkelrot, grau punktiert. Fleisch gelb, von gutem Geschmack, sehr saftreich. Aug.—Sept.
H. h.	Königin Victoria , sehr gross, rot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend. Ende August.
H. h. B.	Merryweather , starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht enorm gross. Wurde in London durch die „Royal Horticultural Society“ prämiert.
h. B.	Rote Elerpflaume , grosse, rote, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September.
H. h.	Schöne von Löwen , sehr grosse, eiförmige, dunkelblaurote Frucht. Aug.
h.	Violette Jerusalemspflaume , gross, rotviolett, treffliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar. Anfang bis Mitte September.

b) Reineclauden.

H. h.	Althans , sehr gross, rund, schwarzblau, ausgezeichnete feine Tafel- frucht. September.
H. B.	Boddaerts , gross, gelb, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr tragbar. Mitte bis Ende August.
H. h.	Grüne , mittelgross, gelblichgrün, bekannte allerbeste Sorte zum Ein- machen. September.
H. h.	Kaiserliche (Imperiale) , grosse, gelbe Frucht. August.
h.	Noire , groß, samt schwarz, gelb, sehr schmelzend und süss. August.
H. h.	von Quillins , sehr gross, hellgelb, saftige Tafelfrucht. August.

Pflaumen (Fortsetzung):

c) Zwetschen.

- H. h. B. Borssumer, gross, süss und aromatisch, die allergrösste und beste Zwetsche. September.
- H. h. B. Hauszwetsche (Banernpflaume), gross, schwarzblau, für alle Zwecke geeignet. Ende September bis Anfang Oktober.
- H. h. B. Lukaszzwetsche, mittelgross, dunkelblau, stark beduftet. August.

Stachelbeeren.

- Niedrige, starke Büsche**, in Sorten meiner Wahl
pro St. M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 St. M. 40.—
- Hochstämme**, in besten grossfrüchtigen Sorten meiner Wahl
pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 125.—

Süsse Eberesche.**Sorbus aucuparia moravica (fructu dulces).**

- Hochstämme, 6— 8 cm Umfang, Stammhöhe 180—200 cm
pro St. M. 3.50, 10 St. M. 30.—, 100 St. M. 280.—
- » 8—10 » » Stammhöhe 180—200 cm
pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.—, 100 » » 320.—

Walnüsse.**Gewöhnliche, grossfrüchtige deutsche:**

- Hochstämme, 6— 8 cm Umfang..... pro St. M. 2.75, 10 St. M. 25.—
- » 8—10 » » » » » 3.50, 10 » » 30.—
- » 10—12 » » » » » 4.—, 10 » » 38.—

Zwetschen, siehe unter „Pflaumen“, c).

Verschiedene Fruchtarten.

- Berberitze** (*Berberis vulgaris*), die roten Beeren werden zum Einmachen benutzt. Sträucher, pro St. M. —.40, 10 St. M. 3 50, 100 St. M. 30.—
- Cornelkirsche** (*Cornus mas*), die grosse, längliche, rote Frucht ist essbar.
Büsche, pro St. M. 1.50, 10 St. M. 12.—
- Hagebutten** (*Rosa rugosa alba*), mit grossen fleischigen Früchten,
pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—
- Junibeere** (*Amelanchier*), blauschwarze Einmachfrucht
Sträucher, pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.50, 100 » » 30.—
- Moosbeere**, amerikanische (*Vaccinium macrocarpum*), grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandböden in jeder Lage
pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—
- Weinbeere** (*Rubus phoenicolasius*), angenehm schmeckende, saftreiche Frucht pro St. M. 1.—, 10 St. M. 8.—

Jn- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

a) Junge Koniferen (Nadelhölzer).

Bemerkung:

Für diejenigen Arten 1- und 2jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 50 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung. Bei Mengen unter 50 Stück erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältig kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzen zu vergleichen.

Abies, Tanne.

		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» amabilis	ca. 8—12 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	120.—	—
» balsamea		1 »	Sämlinge	5.—	40.—
» brachyphylla		2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
»	ca. 8—15 cm hoch	3 »	»	35.—	—
» cephalonica		1 »	Sämlinge	15.—	125.—
»		2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
» concolor		1 »	Sämlinge	15.—	125.—
»	ca. 8—15 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	50.—	—
» von Colorado		1 »	Sämlinge	15.—	—
» firma		1 »	»	15.—	125.—
» Fraseri		2 »	verpfl. Säml.	25.—	200.—
» grandis		1 »	Sämlinge	15.—	—
»	ca. 15—25 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	35.—	—
» lasiocarpa	» 7—12 »	2 »	»	30.—	—
» nobilis		2 »	»	30.—	—
»	ca. 10—15 cm hoch	3 »	»	40.—	—
» Nordmanniana		1 »	Sämlinge	12.—	100.—
»		2 »	verpfl. Säml.	20.—	180.—
» numidica		2 »	»	30.—	—
» panachaica		2 »	»	20.—	—
» pectinata		1 »	Sämlinge	1.—	5.—
»		2 »	»	2.—	15.—
» Pinsapo		1 »	»	15.—	—
» umbilicata		2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
»	ca. 10—15 cm hoch	3 »	»	30.—	—
» robusta		2 »	»	25.—	—
» Veitchi		1 »	Sämlinge	8.—	75.—
»		2 »	verpfl. Säml.	25.—	—

Cedrus, Zeder.

» atlantica	ca. 10—15 cm hoch	3 »	»	30.—	—
» argentea		1 »	Sämlinge	10.—	80.—
» Deodara		1 »	»	10.—	80.—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	30.—	—
» Libani		1 »	Sämlinge	10.—	80.—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Koniferen.

Chamaecyparis, Scheinzypresse.

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>Lawsoniana</i> ca. 10—20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» » » 15—25 » »	3 »	» »	6.—	50.—
» » » 20—35 » »	4 »	» »	7.—	60.—
» <i>Alumii</i> , stahlblau.....	2 »	» Steckl.	18.—	150.—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	2× verpfl. Steckl.	20.—	180.—
» » » 25—35 » »	4 »	2× »	25.—	200.—
» <i>erecta viridis</i>	2 »	verpfl. Steckl.	14.—	—
» » ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	16.—	140.—
» » » 25—35 » »	4 »	2× verpfl. Steckl.	18.—	150.—
» <i>Fraseri</i>	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	150.—
» » ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	20.—	180.—
» » » 20—30 » »	4 »	2× verpfl. Steckl.	25.—	200.—
» <i>glauca</i> » 15—25 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» » » 20—35 » »	4 »	» »	10.—	80.—
» <i>monumentalis nova</i> , säulenförmig wachsend	2 »	» Steckl.	18.—	150.—
» » <i>nova</i> ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	20.—	180.—
» » » 20—35 » »	4 »	2× verpfl. Steckl.	25.—	200.—
» <i>Rosenthali</i>	2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» <i>Triumph von Boskoop</i> ca. 10—20 cm hoch	2 »	» Säml.	15.—	—
» <i>nutkaënsis</i>	2 »	» Steckl.	25.—	—
» » <i>compacta</i>	2 »	» »	25.—	—
» » <i>viridis</i>	2 »	» »	25.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	2× verpfl. Steckl.	30.—	—
» <i>pisifera</i> » 15—30 » »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
» » <i>argenteo-variegata</i>	2 »	» »	12.—	—
» » <i>aurea</i>	2 »	» »	9.—	80.—
» » ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	12.—	90.—
» <i>filifera</i>	2 »	» »	15.—	—
» » <i>nana</i>	2 »	» »	20.—	—
» <i>plumosa</i>	2 »	» »	9.—	80.—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	2× verpfl. Steckl.	12.—	—
» » <i>aurea</i>	2 »	verpfl. Steckl.	9.—	80.—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» » <i>flavescens</i>	2 »	» »	12.—	—
» » <i>nana aurea</i>	2 »	» »	9.—	—
» » <i>squarrosa</i>	2 »	» »	9.—	80.—
» » <i>aurea</i>	2 »	» »	9.—	—
» » <i>sulfurea</i>	2 »	» »	12.—	—

Cryptomeria, Kryptomerie.

» <i>japonica</i> ca. 10—20 cm hoch	2 »	» Säml.	7.—	—
---	-----	---------	-----	---

Ginkgo (Salisburia).

» <i>biloba</i> , Ginkgobaum	1 »	Sämlinge	15.—	125.—
------------------------------------	-----	----------	------	-------

Juniperus, Wacholder.

» <i>chinensis Pfitzeriana</i>	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
» » <i>procumbens aurea</i>	2 »	» »	30.—	—
» <i>communis</i>	2 »	» Säml.	5.—	40.—
» » ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	8.—	75.—
» <i>cracovica</i>	2 »	» Steckl.	20.—	—
» <i>hibernica</i>	2 »	» »	20.—	—
» » <i>excelsa pyramidalis</i>	2 »	» »	20.—	—
» » » <i>pyramidalis</i> ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Koniferen.

Juniperus (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» communis suecica	2 jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
» » suecica	3 »	» »	30.—	—
» pachyphloea	2 »	» Säml.	25.—	—
» prostrata	1 »	Sämlinge	10.—	80.—
» »	1 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
» Sabina	2 »	Steckl.	20.—	180.—
» »	3 »	2× verpfl. Steckl.	25.—	220.—
» »	4 »	2× »	30.—	280.—
» humilis (Sabina femina)	2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» scopulorum	1 »	» Säml.	12.—	—
» virginiana tripartita	2 »	» Steckl.	20.—	—

Larix, Lärche.

» dahurica	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
» europaea	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» leptolepis	2 »	» »	7.—	60.—
» »	3 »	» »	10.—	90.—

Libocedrus, Flusszeder.

» decurrens	1 »	Sämlinge	6.—	—
-------------------	-----	----------	-----	---

Picea, Fichte.

» alba	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» »	3 »	» »	6.—	—
» » aus weitem Stand, » 30—50 »	4 »	» »	8.—	70.—
» Alcockiana	2 »	» »	12.—	—
» Engelmanni	2 »	» »	8.—	70.—
» excelsa	2 »	» »	1.50	10.—
» »	3 »	» »	2.—	15.—
» » compacta	2 »	Steckl.	30.—	—
» »	3 »	» »	40.—	—
» » Ellwangeriana	2 »	» »	30.—	—
» » Maxwelli	2 »	» »	30.—	—
» » nana	2 »	» »	25.—	—
» » nidiformis	2 »	» »	25.—	—
» »	3 »	» »	30.—	—
» » parviformis	2 »	» »	30.—	—
» » procumbens	2 »	» »	30.—	—
» » pumila glauca	2 »	» »	30.—	—
» » pygmaea	2 »	» »	30.—	—
» orientalis	2 »	» Säml.	12.—	100.—
» polita	2 »	» »	20.—	180.—
» pungens	2 »	» »	7.—	60.—
» sitkaënsis (sitchensis), ca. 8—15 cm hoch	2 »	» »	5.—	40.—
» »	3 »	» »	10.—	90.—

Pinus, Kiefer.

» austriaca	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
» Cembra	2 »	verpfl. Säml.	20.—	180.—
» »	3 »	» »	25.—	—
» contorta	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
» »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Koniferen.

Pinus (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>Coulteri</i>	1jähr.	Sämlinge	15.—	125.—
» <i>edulis</i>	1 »	»	15.—	—
» <i>excelsa</i>	1 »	»	4.—	30.—
» <i>flexilis</i>	1 »	»	5.—	40.—
» <i>koraïensis</i>	1 »	»	8.—	—
» <i>montana</i>	2 »	»	3.—	25.—
»	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
»	3 »	»	6.—	50.—
» <i>parviflora</i>	2 »	»	20.—	—
» <i>ponderosa</i>	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
»	2 »	»	14.—	120.—
» <i>resinosa</i>	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» <i>Strobus</i>	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
»	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
» <i>sylvestris</i>	2 »	verpfl. Säml.	3.—	20.—
»	2 »	»	10.—	—
» <i>Thunbergi</i>	2 »	»	10.—	—

Pseudolarix, Goldlärche.

» <i>Kaempferi</i>	1 »	Sämlinge	18.—	150.—
»	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—

Pseudotsuga, Douglasanne.

» <i>Douglasi</i>	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
»	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» <i>von Colorado</i>	1 »	Sämlinge	3.—	—
»	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» <i>glauca</i>	2 »	»	5.—	40.—
»	3 »	»	10.—	80.—

Taxodium, Sumpfyzypresse

» <i>distichum</i>	1 »	Sämlinge	20.—	180.—
»	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—

Taxus, Eibenbaum.

» <i>baccata</i>	1 »	Sämlinge	8.—	75.—
»	2 »	»	15.—	140.—
»	4 »	verpfl. Säml.	35.—	300.—
» <i>adpressa</i>	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
» <i>aureo-variegata</i>	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» <i>conica</i>	5 »	»	40.—	—
» <i>erecta</i>	2 »	»	20.—	—
»	3 »	»	25.—	—
» <i>fastigiata</i>	3 »	»	35.—	—
»	4 »	»	35.—	—
» <i>aureo-variegata</i>	2 »	Säml. Steckl.	25.—	—
» <i>imperialis</i>	3 »	»	25.—	—
» <i>Jacksoni</i>	3 »	»	25.—	—
» <i>Nedpath Castle</i>	5 »	»	40.—	—
» <i>pyramidalis</i>	4 »	Säml.	35.—	—
» <i>Overeynderi</i>	2 »	Steckl.	30.—	—
»	3 »	»	35.—	—
» <i>cuspidata</i>	1 »	Sämlinge	10.—	90.—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Koniferen.

Thuya, Lebensbaum.

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
" gigantea ca. 10—25 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	80.—
" " aureo-variegata	2 "	" Steckl.	30.—	—
" " " ca. 10—15 cm hoch	3 "	" "	35.—	—
" " aurescens	2 "	" "	30.—	—
" occidentalis Columna	2 "	" "	30.—	—
" " Ellwangeriana	2 "	" "	18.—	—
" " " ca. 15—25 cm hoch	3 "	" "	20.—	—
" " aurea	2 "	" "	20.—	—
" " Rheingold	2 "	" "	20.—	—
" " erecta	2 "	" "	18.—	—
" " fastigiata	2 "	" "	18.—	—
" " filiformis	2 "	" "	25.—	—
" " Froebeli	2 "	" "	25.—	—
" " globosa	2 "	" "	25.—	—
" " compacta	2 "	" "	25.—	—
" " Hoveyi	2 "	" "	20.—	—
" " " ca. 10—15 cm hoch	3 "	2× verpfl. Steckl.	25.—	—
" " recurva	2 "	verpfl. Steckl.	20.—	—
" " " nana	2 "	" "	25.—	—
" " Riversi	2 "	" "	20.—	—
" " " ca. 10—15 cm hoch	3 "	2× verpfl. Steckl.	25.—	—
" " Rosenthali	2 "	verpfl. Steckl.	25.—	—
" " umbraculifera	2 "	" "	25.—	—
" " Vervaeneana	2 "	" "	20.—	—
" " Wareana	2 "	" "	20.—	—
" " " ca. 10—15 cm hoch	3 "	" "	25.—	—
" " lutescens	2 "	" "	20.—	—
" plicata	2 "	" "	20.—	—
" " pyramidalis	2 "	" "	25.—	—

Thuyopsis, Hibalebensbaum.

" dolabrata	2 "	" "	18.—	—
" " " ca. 10—20 cm hoch	3 "	" "	20.—	—
" " variegata	2 "	" "	18.—	—
" " "	3 "	" "	20.—	—

Tsuga, Hemlockstanne.

" canadensis ca. 6—12 cm hoch	2 "	" Säml.	20.—	180.—
" " " 10—15 " "	3 "	" "	25.—	220.—
" caroliniana 5—10 " "	2 "	" "	25.—	220.—
" " " 8—15 " "	3 "	" "	30.—	—

**Jeder Blumenfreund und Gartenbesitzer sollte Mitglied
der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft**

Berlin N 4, Invalidenstrasse 42

werden, denn diese Gesellschaft vereinigt Gartenfreunde, Gärtner und Wissenschaftler zwecks Zusammenarbeit und gegenseitiger Belehrung! Sie gibt die Zeitschrift „Gartenflora“ und andere Veröffentlichungen heraus, besitzt eine grosse **Gartenbau-Bücherei** und veranstaltet viele belehrende Versammlungen und Besichtigungen.

Junge Laubhölzer.

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt, von anderen Jahrgängen gegeben.

Der 100-Preis kommt von 50 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung. **Bei Mengen unter 50 Stück erhöht sich der Preis um 20 Prozent.**

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmasse sind **ungefähr** angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Acanthopanax , Kraftwurz.				
» spinosum (Aralia pentaphylla)	—	Stecklinge	30.—	—
Acer , Ahorn.				
» campestre, Feldahorn,				
ca. 15— 30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	1.—	8.—
» » » 30— 60 » »	1 »	»	2.—	16.—
» » » 40— 80 » »	2 »	»	3.—	25.—
» » » 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» » » 80—120 » »	3 »	» »	5.—	40.—
» colchicum, siehe A. laetum.				
» dasycarpum (A. eriocarpum) Silberahorn,				
ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	12.—	100.—
» » »	—	Ableger	15.—	—
» lutescens (A. dasyc. fulgens)	—	»	20.—	—
» palmatum	—	»	18.—	—
» » » ca. 30—60 cm hoch	—	verpfl. Ableger	20.—	—
» pulverulentum	—	Ableger	20.—	—
» pyramidale	—	»	18.—	—
» Wieri laciniatum	—	»	18.—	—
» » » ca. 60—100 cm hoch	—	verpfl. Ableger	20.—	—
» Ginnala (A. tataricum Ginnala)				
ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» » » 40—80 » »	2 »	» »	8.—	70.—
» japonicum	1 »	Sämlinge	15.—	—
» laetum rubrum (A. colchicum rubrum) . .	—	Ableger	18.—	—
» » » ca. 50—70 cm hoch	—	verpfl. Ableger	20.—	—
» viride	—	Ableger	18.—	—
Negundo , Eschenahorn				
ca. 50—90 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» argenteo-marginatum robustum . .	—	Ableger	25.—	—
» argenteo-variegatum	—	»	25.—	—
» » » ca. 20—40 cm hoch	—	verpfl. Ableger	30.—	—
» aureo-variegatum	—	Ableger	25.—	—
» » » ca. 30—50 cm hoch	—	verpfl. Ableger	30.—	—
» californicum	—	Ableger	15.—	—
» » » ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
» » » »	—	Ableger	25.—	—
» violaceum	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
» » » »	—	Ableger	15.—	—
» » » ca. 40—80 cm hoch	—	verpfl. Ableger	18.—	—
» palmatum	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
10000 St. M. 400.—				

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Acer (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>platanoides</i> Spitzahorn ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
» » <i>laciniatum</i>	—	Ableger	18.—	—
» » <i>Reitenbachi</i>	—	»	30.—	—
» » <i>Schwedleri</i>	—	»	30.—	—
» <i>Pseudoplatanus</i> Platanenahorn ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
» » <i>euchlorum</i>	—	Ableger	20.—	—
» » <i>purpurascens</i> .. ca. 20—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
» <i>rubrum sanguineum</i>	—	verpfl. Ableger	20.—	—
» » <i>Schlesingeri</i>	—	Ableger	18.—	—
» <i>saccharum</i> , Zuckerahorn ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	18.—	—

» *tataricum* Ginnala, siehe A. Ginnala.**Actinidia**, Strahlengriffel.

» <i>arguta</i>	1jähr.	» »	12.—	100.—
» » .. ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	20.—	—

Aepfel, siehe Wildlinge und Obstsortiment.**Aesculus**, Rosskastanie.

» <i>flava</i> (Pavia) .. ca. 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	10.—	—
» » .. ca. 20—40 » »	2 »	»	18.—	—
» <i>Hippocastanum</i> Rosskastanie ca. 10—20 cm hoch	1 »	»	2.50	20.—
» » .. ca. 40—70 » »	2 »	»	6.—	50.—
» <i>macrostachya</i> (Aesc. parviflora)	—	Ableger	15.—	—
» » .. ca. 40—70 cm hoch	—	verpfl. Ableger	18.—	—
» » .. ca. 80—130 » »	4jähr.	» »	25.—	—

Ailanthus, Götterbaum.

» <i>glandulosa</i> .. ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
--	-----	---------------	-----	---

Akebia, Akebie.

» <i>quinata</i>	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» »	3 »	» »	30.—	—

Alnus, Erle.

» <i>glutinosa</i> , Schwarzerle ca. 150—200 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» » <i>crispa</i>	—	Ableger	10.—	—
» » <i>imperialis</i>	—	»	10.—	90.—
» » .. ca. 50—80 cm hoch	—	verpfl. Ableger	12.—	—
» » .. ca. 70—120 » »	3jähr.	» »	15.—	—
» » <i>incisa</i>	—	Ableger	10.—	90.—
» » <i>rubrinervia</i>	—	»	15.—	—
» <i>incana aurea</i>	—	»	15.—	—
» » <i>laciniata</i>	—	»	10.—	90.—
» » .. ca. 40—70 cm hoch	—	verpfl. Ableger	12.—	—
» » .. ca. 80—130 » »	3jähr.	» »	15.—	—
» <i>japonica</i> , seltene Art	—	Ableger	15.—	—
» <i>macrophylla</i>	—	»	10.—	—
» <i>tinctoria</i>	—	»	15.—	—

Amelanchier, Felsenbirne.

» <i>alnifolia</i> .. ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» <i>Botryapium</i> .. ca. 10—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» » .. ca. 40—70 » »	2 »	»	5.—	40.—
» <i>cretica</i> .. ca. 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» <i>florida</i> (A. oxyodon) .. ca. 10—25 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
» » .. ca. 40—80 » »	2 »	»	5.—	40.—
» » .. ca. 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Amelanchier (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>levis</i> ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
» <i>ovalis</i>	1 »	Sämlinge	4.—	—
» ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» <i>pumila</i>	1 »	Sämlinge	4.—	—
» ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» <i>spicata</i> » 40—80 » »	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
» » 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» » 40—80 » »	3 »	» »	7.—	60.—
» <i>vulgaris</i> (<i>A. rotundifolia</i>) ca. 20—40 » »	2 »	» »	15.—	—

Amorpha, Bastardindigo.

» <i>fruticosa</i>	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» » <i>croceolanata</i>	—	Stecklinge	10.—	—

Ampelopsis, Jungfernein.

» <i>acutifolia dissecta</i>	—	»	10.—	—
» <i>dumetorum laciniata</i>	—	»	10.—	—
» » <i>laciniata</i>	3jähr.	»	15.—	—
» <i>Engelmanni</i>	3 »	»	6.—	50.—
» »	4 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
» <i>hederacea</i> ca. 40—80 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» »	3 »	Stecklinge	6.—	—
» <i>heterophylla humulifolia</i>	1 »	Sämlinge	5.—	—
» <i>hirsuta</i>	—	Stecklinge	6.—	—
» »	3jähr.	»	7.—	—
» <i>macrophylla</i>	—	»	5.—	—
» <i>Maximowiczi</i>	—	»	5.—	—
» »	3jähr.	»	6.—	50.—
» »	4 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
» <i>muralis</i> , siehe <i>A. radicans</i> .	—	Stecklinge	5.—	—
» <i>pubescens</i>	—	»	6.—	—
» »	3jähr.	»	3.—	—
» <i>quinquefolia</i> ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» »	3 »	» »	4.—	30.—
» »	—	Stecklinge	5.—	40.—
» »	3jähr.	»	5.—	—
» <i>radicans</i> (<i>A. muralis</i>)	—	»	6.—	50.—
» »	3jähr.	»	7.—	—
» »	3 »	verpfl. Steckl.	5.—	40.—
» <i>St. Pauli</i>	—	Stecklinge	6.—	50.—
» »	3jähr.	»	5.—	—
» <i>virginiana</i>	3 »	»	6.—	50.—
» »	3 »	verpfl. Steckl.	—	—

Amygdalus, Mandel.

» <i>nana</i> (<i>A. georgica nana</i>), rotblühend.....	—	Ableger	30.—	—
--	---	---------	------	---

Andromeda.

» <i>Catesbaei</i> (<i>Leucothoe</i>)	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
» <i>floribunda</i>	2 »	» »	20.—	—

Aralia, siehe *Acanthopanax*.

Aristolochia, Osterluzei.

» <i>Sipho</i>	1jähr.	» »	15.—	—
» <i>tomentosa</i> ca. 25—40 cm hoch	2 »	» »	15.—	—

Aronia, Zwergvogelbeere.

» <i>arbutifolia</i> ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
» » 40—60 » »	2 »	»	3.—	20.—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Aronia (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 M.
» <i>arbutifolia</i> ca. 20—35 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	—
» » 30—60 » »	3 »	» »	5.—	—
» <i>nigra</i> (<i>A. melanocarpa</i>) » 8—15 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
» » 25—50 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—

Berberis, Berberitze.

» <i>aggregata</i> » 10—20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
» » 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» <i>amurensis</i> » 10—25 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
» <i>brevipaniculata</i> » 10—20 » »	1 »	»	5.—	40.—
» » 15—25 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» <i>caroliniana</i> » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
» <i>concinna</i> » 25—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» <i>Coryi</i> » 10—20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
» » 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» <i>dictiophylla</i> »	1 »	» »	6.—	—
» <i>dulcis</i> (<i>B. buxifolia</i>) . ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» <i>nana</i> »	2 »	» Steckl.	15.—	140.—
» ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	160.—
» <i>Neuberti</i> »	—	Ableger	40.—	—
» <i>Sietoldi</i> ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
» <i>sinensis</i> » 10—25 » »	1 »	»	3.—	25.—
» » 30—60 » »	2 »	»	5.—	40.—
» » 25—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» <i>spathulata</i> » 10—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» » 25—50 » »	2 »	»	4.—	30.—
» <i>subcaulialata</i> » 8—15 » »	1 »	»	5.—	—
» <i>Thunbergi</i> » 10—20 » »	1 »	»	4.—	30.—
» » 30—60 » »	2 »	»	5.—	40.—
» » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» <i>Vernae</i> » 20—40 » »	2 »	» »	10.—	—
» <i>vulgaris</i> » 10—20 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» » 25—50 » »	2 »	»	4.—	30.—
» » 25—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» » 40—70 » »	3 »	» »	6.—	50.—
» <i>atropurpurea</i> .. » 10—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
10000 St. M. 200.—				
» ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» <i>emarginata</i> .. » 10—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» <i>sulcata</i> » 10—20 » »	1 »	»	3.—	25.—
» » 25—50 » »	2 »	»	4.—	—
» <i>Wilsonae</i> » 8—15 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—

Broussonetia

» <i>papyrifera</i>	1 »	verpfl. Säml.	8.—	—
---------------------------	-----	---------------	-----	---

Buddleia, Buddleie.

» <i>variabilis</i> ca. 60—100 cm hoch	2 »	» »	10.—	—
» <i>amplissima</i> » 70—120 » »	2 »	» »	10.—	—
» <i>magnifica</i> » 60—120 » »	2 »	» »	10.—	—
» <i>prostrata</i> » 60—100 » »	2 »	» »	10.—	—
» <i>Veitchiana</i> » 60—100 » »	2 »	» »	10.—	—

Buxus, Buchsbaum.

» <i>japonica</i> , für Hecken vorzüglich geeignet ca. 10—20 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	4.—	30.—
» » 15—30 » »	4 »	» »	5.—	40.—
» <i>aurea</i> » 8—15 » »	3 »	» »	6.—	—
» » 10—20 » »	4 »	» »	7.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Buxus (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>sempervirens</i> (B. <i>arborescens</i>)				
ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	40.—
» » ca. 15—25 » »	4 »	» »	6.—	50.—
» » <i>Handworthi</i> ... » 10—20 » »	4 »	» »	7.—	—
» <i>suffruticosa</i> ... pro 10 lfd. Meter M. 3.—				
» 100 » » » 20.—				

Callicarpa, Schönfrucht.

» <i>americana</i>	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
» <i>japonica</i>	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—

Calycanthus, Gewürzstrauch.

» <i>florida</i> ca. 7—15 cm hoch	1 »	Sämlinge	30.—	280.—
» <i>occidentalis</i> » 10—20 » »	1 »	»	25.—	—
» <i>praecox</i> » 10—20 » »	1 »	»	25.—	—
» » <i>grandiflora</i> » 7—15 » »	1 »	»	25.—	—

Caragana, Erbsenbaum.

» <i>arborescens</i> ca. 30—60 » »	2 »	»	2.—	15.—
» » » 60—100 » »	2 »	»	3.—	25.—
» » » 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» » » 100—150 » »	3 »	»	6.—	50.—
» » <i>Boisii</i> » 10—20 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
» » <i>nana</i> » 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» <i>aurantiaca</i>	1 »	Sämlinge	4.—	—
» <i>brevispina</i> ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	5.—	—

Carpinus, Weissbuche, Hainbuche.

» <i>americana</i> (C. <i>caroliniana</i>) mit schöner Herbstfärbung ... ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» <i>Betulus</i> » 20—40 » »	2 »	Sämlinge	2.—	15.—
» » » 40—80 » »	2 »	»	3.—	20.—
» » » 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	2.—	18.—
» » » 25—50 » »	2 »	»	3.—	20.—
» » » 50—90 » »	3 »	»	6.—	50.—

Carya, Hickorynuss.

» <i>alba</i> » 10—15 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
» » » 15—30 » »	2 »	»	15.—	—
» <i>amara</i> » 20—40 » »	2 »	»	15.—	—
» <i>porcina</i> » 10—20 » »	2 »	»	15.—	—

Cassia.

» <i>Marylandica</i>	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
----------------------------	-----	---------------	------	---

Castanea, Kastanie.

» <i>vesca</i> , Edelkastanie .. ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	40.—
» » » 30—60 » »	2 »	»	8.—	70.—

Catalpa, Trompetenbaum.

» <i>bignonioides</i> (C. <i>syringaeifolia</i>)				
ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—

Ceanothus, Säckelblume.

» <i>americanus</i>	1 »	Sämlinge	8.—	75.—
» » ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—

Celastrus, Baumwürger.

» <i>orbiculata</i>	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
» » ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	10.—	80.—
» » » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
» <i>punctata</i> » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
» <i>scandens</i>	1 »	»	20.—	—
» » »	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—

Cephalanthus, Knopfblume.

» <i>occidentalis</i> ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	10.—	—
---	-----	---	------	---

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Cercidiphyllum , Judasbaumblatt.				
» japonicum	1 jähr.	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» »	—	Ableger	25.—	—
Cercis , Judasbaum.				
» canadensis ca. 8—15 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	25.—	—
» chinensis » 10—20 » »	1 »	»	25.—	—
» Siliquastrum » 8—15 » »	1 »	»	25.—	—
Chaenomeles , siehe Cydonia.				
Chionanthus , Schneeflockenbaum.				
» virginica	1 »	»	20.—	—
Cladrastis (Virgilia), Gelbholz.				
» amurensis Bürgeri	1 »	»	8.—	—
Clematis , Waldrebe.				
» alpina	1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» Davidiana	1 »	» »	5.—	—
» fusca	2 »	» »	8.—	—
» glauca	2 »	» »	8.—	—
» graveolens	1 »	» »	5.—	—
» montana grandiflora	1 »	» »	20.—	—
» » Parkeri	1 »	» »	25.—	—
» » rubens	1 »	» »	20.—	180.—
» paniculata	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» tangutica	1 »	»	8.—	—
» Vitalba	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» »	3 »	» »	10.—	—
» Viticella	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
» »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
» »	3 »	» »	12.—	100.—
Clerodendron				
» trichotomum ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	10.—	—
» »	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Clethra , Clethra				
» acuminata	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
Colutea , Blasenstrauch.				
» cilicica ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Corchorus , siehe Kerria.				
Cornus , Hartriegel.				
» alba Wangenheim	—	Ableger	7.—	60.—
» » ca. 70—100 cm hoch	—	verpfl. Ableger	8.—	70.—
» » ca. 80—120 » »	3 jähr.	» »	9.—	80.—
» » L. siehe C. tatarica.				
» » argenteo-marginata	—	Ableger	12.—	—
» » » marginata ca. 25—50 cm hoch	—	verpfl. Ableger	15.—	—
» » » elegans ca. 40—60 cm hoch	—	Ableger	15.—	—
» » » » ca. 40—60 cm hoch	—	verpfl. Ableger	18.—	—
» » flaviramea	—	Ableger	15.—	—
» » Gouchaulti, starkwachsend, gelbbunt	—	»	15.—	—
» » ca. 20—40 cm hoch	—	verpfl. Ableger	18.—	—
» » nitida	—	Ableger	8.—	—
» » Späthi, goldgelbblättrige	—	»	20.—	—
» alternifolia ca. 15—30 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
» Amomum ca. 40—80 » »	1 »	»	4.—	—
» » ca. 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» »	—	Ableger	10.—	—
» Arnoldiana	—	»	10.—	—
» » ca. 25—50 cm hoch	—	verpfl. Ableger	12.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Cornus (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>asperifolia</i>	—	Ableger	10.—	—
» <i>australis</i> ca. 25—35 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
» „ » 25—50 „ »	2 „	verpfl. Säml.	6.—	—
» <i>Baileyi</i>	—	Ableger	10.—	—
» <i>Bretschneideri</i>	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
» <i>femina</i> (C. <i>stricta</i>)	—	Ableger	10.—	—
» <i>florida</i> , Blumen-Benthamie ca. 10—20 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	12.—	—
» „	1 „	verpfl. Säml.	15.—	—
» <i>glabrata</i>	—	Ableger	10.—	—
» <i>mas</i> (<i>mascula</i>), Kornelkirsche bis 25 cm hoch	1 jähr.	verpfl. Säml.	10.—	80.—
» „ ca. 40—60 „ »	2 „	„ „	20.—	180.—
» <i>obliqua</i>	—	Ableger	12.—	—
» <i>pubescens</i>	—	„	10.—	—
» „ ca. 25—50 cm hoch	—	verpfl. Ableger	12.—	—
» <i>Purpusi</i> » 30—60 „ »	1 jähr.	Sämlinge	4.—	—
» <i>sanguinea</i> » 20—40 „ »	1 „	„	3.—	20.—
» „ ca. 40—70 cm hoch	2 „	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» „ » 40—70 cm hoch	2 „	„ „	5.—	40.—
» <i>stricta</i> , siehe C. <i>femina</i>	2 „	„ „	5.—	40.—
» <i>tatarica</i> (C. <i>alba</i> L.) ca. 50—80 „ »	—	Ableger	10.—	90.—
» „ <i>sibirica</i> , mit korallenrotem Holze ..	—	„	15.—	—
» „ <i>albo-variegata</i>	—	„	—	—
Corylopsis , Scheinhasel.	—	„	25.—	—
» <i>spicata</i>	—	„	—	—
Corylus , Haselnuss.	—	„	15.—	—
» <i>americana</i> , amerikanische Kelchnuss ...	—	„	25.—	200.—
» <i>Avellana atropurpurea</i> , Bluthasel	—	„	30.—	—
» „ <i>aurea</i> , Goldhasel	—	verpfl. Ableger	40.—	—
» „ <i>laciniata</i> , geschlitzblättrig	—	Ableger	25.—	—
» <i>rostrata</i>	—	„	20.—	—
» grossfrüchtige Sorten: (Sortiment siehe Seite 13)				
100 Stck. in 5—10 Sorten meiner Wahl M. 20.—				
1000 „ „ 10—20 „ „ „ 180.—				
Cotoneaster , Zwergmispel.				
» <i>acuminata</i> (C. <i>affinis</i>) ca. 25—50 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
» „ 50—80 „ »	3 „	„ „	18.—	—
» <i>acutifolia</i> (C. <i>pekinensis</i>) ca. 25—40 „ »	2 „	„ „	10.—	90.—
» „ <i>villosula</i> » 30—60 „ »	2 „	„ „	12.—	100.—
» <i>ambigua</i> » 40—70 „ »	2 „	„ „	12.—	100.—
» <i>applanata</i> (C. <i>Dielsiana</i>)	1 „	„ „	7.—	60.—
» „ ca. 30—60 cm hoch	2 „	„ „	12.—	100.—
» „ » 40—80 „ »	3 „	„ „	15.—	—
» <i>bullata</i> , stark- und hochwachsend ca. 40—80 cm hoch	2 „	„ „	9.—	80.—
» „ » 50—90 „ »	3 „	„ „	12.—	100.—
» <i>divaricata</i> » 40—80 „ »	2 „	„ „	9.—	80.—
» „ » 40—80 „ »	3 „	„ „	12.—	100.—
» <i>horizontalis</i> , Felsenstrauch ca. 10—20 „ »	2 „	„ „	9.—	80.—
» „ » 20—30 „ »	3 „	„ „	12.—	100.—
» <i>ignava</i> , neu » 20—40 „ »	2 „	„ „	15.—	—
» <i>integerrima</i> » 20—40 „ »	2 „	„ „	12.—	—
» <i>laxiflora</i> » 20—40 „ »	2 „	„ „	12.—	—
» „ » 25—50 „ »	3 „	„ „	15.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Cotoneaster (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» moupinensis ca. 30—60 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	9.—	80.—
» multiflora » 20—40 » »	1 »	» »	8.—	70.—
» nitens » 40—80 » »	2 »	» »	12.—	—
» nummularia	1 »	» »	8.—	70.—
» » orbicularis	1 »	» »	8.—	70.—
» » racemiflora	1 »	» »	8.—	70.—
» obtusata (C. obtusata). ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	10.—	—
» racemiflora Meyer. » 25—40 » »	2 »	» »	12.—	—
» » soongarica ... » 60—100 » »	2 »	» »	12.—	—
» tomentosa » 25—40 » »	2 »	» »	15.—	—
» vulgaris » 20—40 » »	2 »	» »	12.—	—
» Zabeli » 30—60 » »	3 »	» »	15.—	—

Crataegus, Dorn.

» coccinea , scharlachfrüchtig				
ca. 20—40 » »	2 »	» »	12.—	100.—
» »..... » 40—80 » »	2 »	» »	15.—	140.—
» orientalis » 20—40 » »	2 »	» »	8.—	—
» oxyacantha (einsteinige), Weissdorn				
ca. 20—40 cm hoch, 10000 St. M. 60.—	1 »	Sämlinge	1.—	7.—
ca. 40—70 cm hoch, 10000 » » 120.—	1 »	»	2.—	14.—
» » 4—7 mm Durchmesser				
ca. 30—50 cm hoch, 10000 » » 120.—	2 »	verpfl. Säml.	2.—	14.—
» » 5—8 mm Durchmesser				
ca. 50—70 cm hoch, 10000 » » 200.—	3 »	» »	2.50	22.—
» » 8—12 mm Durchmesser				
ca. 70—100 cm hoch, 10000 » » 250.—	3 »	» »	3.—	28.—
» prunifolia , glänzend dunkelgrüne Be-				
laubung, zu verwenden wie C. coccinea				
ca. 80—130 cm hoch	3 »	» »	6.—	50.—
» Pyracantha	1 »	» »	10.—	—
» » Lalandi , immergrün, korallenrote				
Früchte.....	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» sanguinea ca. 7—15 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» splendens , dunkelgrüne, glänzende Be-				
laubung, zu verwenden wie C. coccinea				
ca. 80—120 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—

Cydonia (Chaenomeles), Quitte.

» japonica , rotblühende Quitte				
ca. 25—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» » alba , einfach weiss.....	3 »	verpfl. Ableger	25.—	—
» » atrococcinea plena , gefüllt scharlach	3 »	» »	25.—	—
» » Aurora , lachsrot.....	3 »	» »	25.—	—
» » candicans , reinweiss.....	3 »	» »	25.—	—
» » eximia , hellrot.....	3 »	» »	20.—	—
» » Gaujardi , rosa, weiss und karmin..	3 »	» »	20.—	—
» » Mallordi , hellrot.....	3 »	» »	20.—	—
» » Moerlosi , rosa, weiss und karmin..	3 »	» »	20.—	—
» » nivea extus coccinea , niederliegend	3 »	» »	20.—	—
» » rubra grandiflora , gross, lebhaft rot	3 »	» »	25.—	—
» » sanguinea plena , gefüllt, blutrot..	3 »	» »	25.—	—
» » umbilicata , hellrosa.....	3 »	» »	20.—	—
» » versicolor lutescens , gelblichrot...	3 »	» »	20.—	—
» » in 5—10 Varietäten nach meiner				
Wahl	3 »	» »	20.—	180.—
» lagenaria Wilsoni .. ca. 25—50 cm hoch	—	» »	20.—	—
» Wilsoni	3 jähr.	» »	25.—	—
» Maulei , niedrig bleibend, zinnoberrot...	3 »	» »	25.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

	Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
			M.	M.
Cytisus , Gaisklee.				
» <i>austriacus</i> ca. 15—30 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
» <i>capitatus</i> » 15—30 » »	1 »	»	3.—	20.—
» <i>Laburnum</i> , siehe <i>Laburnum vulgare</i> .				
» <i>nigricans</i> ca. 25—50 cm hoch	1 »	»	4.—	—
» » 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» <i>sempervirens</i> » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» <i>supinus</i> » 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» <i>triflorus</i> » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
Daphne , Seidelbast				
» <i>Mezereum</i> , dunkelrot blühend				
ca. 15—25 » »	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
Decaisnea .				
» <i>Fargesii</i> » 25—50 » »	1 »	Sämlinge	3.—	—
» » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Desmodium , Wandelklee.				
» <i>penduliflorum</i>	—	Ableger	40.—	—
Deutzia , Deutzie.				
» <i>crenata candidissima</i> , reinweiss	—	Stecklinge	10.—	90.—
» » <i>eburnea</i> , elfenbeinfarbige Blüten...	—	»	12.—	—
» » <i>Fortunei</i>	—	Stecklinge	10.—	—
» » <i>macrosepala</i> , grosskelchig, weiss..	—	»	10.—	90.—
» » <i>magnifica</i> , gefüllt, weiss	—	»	15.—	—
» » <i>Pride of Rochester</i> , weissgefüllt..	—	Stecklinge	10.—	90.—
» » » » ca. 40—70 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» » » » » 60—100 » »	4 »	» »	14.—	—
» » <i>rosea plena</i>	—	Stecklinge	10.—	90.—
ca. 40—70 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	110.—
» » » » » 80—130 » »	4 »	» »	14.—	—
» <i>discolor floribunda</i> , reinweiss				
ca. 25—40 » »	3 »	» »	15.—	—
» » <i>grandiflora</i> , weiss, leicht rosa gefärbt	2 »	» »	15.—	—
» <i>gracilis</i> , bekannte Treibsorte	2 »	» »	10.—	—
» » <i>aurea</i> , goldgelb belaubt	2 »	» »	10.—	—
» » » »	3 »	» »	12.—	—
» » <i>campanulata</i> , milchweiss	2 »	» »	10.—	—
» » ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» » <i>marmorata</i> , Blätter marmoriert...	2 »	» »	10.—	—
» » ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» » <i>medio-picta</i> , buntblättrig				
ca. 15—30 » »	3 »	» »	10.—	—
» » <i>multiflora</i> , reichblühend, weiss	2 »	» »	10.—	—
» » <i>rosea</i> , rosablühend	2 »	» »	10.—	—
» » ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» <i>hybrida Watereri</i> , grossblumig	—	Stecklinge	10.—	90.—
» » ca. 40—70 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» » » 60—100 » »	4 »	» »	14.—	—
» » <i>Welsi</i> , reinweiss gefüllt	—	Stecklinge	10.—	90.—
» » ca. 40—70 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» » » 60—100 » »	4 »	» »	14.—	—
» <i>Lemoinei</i> , vorzüglich zum Treiben	2 »	» »	10.—	—
» » <i>compacta</i>	2 »	» »	10.—	—
» » ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» <i>parviflora</i> , reichblühend, weiss	2 »	» »	10.—	—
» <i>staminea</i>	—	Stecklinge	10.—	90.—
in 10—20 Sorten meiner Wahl	—	»	9.—	80.—
Diervilla (Weigelia).				
» <i>amabilis</i> , hellrosa	—	Stecklinge	18.—	—
» » <i>alba</i> , weissblühend	—	»	20.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

		Alter	Qualität.	100 St. M.	1000 St. M.
Diervillea (Fortsetzung):					
»	biformis, hell- und dunkelrosa	—	Stecklinge	18.—	—
»	Chamaeleon, karmin und hellrosa	—	»	18.—	—
»	Edouard André, dunkelrot	—	»	20.—	—
»	Eva Rathke, leuchtend karmin	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
»	floribunda, fleischfarbig	2 »	»	20.—	—
»	Groenewegeni, rosenrot	—	Stecklinge	18.—	—
»	hortensis aurea	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
»	» giganteaeflora, mattrosa	—	Stecklinge	20.—	—
»	intermedia, rosa und weiss	—	»	18.—	—
»	» Desboisii	—	»	18.—	—
»	» Isoline, hellrosenrot	—	»	18.—	—
»	Lavallei, leuchtend dunkelpurpur	—	»	18.—	—
»	Lowi, dunkelpurpurrot	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
»	Mad. Couturier, lebhaft rosa	2 »	»	20.—	—
»	» Lemoine, hell- und dunkelrosa	—	Stecklinge	18.—	—
»	» Tailler, weiss- und blassrosa	—	»	18.—	—
»	praecox	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
»	Président Duchartre	2 »	»	20.—	—
»	styriaca	2 »	»	25.—	—
»	Vanhouttei	—	Stecklinge	18.—	—
»	venosa	—	»	18.—	—
»	Verschaffelti	—	»	18.—	—
»	in 5–10 Sorten nach meiner Wahl	—	»	17.—	160.—
Diospyros , Dattelpflaume.					
»	virginiana ca. 20–40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
Elaeagnus , Ölweide.					
»	angustifolia	1 »	»	6.—	50.—
»	argentea	—	Ableger	25.—	—
»	» ca. 20–30 cm hoch	—	verpfl. Ableger	30.—	—
»	edulis (E. longipes) » 15–30 » »	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
»	» » 25–50 » »	3 »	»	15.—	—
»	» Kleine Sträucher » 50–80 » »	4 »	»	20.—	—
Evonymus , Spindelbaum.					
»	atropurpurea	1 »	»	10.—	—
»	europaea ca. 25–50 cm hoch	2 »	»	10.—	—
»	planipes » 10–15 » »	2 »	»	10.—	—
»	» » 20–35 » »	3 »	»	15.—	—
»	radicans	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
»	»	3 »	»	10.—	—
»	» variegata	2 »	»	12.—	—
Exochorda , Scheinfelsenbirne.					
»	Alberti ca. 10–20 cm hoch	1 »	Sämlinge	20.—	—
»	grandiflora » 10–20 » »	1 »	»	20.—	—
»	» » 40–80 » »	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
Fagus , Buche.					
»	sylvatica, Rotbuche ca. 15–25 » »	1 »	Sämlinge	1.—	8.—
»	» » 30–60 » »	2 »	»	2.—	18.—
»	» » 60–100 » »	3 »	»	5.—	40.—
»	» » 30–60 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Fontanesia , Fontanesie.					
»	phillyreoides	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
Forsythia , Forsythie.					
»	intermedia	2 »	»	15.—	140.—
»	» ca. 60–100 cm hoch	3 »	»	18.—	160.—
»	» densiflora	2 »	»	15.—	—
»	» vitellina	2 »	»	15.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

	Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
			M.	M.
Forsythia (Fortsetzung):				
» <i>suspensa</i>	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
» <i>Sieboldi</i>	2 »	»	18.—	—
Fraxinus , Esche.				
» <i>excelsior</i> , gemeine Esche				
ca. 10—20 cm hoch, 10000 St. M. 50.—	1 »	Sämlinge	1.—	6.—
» <i>mandschurica</i>	1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» <i>Ornus</i> , Blumenesche ca. 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
» » » 20—40 » »	2 »	»	8.—	—
» <i>pubescens</i> » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
Genista , Ginster.				
» <i>praecox</i>	2 »	» Steckl.	20.—	—
» <i>scoparia</i> , einheimischer Ginster				
ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» <i>tinctoria</i> » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» » <i>flore pleno</i>	2 »	» Steckl.	20.—	—
Gleditschia , Gleditschie,				
» <i>japonica</i>	2 »	» Säml.	10.—	—
» <i>triacanthos</i> , Christusdorn				
ca. 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» » » 40—70 » »	2 »	»	6.—	50.—
Halesia , Halesie.				
» <i>tetraptera</i> » 10—20 » »	1 »	»	15.—	—
Hamamelis , Zaubernuss.				
» <i>virginica</i> » 8—15 » »	1 »	»	14.—	120.—
» » » 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	16.—	150.—
» » » 25—50 » »	3 »	»	20.—	—
Hydrangea , Hortensie.				
» <i>paniculata grandiflora</i>	2 »	verpfl. Steckl.	14.—	120.—
Hypericum , Hartheu, Johanniskraut.				
» <i>Ascyrum</i>	2 »	Sämlinge	4.—	—
» » »	3 »	»	6.—	—
» » <i>macropetalum</i>	2 »	»	4.—	—
» » »	3 »	»	6.—	—
» <i>calycinum</i>	1 »	»	3.—	—
» <i>hircinum</i> ca. 40—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» <i>Moserianum</i> » 20—40 » »	2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» <i>patulum</i>	3 »	Sämlinge	15.—	—
» <i>Henryi</i>	1 »	»	10.—	—
Idesia , Orangenkirsche.				
» <i>polycarpa</i> ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Ilex , Stechhölse.				
» <i>Aquifolium</i> » 10—25 » »	2 »	» »	9.—	80.—
» » » 25—40 » »	4 »	» »	16.—	—
» <i>crenata</i>	2 »	» »	14.—	120.—
» <i>decidua</i> ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	15.—	—
» <i>verticillata</i> (Prinos) » 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
Indigofera .				
» <i>Gerardiana</i> (Dosua)	1 »	»	8.—	—
Ita , Rosmarinweide.				
» <i>virginica</i>	—	Stecklinge	15.—	—
Juglans , Walnuss.				
» <i>cinerea</i> ca. 100—150 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	15.—	—
» <i>cordiformis</i> » 80—130 » »	2 »	»	15.—	—
» <i>mandschurica</i> » 30—50 » »	1 »	»	10.—	—
» » » 40—70 » »	2 »	»	15.—	120.—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Juglans (Fortsetzung):					
» nigra	ca. 30— 50 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	10.—	—
» »	» 50— 90 » »	2 »	»	15.—	—
» regia	bis 40 » »	1 »	»	8.—	70.—
» »	» 50—100 » »	2 »	»	10.—	90.—
» rupestris	» 30— 60 » »	1 »	»	10.—	—
Kalmia , Kalmie.					
» glauca		2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
» latifolia		3 »	» »	40.—	—
Kerria (Corchorus), Ranunkelstrauch.					
» japonica		2 »	» Steckl.	15.—	—
» » argenteo-marginata		2 »	» »	15.—	—
» » aurea		2 »	» »	15.—	—
» » flore pleno		2 »	» »	18.—	—
» » laciniata		2 »	» »	15.—	—
Koelreuteria , Koelreuterie.					
» paniculata		1 »	Sämlinge	8.—	—
Laburnum , Goldregen.					
» alpinum	ca. 15—30 cm hoch	1 »	»	4.—	30.—
» »	» 30—60 » »	1 »	»	5.—	—
» vulgare (Cytisus Lab.)	» 15—30 » »	1 »	»	3.—	20.—
Lespedeza , Buschklees.					
» bicolor		1 »	»	10.—	—
Leycesteria					
» formosa		1 »	»	6.—	—
Ligustrum , Rainweide.					
» acuminatum		2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
» Ibota		2 »	» »	8.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
» insulare		2 »	» »	8.—	—
» macrocarpum		2 »	» »	8.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
» medium		2 »	» »	8.—	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
» ovalifolium	» 40—60 » »	3 »	» »	5.—	40.—
» »	» 60—80 » »	3 »	» »	6.—	50.—
» Regelianum		2 »	» »	8.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
» sinense Stauntoni		2 »	» »	8.—	—
» vulgare	ca. 30— 50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
» »	» 50—100 » »	3 »	» »	4.—	35.—
» »	» 40— 60 » »	3 »	verpfl. Steckl.	4.—	30.—
» »	» 60— 80 » »	3 »	» »	5.—	40.—
» » chlorocarpum (fructu luteo)		2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» »	ca. 25—40 cm hoch	—	Stecklinge	8.—	—
» » italum		—	»	6.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
Liquidambar , Amberbaum.					
» styraciflua		1 »	Sämlinge	7.—	60.—
» »	ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Liriodendron , Tulpenbaum.					
» tulipifera		1 »	Sämlinge	15.—	120.—
Lonicera , Heckenkirsche.					
» alpigena		1 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» amoena alba	ca. 40—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »		—	Stecklinge	8.—	70.—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Lonicera (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>bella</i> ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	—
» <i>canadense</i> (L. ciliata). » 15—30 » »	1 »	»	6.—	—
» <i>Caprifolium</i> Hybriden ca. 40—80 » »	1 »	»	10.—	—
» » Hybriden » 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
» <i>chrysantha</i> » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» » » 40—70 » »	2 »	»	6.—	50.—
» <i>coerulea</i> »	1 »	»	4.—	—
» <i>coerulescens</i> »	—	Stecklinge	10.—	—
» <i>gracilipes</i> »	—	»	12.—	—
» <i>involucrata</i> »	—	»	10.—	—
» » <i>flavescens</i> »	—	»	10.—	—
» » <i>serotina</i> »	—	»	12.—	—
» <i>Kesselringi</i> »	—	»	12.—	—
» <i>Korolkowi</i> »	—	»	12.—	—
» <i>Ledebouri</i> »	—	»	12.—	—
» <i>minutiflora</i> »	—	»	12.—	—
» <i>Morrowi</i> ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
» » » 25—50 » »	2 »	»	5.—	—
» » »	—	Stecklinge	10.—	—
» » × <i>tatarica</i> ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
» <i>myrtilloides</i> »	—	Stecklinge	10.—	—
» <i>nigra</i> ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
» <i>nitida</i> »	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» <i>parvifolia</i> »	—	Stecklinge	10.—	—
» <i>Periclymenum</i> ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
» <i>pileata</i> »	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» <i>Ruprechtiana</i> »	—	Stecklinge	10.—	—
» <i>Schmitziana</i> ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	—
» » »	—	Stecklinge	10.—	—
» <i>segreziensis</i> »	—	»	10.—	—
» <i>species chinense</i> »	—	»	10.—	—
» <i>tatarica</i> ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
» » » 60—100 » »	2 »	»	6.—	50.—
» » <i>alba rosea</i> »	—	Stecklinge	12.—	100.—
» » <i>bicolor</i> »	—	»	12.—	—
» » <i>pulcherrima</i> »	—	»	12.—	100.—
» » <i>rosea grandiflora</i> »	—	»	12.—	100.—
» » <i>ruberrima</i> »	—	»	12.—	—
» » <i>splendens</i> »	—	»	12.—	—
» » <i>virginalis</i> »	—	»	12.—	100.—
» » <i>grandiflora</i> »	—	»	12.—	100.—
» <i>tibetica</i> ca. 40—80 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
» <i>Xylosteum</i> » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
» » » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	20.—
» » » 60—100 » »	3 »	»	4.—	30.—

Magnolia, Magnolie.

» <i>hypoleuca</i> »	1 »	» »	30.—	—
» <i>Kobus</i> ca. 8—15 cm hoch	1 »	Sämlinge	20.—	—
» » »	1 »	verpfl. Säml.	25.—	—
» » ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	35.—	—
» <i>tripetala</i> »	1 »	» »	30.—	—

Mahonia, Mahonie.

» <i>Aquifolium</i> »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
» » ca. 10—25 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
» » » 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Malus , Apfel.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>baccata mandschurica</i> ca. 60—100 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
» <i>communis</i> , siehe Obstwildlinge.				
Menispermum , Mondsame.				
» <i>canadense</i>	1 »	»	12.—	—
Morus , Maulbeere.				
» <i>alba</i> bis 25 cm hoch 10000 St. M. 180.—	1 »	»	3.—	20.—
Myrica , Wachsmyrte, Gagel.				
» <i>cerifera</i> ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Nyssa , Tupelobaum, Nymphenbaum.				
» <i>aquatica</i> ca. 15—30 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
Phellodendron , Korkbaum.				
» <i>amurense</i> ca. 15—30 » »	1 »	»	7.—	60.—
» <i>japonicum</i> ca. 10—20 » »	1 »	»	7.—	60.—
Philadelphus , Pfeifenstrauch.				
» <i>Billiardi</i>	—	Stecklinge	10.—	90.—
» <i>brachybotrys</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>columbianus</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>cordifolius</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>coronarius myrtifolius</i>	—	»	10.—	—
» <i>Falkoneri</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>globosus</i>	—	»	10.—	—
» <i>gloriosus</i>	—	»	12.—	—
» <i>Gordonianus</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>grandiflorus</i>	—	»	12.—	110.—
» » <i>speciosissimus</i>	—	»	10.—	—
» <i>inodorus</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>Keteleeri</i>	—	»	10.—	—
» <i>latifolius</i>	—	»	10.—	90.—
» » <i>pendulifolius</i>	—	»	10.—	—
» <i>Lemoinei erectus</i>	2 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	110.—
» » <i>erectus grandiflorus</i>	2 »	» »	15.—	—
» » » ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» <i>Lewisi</i>	—	Stecklinge	10.—	—
» <i>nivalis</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>pubescens</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>sanguineus</i>	—	»	12.—	—
» <i>Satsumi Yokohama</i>	—	»	10.—	90.—
» <i>Schrenki</i>	—	»	10.—	—
» <i>tenuifolius</i>	—	»	10.—	—
» <i>tomentosus</i>	—	»	10.—	—
» <i>undulatus</i>	—	»	10.—	—
» <i>Zeyheeri</i>	—	»	10.—	90.—
» » ca. 25—50 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
» in 10—20 Sorten meiner Wahl	—	Stecklinge	9.—	80.—
Physocarpus , Blasenspiere.				
» <i>amurensis</i> ca. 60—100 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
» <i>opulifolius</i> ca. 60—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» » <i>inebrians</i>	—	Stecklinge	8.—	—
» » <i>luteus</i>	—	»	8.—	—
Pirus <i>arbutifolia</i> , siehe Aronia.				
» <i>communis</i> }				
» <i>Malus</i> } siehe Wildlinge.				

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Platanus, Platane.

» occidentalis pyramidalis	—	Ableger	18.—	150.—
» » pyramidalis ca. 50—80 cm hoch	—	verpfl. Ableger	30.—	280.—
» » Suttneri, buntblättrig	—	Ableger	25.—	—

Populus, Pappel.

» angulata cordata robusta ca. 70—120 cm hoch	—	Stecklinge	8.—	—
» balsamifera	—	»	5.—	—
» » ca. 50—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
» canadensis » 70—120 » »	—	Stecklinge	3.—	25.—
» » » 80—140 » »	3jähr.	»	4.—	30.—
» » betulifolia. » 50—80 » »	—	»	5.—	—
» » laevigata	—	»	5.—	—
» » van Geerti aurea ca. 50—80 cm hoch	—	»	8.—	—
» caudina..... » 60—100 » »	—	»	5.—	—
» Carrièri..... » 70—100 » »	—	»	5.—	—
» charcowiensis..... » 80—130 » »	—	»	6.—	—
» Eucalyptus » 80—120 » »	—	»	5.—	—
» hybrida » 40—70 » »	—	»	5.—	—
» incrassata » 60—100 » »	—	»	5.—	—
» nigra fastigiata, Pyramidenpappel ca. 60—100 cm hoch	—	»	4.—	30.—
» » fastigiata.... » 70—120 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	40.—
» » » 150—200 » »	4 »	» »	6.—	50.—
» rosea	—	Stecklinge	6.—	—
» Wislizeni ca. 80—130 cm hoch	—	»	6.—	—

Potentilla, Fünffingerstrauch.

» Friedrichseni ca. 30—60 » »	2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» » » 40—80 » »	3 »	» Steckl.	8.—	—
» fruticosa..... » 40—80 » »	2 »	Sämlinge	3.—	20.—
» » » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» » mandschurica » 30—60 » »	2 »	»	4.—	—
» » parvifolia..... » 40—80 » »	3 »	» Steckl.	8.—	—
» micrandra » 25—50 » »	2 »	» Säml.	4.—	—
» ochroleuca..... » 25—50 » »	2 »	» »	4.—	—

Prunus, Kirsche und Pflaume.

» japonica alba plena (P. sinensis alba plena).....	—	» Ableger	30.—	—
» » rosea plena	—	» »	30.—	—
» Laurocerasus ca. 10—15 cm hoch	2jähr.	Steckl.	8.—	—
» » » 20—35 » »	3 »	» »	10.—	—
» » rotundifolia.... » 10—15 » »	2 »	» »	10.—	—
» » » 20—40 » »	3 »	» »	12.—	—
» » schipkaënsis... » 20—35 » »	2 »	» Säml.	8.—	—
» » » 25—40 » »	4 »	verpflanzte	12.—	—
» lusitanica pyramidalis ca. 10—15 » »	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
» » pyramidalis ... » 20—30 » »	4 »	» »	15.—	—
» Maacki..... » 40—80 » »	2 »	» Säml.	10.—	—
» Padus » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
» » » 40—70 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» » » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» Pissardi nigra » 40—70 » »	—	Stecklinge	20.—	—
» Pseudocerasus » 20—40 » »	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
» » » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Prunus (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» Sargenti ca. 10—20 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
» » 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» serotina » 30—60 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» sinensis , siehe <i>P. japonica</i> .				
» spinosa ca. 40—70 » »	1 »	»	2.—	15.—
» » 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	2.—	18.—
10000 St. M. 150.—				
» triflora ca. 40—70 cm hoch	2 »	» »	6.—	—
» virginiana » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
» » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—

Ptelea, Lederblume.

» trifoliata	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» ca. 30—70 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—

Pterocarya, Flügelnuss.

» fraxinifolia	—	Ableger	20.—	—
» laevigata	—	»	20.—	—
» sorbifolia (<i>P. rhoifolia</i>)	—	»	20.—	—
» ca. 40—70 cm hoch	—	verpfl. Ableger	25.—	—
» 1 jähr.	»	Säml.	10.—	—

Pterostyrax, Flügelstorax.

» corymbosa	—	Ableger	15.—	—
» hispida	1 jähr.	Sämlinge	6.—	50.—

Pyracantha, Feuerdorn.

» coccinea	1 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» » Lalandi	2 »	» Steckl.	15.—	—

Quercus, Eiche.

» Cerris ca. 30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	8.—	70.—
» coccinea » 15—30 » »	1 »	»	6.—	50.—
» palustris » 30—60 » »	2 »	»	10.—	90.—
» pedunculata » 10—25 » »	1 »	»	1.50	12.—
10000 St. M. 100.—				
» ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	3.—	20.—
10000 St. M. 180.—				
» phellos ca. 10—25 cm hoch	1 »	»	6.—	50.—
» Prinos » 10—20 » »	1 »	»	6.—	—
» rubra » 10—20 » »	1 »	»	2.—	18.—
10000 St. M. 150.—				
» ca. 30—60 cm hoch	1 »	»	4.—	30.—
» » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» tinctoria » 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—

Rhamnus, Faulbaum.

» alnifolia » 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» carinthiaca » 20—40 » »	2 »	» »	10.—	—
» cathartica » 10—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» » 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» chlorocarpa » 10—25 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
» Erythroxylon » 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» Frangula » 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
» infectoria » 10—25 » »	1 »	»	5.—	—
» japonica » 10—25 » »	1 »	»	5.—	—
» utilis » 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—

Rhodora (Rhododendron).

» canadensis	2 »	» »	25.—	—
---------------------------	-----	-----	------	---

Rhodotypus, Scheinkerrie.

» kerrioides ca. 15—30 cm hoch	1 »	» »	20.—	150.—
---	-----	-----	------	-------

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Rhus, Sumach.					
» <i>radicans</i>	ca. 10—25 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	10.—	—
» <i>semialata Osbecki</i> ..	» 20—40 » »	1 »	»	10.—	—
» <i>typhina</i>	» 25—50 » »	1 »	»	10.—	—
» <i>verniciifera</i>	» 15—30 » »	1 »	»	10.—	80.—
Ribes, Stachelbeere.					
» <i>alpinum</i>		—	verpfl. Ableger	7.—	60.—
» » <i>pumilum</i>		—	» »	7.—	60.—
» <i>aureum</i>	ca. 70—100 cm hoch	—	» »	7.—	60.—
» <i>divaricatum</i>	» 10—20 » »	1 jähr.	Sämlinge	5.—	—
» <i>floridum</i>		—	Stecklinge	10.—	—
» <i>Grossularia</i>	ca. 10—20 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
» »	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	—
» »	» 60—100 » »	2 »	» Steckl.	8.—	—
» <i>intermedium</i>		—	Stecklinge	10.—	—
» <i>oxyacanthoides</i>		—	»	8.—	—
» <i>sanguineum</i>		—	»	12.—	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	—	verpfl. Ableger	15.—	—
» » <i>carneum</i>		—	Stecklinge	12.—	—
» »	ca. 60—100 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Ableger	15.—	—
» » <i>flore pleno</i> ...	» 30—50 » »	—	» »	18.—	—
» » <i>grandiflorum</i>		—	Stecklinge	12.—	—
» »		—	verpfl. Ableger	15.—	—
» <i>subvestitum</i>		—	Stecklinge	8.—	—
Robinia, Akazie.					
» <i>Pseudacacia</i>	ca. 40—80 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
» »	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Rosa, Rose.					
» <i>alba</i> Mad. Plantier		—	Stecklinge	15.—	—
» <i>canina</i>	2—3 mm Durchmesser 10000 St. M. 45.—	1 jähr.	Sämlinge	1.—	5.—
» »	3—5 mm Durchmesser 10000 St. M. 180.—	1 »	»	2.50	20.—
» »	5—8 mm Durchmesser	1 »	»	4.—	30.—
» » <i>caucasica</i>		1 »	»	5.—	—
» »		1 »	»	5.—	—
» <i>ferox</i>		2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» <i>laxa</i>	3—5 mm Durchmesser	2 »	» »	6.—	50.—
» »	5—8 » »	2 »	» »	6.—	—
» <i>lucida</i>		1 »	Sämlinge	5.—	—
» <i>multiflora</i>	ca. 40—80 cm hoch	1 »	»	6.—	—
» <i>pisocarpa</i>		1 »	»	6.—	—
» <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose					
» »	2—3 mm Durchm., 10000 St. M. 50.—	1 »	»	1.—	6.—
» »	3—5 mm Durchmesser	1 »	»	2.50	20.—
» »	5—8 » »	1 »	»	4.—	30.—
» »	3—5 mm Durchm., ca. 30—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	2.50	22.—
» »	5—8 » »	2 »	» »	4.—	32.—
» <i>rubrifolia</i> (R. ferruginea)		1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» <i>rugosa</i> , Apfelrose ...	ca. 10—25 cm hoch	1 »	»	3.—	25.—
» »	» 30—60 » »	2 »	»	8.—	—
» » <i>alba</i>	» 10—25 » »	1 »	»	3.—	25.—
» »	» 30—60 » »	2 »	»	6.—	50.—
» <i>tomentosa</i>	» 40—80 » »	2 »	»	6.—	—
» <i>Wichuraiana</i>		1 »	»	8.—	—
Rubus, Brombeere:					
» <i>Loganbeery</i>		1 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» <i>phoenicolasius</i>		1 »	» »	20.—	—
» <i>Theodor Reimers</i>		1 »	» »	15.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Salix, Weide.

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>alba</i> Casteriana....ca. 80—140 cm hoch	—	Stecklinge	4.—	—
» » » » 50—100 » »	—	verpfl. Steckl.	5.—	—
» » <i>splendens</i> (regalis) ca. 70—120 » »	3jähr.	Stecklinge	5.—	—
» <i>babylonica pendula</i> » 80—130 » »	—	»	5.—	—
» <i>babylonica ramulis aureis pendula</i> ca. 30—50 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
» Blaue Weide des Flusses Ili, siehe <i>S. tenuifolia</i> .				
» Braune Weide von Fergana ca. 70—100 cm hoch	—	Stecklinge	5.—	—
» <i>candida</i> » 80—120 » »	—	»	4.—	—
» <i>caprea</i> » 70—120 » »	—	»	5.—	—
» <i>caroliniana</i> » 50— 80 » »	—	»	5.—	—
» <i>cinerea</i> , ähnlich <i>S. caprea</i> ca. 80—120 cm hoch	—	»	5.—	—
» » » 40— 70 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
» » <i>tricolor</i> » 40— 80 » »	—	Stecklinge	6.—	—
» <i>coccinea</i> (kermesina) » 80—120 » »	—	»	5.—	—
» <i>cotinifolia</i> » 70—120 » »	—	»	4.—	—
» <i>elegantissima</i> » 70—120 » »	—	»	5.—	—
» <i>hippophaëfolia</i> » 80—130 » »	—	»	4.—	—
» » » 40— 80 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	5.—	—
» <i>lisopoclados</i> » 40— 80 » »	—	Stecklinge	5.—	—
» <i>lou cheou</i> » 70—120 » »	—	»	4.—	—
» <i>Medemii</i> » 60—100 » »	—	»	5.—	—
» <i>Muscina</i> » 80—130 » »	—	»	5.—	—
» <i>Petzoldi pendula</i> ... » 70—120 » »	—	»	5.—	—
» <i>phylicifolia</i>	—	»	5.—	—
» <i>pischpekensis</i>	—	»	6.—	—
» <i>pontederana</i> , männlich ca. 80—120 cm hoch	—	»	5.—	—
» » » 40— 80 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
» <i>pulchra</i> » 100—150 » »	—	Stecklinge	5.—	—
» » <i>ruberrima</i> ... » 80—130 » »	—	»	6.—	—
» » » » 30— 60 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
» <i>rosmarinifolia</i> » 30— 60 » »	—	Stecklinge	7.—	—
» <i>rotundifolia</i> » 40— 70 » »	—	»	4.—	—
» <i>Sacramentana</i> » 80—130 » »	—	»	6.—	—
» » » 50—100 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
» <i>Salomoni</i>	—	Stecklinge	6.—	—
» <i>Sieboldi</i>ca. 70—120 cm hoch	—	»	6.—	—
» <i>tenuifolia</i> (Blaue Weide des Flusses Ili) ca. 70—120 cm hoch	—	»	5.—	—
» <i>vitellina Britzensis</i> » 70—120 » »	—	»	5.—	—
» » <i>Britzensis</i> ... » 40— 80 » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	—
» <i>Wilson</i> Nr. 734.....	—	Stecklinge	7.—	—
» » » 4367a.....	—	»	7.—	—
» in den schönsten Sorten nach meiner Wahl	—	»	4.—	35.—

Sambucus, Holunder.

» <i>canadensis</i>ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	5.—	—
» » <i>lutea</i>	—	Stecklinge	15.—	—
» » <i>fructu viride</i>	—	»	12.—	—
» » <i>maxima</i>	—	»	15.—	—
» <i>Ebulus</i>	3jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
» <i>glauca</i>ca. 40—80 cm hoch	1 »	»	6.—	—
» <i>melanocarpa</i> (<i>S. californica</i>).....	—	Stecklinge	12.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Sambucus (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>nigra</i>ca. 30—70 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
» ».....» 40—80 » »	2 »	»	4.—	30.—
» » <i>rosea plena</i>	—	Stecklinge	12.—	—
» » <i>argenteo-marginata</i>	—	»	15.—	—
» » <i>lutea</i> , siehe <i>S. canad. lutea</i> .	—	»	15.—	—
» » <i>fructu luteo</i>	—	»	12.—	—
» » <i>laciniata</i>	—	»	15.—	—
» ».....ca. 40—80 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
» » <i>latisecta</i>	—	Stecklinge	12.—	—
» » <i>leucocarpa</i>	—	»	12.—	—
» <i>racemosa</i>ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
» <i>arborescens</i>	—	Stecklinge	12.—	—

Skimmia, Skimmie.

» <i>japonica</i>	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
» ».....ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—

Sorbaria.

» <i>angustifolia</i>	1 »	Sämlinge	6.—	—
» ».....ca. 60—100 cm hoch	2 »	»	8.—	—
» <i>assurgens</i>» 50—100 » »	2 »	»	8.—	—
» <i>sorbifolia stellipila</i>	1 »	»	6.—	—

Sorbus, Vogelbeere.

» <i>americana</i>ca. 25— 50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» <i>Aria</i>» 20— 40 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
» <i>aucuparia</i>» 15— 30 » »	1 »	»	3.—	25.—
» ».....» 40— 80 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» ».....» 80—120 » »	3 »	»	8.—	75.—
» ».....» 120—150 » »	3 »	» »	10.—	90.—
» <i>fifeana</i>» 10— 20 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» <i>scandica</i>» 30— 60 » »	2 »	»	8.—	—
» <i>torminalis</i>» 25— 50 » »	2 »	»	10.—	—

Spiraea, Spierstrauch.

» <i>albiflora</i>	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
» <i>angustifolia</i> , siehe <i>Sorbaria</i> .	—	»	—	—
» <i>arguta</i>	2 »	»	15.—	—
» <i>ariaefolia</i>ca. 10—20 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» <i>assurgens</i> , siehe <i>Sorbaria</i> .	—	»	—	—
» <i>callosa rosea superba</i> , siehe <i>Sp. superba</i> .	—	»	—	—
» <i>cana</i>	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
» <i>cantonensis</i>	2 »	»	10.—	—
» <i>chamaedrifolia crataegifolia</i> ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» <i>conspicua</i>» 40—70 » »	3 »	» »	12.—	—
» <i>difformis typica</i>» 20—30 » »	3 »	» »	12.—	—
» <i>Douglasi</i>	—	Stecklinge	10.—	—
» <i>expansa inciso serrata</i>	—	»	10.—	—
» <i>fontenaysi alba</i>	—	»	10.—	—
» <i>Henryi</i> , Neuheit der letzten Jahre, besonders empfehlenswert.....	1jähr.	verpfl. Säml.	6.—	—
» <i>inflexa</i>ca. 30—50 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
» <i>japonica macrophylla</i>	—	Stecklinge	10.—	—
» <i>Menziesi alba</i> × <i>Douglasi</i>	—	»	10.—	—
» » <i>angustifolia</i>	—	»	10.—	—
» » <i>Billiardi</i>	—	»	10.—	—
» » <i>eximia</i>	—	»	10.—	—
» » <i>Lenneana</i>	—	»	10.—	—
» ».....ca. 40— 70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» ».....» 70—120 » »	3 »	» »	15.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Spiraea (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» Menziesi macrothyrsa	—	Stecklinge	10.—	—
» » macrothyrsa .. ca. 40—70 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» » » » 70—120 » »	3 »	» »	15.—	—
» » ovalifolia	—	Stecklinge	10.—	—
» » Pseudo-Douglasi	—	»	10.—	—
» » triumphans	—	»	10.—	—
» » » ca. 70—120 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» mollis	2 »	» »	15.—	—
» Nobleana	—	Stecklinge	10.—	—
» » ca. 40—70 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» » superbetulifolia	—	Stecklinge	10.—	—
» » » ca. 40—60 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» oxyodon	3 »	» »	12.—	—
» pruinosa	—	Stecklinge	10.—	—
» prunifolia flore pleno	2 jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
» pumila Bumalda	2 »	» »	12.—	—
» » Bumalda Anthony Waterer	2 »	» »	15.—	—
» » glabra ca. 40—60 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» » leucantha » 25—40 » »	3 »	» »	12.—	—
» » rosea	2 »	» »	12.—	—
» » » ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » superjaponica » 40—70 » »	3 »	» »	12.—	—
» revirescens superjaponica	—	Stecklinge	10.—	—
» rubra	—	»	10.—	—
» salicifolia alba	—	»	10.—	—
» » alba ca. 70—120 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» » typica	—	Stecklinge	10.—	—
» » » ca. 40—70 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» sorbifolia , siehe Sorbaria.	—	—	—	—
» superba (Sp. callosa rosea superba) ca. 20—40 cm »	3 »	» »	12.—	—
» tomentosa » 40—80 » »	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
» » » 30—60 » »	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	—
» Vanhouttei » 20—40 » »	2 »	» »	10.—	90.—
» » » 60—100 » »	3 »	» »	12.—	100.—
» » kleine Sträucher » 80—140 » »	4 »	» »	20.—	180.—
» in 10—20 Sorten meiner Wahl	—	Stecklinge	8.—	75.—
Staphylea , Pimpernuss.				
» colchica Coulombieri	—	Ableger	20.—	—
» Kochiana	—	»	15.—	—
» pinnata	1 jähr.	Sämlinge	8.—	—
» Regeliana (St. colchica Hort.)	—	Ableger	15.—	—
» trifoliata	1 jähr.	Sämlinge	8.—	—
» » pauciflora	—	Ableger	15.—	—
Stranvaesia .				
» Davidiana ca. 25—50 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Säml.	15.—	120.—
» » » 40—70 » »	4 »	» »	18.—	—
Styrax , Storaxbaum.				
» japonica » 20—40 » »	1 »	Sämlinge	25.—	—
Symphoricarpus , Schneebeere.				
» acutus	—	Stecklinge	8.—	—
» Giraldi	—	»	10.—	—
» » ca. 40—60 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» Heyeri	—	Stecklinge	8.—	—
» orbiculatus (S. parviflorus) ca. 40—60 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
» » aureo-reticulatus	2 »	» »	12.—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Symphoricarpus (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» racemosus ca. 15—30 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
» » 60—100 » »	2 »	»	5.—	—
» » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» pauciflorus » 60—100 » »	3 »	»	8.—	—

Syringa, Flieder.

» Emodi	—	Ableger	20.—	—
» » variegata	—	»	20.—	—
» Josikaea ca. 8—15 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» reflexa » 7—15 » »	2 »	»	7.—	60.—
» » 15—30 » »	2 »	»	9.—	80.—
» Rothomagensis	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	220.—
» » alba	2 »	»	20.—	—
» tomentella ca. 60—100 cm hoch	2 »	Sämlinge	15.—	—
» villosa » 20—40 » »	2 »	»	15.—	—
» vulgaris alba	—	verpfl. Ableger	15.—	—
» » alba ca. 30—50 cm hoch	3 jähr.	»	18.—	—
» » 50—70 » »	4 »	»	25.—	—
» » de Marly	—	Ableger	25.—	—
» »	4 jähr.	verpfl. Ableger	30.—	—

Tamarix, Tamariske.

» caspica	—	Stecklinge	10.—	—
» indica	—	»	10.—	—
» Lambertiana	—	»	10.—	—
» odessana	—	»	10.—	—
» parviflora	—	»	10.—	—
» tetrandra purpurea	—	»	10.—	—

Tecoma, Jasmintrumpete.

» radicans ca. 10—20 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
------------------------------------	---------	----------	-----	------

Tilia, Linde.

» grandiflora » 10—20 » »	1 »	»	4.—	30.—
» » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	150.—
» parvifolia bis 15 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» » 20—40 » »	2 »	»	5.—	45.—
» » 40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
» » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—

Ulmus, Ulme, Rüster.

» campestris » 10—20 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
» hollandica, echte holländische Ulme	—	—	—	—
» ca. 50—70 cm hoch	—	Ableger	7.—	60.—
» » 70—100 » »	—	»	9.—	80.—
» » 60—100 » »	—	verpfl. Ableger	15.—	—
» » Dumont » 60—100 » »	—	Ableger	10.—	—
» » 70—120 » »	—	verpfl. Ableger	15.—	—
» montana, Bergulme » 40—70 » »	2 jähr.	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» » 80—130 » »	3 »	»	6.—	50.—
» macrophylla » 80—120 » »	—	Ableger	10.—	—

Viburnum, Schneeball.

» alnifolium	—	»	20.—	—
» cassinoides	—	»	15.—	—
» dentatum	—	»	15.—	—
» Lantana 10000 St. M. 150.—	1 jähr.	Sämlinge	2.50	20.—
» ca. 20—40 cm hoch	2 »	»	3.—	25.—
» 10000 St. M. 220.—	—	—	—	—
» ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
» 10000 St. M. 280.—	—	—	—	—
» ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» 10000 St. M. 380.—	—	—	—	—

Beschreibungen der einzelnen Arten und Formen siehe unter Bäume und Sträucher.

Viburnum (Fortsetzung):

	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
» <i>Lantana</i> ca. 40—80 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» » <i>lanceolata</i>	1 »	Sämlinge	5.—	—
» » ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	8.—	—
» » <i>macrophylla</i> ... » 25—40 » »	2 »	»	8.—	—
» <i>Lentago</i>	—	Ableger	15.—	—
» <i>molle</i> , siehe <i>V. venosum</i> Canbyi.				
» <i>Opulus</i> ca. 10—20 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
» » » 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» » <i>edule</i>	—	Ableger	15.—	—
» » <i>sterile</i> (<i>V. Opulus roseum</i>)	—	»	10.—	90.—
» »	—	verpfl. Ableger	14.—	120.—
» <i>orientale</i>	—	Ableger	10.—	—
» » ca. 20—40 cm hoch	—	verpfl. Ableger	12.—	—
» <i>prunifolium</i>	—	Ableger	12.—	—
» <i>tomentosum</i> (<i>V. plicatum</i>)	—	»	15.—	—
» » <i>sterile</i>	—	»	18.—	—
» <i>venosum</i> Canbyi (<i>V. molle</i>)	—	»	15.—	—
» » Canbyi ca. 20—40 cm hoch	—	verpfl. Ableger	18.—	—

Virgilia, siehe *Cladrastis*.**Weigelia**, siehe *Diervillea*.**Ich liefere:**

1000 junge Pflanzen von Ziersträuchern in 50 Sorten nach meiner freien Wahl für M. 70.—

1000 junge Pflanzen von Laubholzstämmen in ca. 25 Sorten meines Kataloges, nach meiner freien Wahl für M. 50.—

Gehölze zu Hecken und Lauben.**a) Koniferen.**

	Höhe in Zentimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Chamaecyparis Lawsoniana. 2jähr. verpfl. Sämlinge	10—20	5.—	40.—
» <i>Lawsoniana</i> 3 » » »	15—25	6.—	50.—
» » 4 » » »	20—35	7.—	60.—
» » Ballenpflanzen	40—55	80.—	—
» » »	55—70	120.—	—
Juniperus communis 2jähr. verpfl. Sämlinge	—	5.—	40.—
» <i>communis</i> 3 » » »	20—40	8.—	75.—
Larix europaea Ballenpflanzen	100—125	100.—	—
» <i>europaea</i> »	125—150	150.—	—
» » »	150—200	200.—	—
» <i>leptolepis</i> 2jähr. verpfl. Sämlinge	25—50	7.—	60.—
» » 3 » » »	40—80	10.—	90.—
» » Ballenpflanzen	150—200	200.—	—
» » »	200—250	300.—	—
Picea alba , aus weitem Stand .. 4jähr. verpfl. Sämlinge	30—50	8.—	70.—
» <i>alba</i> Ballenpflanzen	40—55	80.—	—
» » »	55—70	120.—	—
» <i>excelsa</i> 2jähr. verpfl. Sämlinge	10—20	1.50	10.—
» » 3 » » »	15—30	2.—	15.—

Picea (Fortsetzung):		Höhe in Zentimetern	pro 100	pro 1000
			Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
» <i>excelsa</i>	Ballenpflanzen	40—55	60.—	—
» »	»	55—70	80.—	—
» <i>sitkaënsis</i> (sitchensis)	2jähr. verpfl. Sämlinge	8—15	5.—	40.—
» »	3 » »	20—40	10.—	90.—
» »	Ballenpflanzen	40—55	80.—	—
» »	»	55—70	120.—	—
» »	»	70—85	150.—	—
» »	»	100—120	180.—	—
Pinus montana	2jähr. Sämlinge	8—15	3.—	25.—
» <i>montana</i>	3jähr. verpfl. »	20—35	6.—	50.—
» »	Ballenpflanzen	20—30	100.—	—
» »	»	30—40	150.—	—
» »	»	40—55	200.—	—
» <i>uncinata</i>	3jähr. verpfl. Sämlinge	10—25	6.—	50.—
» »	Ballenpflanzen	30—40	150.—	—
Taxus baccata	2jähr. Sämlinge	8—15	15.—	140.—
» <i>baccata</i>	4jähr. verpfl. »	15—25	35.—	300.—
» »	Ballenpflanzen	20—30	120.—	1000.—
» »	»	30—40	200.—	1800.—
» »	»	40—50	300.—	2800.—
» »	»	50—60	375.—	3500.—
» »	»	60—70	450.—	4300.—
» »	»	70—80	550.—	—
» »	»	80—90	650.—	—
» »	»	90—100	800.—	—
» »	»	100—125	1000.—	—
Thuja gigantea	3jähr. verpfl. Sämlinge	10—25	10.—	80.—
» <i>occidentalis</i>	Ballenpflanzen	40—55	60.—	—
» »	»	55—70	80.—	—
Tsuga canadensis	2jähr. verpfl. Sämlinge	6—12	20.—	180.—
» <i>canadensis</i>	3 » »	10—15	25.—	220.—

b) Laubhölzer.

Acanthopanax spinosum	Stecklinge	—	30.—	—
» <i>spinosum</i>	Sträucher	80—100	60.—	—
Acer campestre	1jähr. Sämlinge	15—30	1.—	8.—
» <i>campestre</i>	1 » »	30—60	2.—	16.—
» »	2 » »	40—80	3.—	25.—
» »	2jähr. verpfl. Sämlinge	50—100	4.—	30.—
» »	3 » »	80—120	5.—	40.—
» »	buschige Sträucher	80—100	40.—	—
» »	»	100—120	50.—	—
» »	»	120—150	60.—	—
Alnus glutinosa	3jähr. verpfl. Sämlinge	150—200	4.—	30.—
Amelanchier Botryapium	1jähr. »	10—25	3.—	25.—
» <i>Botryapium</i>	2 » »	40—70	5.—	40.—
» »	Sträucher	100—150	30.—	—
Aronia arbutifolia	1jähr. Sämlinge	10—20	2.—	15.—
» <i>arbutifolia</i>	2 » »	40—60	3.—	20.—
» »	Sträucher	80—120	30.—	—
Berberis dulcis (buxifolia) <i>nana</i>	2jähr. verpfl. Stecklinge	—	15.—	140.—
» <i>dulcis nana</i>	3 » »	10—20	18.—	160.—
» »	Sträucher	20—30	45.—	—
» »	»	30—40	50.—	—
» <i>Thunbergi</i>	1jähr. Sämlinge	10—20	4.—	30.—
» »	2 » »	30—60	5.—	40.—

	Höhe in Zentimeter	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Berberis (Fortsetzung):			
» Thunbergi	2jähr. verpfl. Sämlinge	25— 50	6.— 50.—
» »	Sträucher	60— 80	45.— —
» vulgaris	1jähr. Sämlinge	10— 20	3.— 25.—
» »	2 » »	25— 50	4.— 30.—
» »	2jähr. verpfl. »	25— 40	5.— 40.—
» »	3 » »	40— 70	6.— 50.—
» »	Sträucher	70—100	30.— —
» » atropurpurea	1jähr. Sämlinge	10— 25	3.— 25.—
	10000 St. M. 200.—		
» » »	2jähr. verpfl. Sämlinge	20— 40	5.— 40.—
» » »	Sträucher	70—100	30.— —
Buxus japonica			
	3jähr. verpfl. Stecklinge	10— 20	4.— 30.—
» japonica	4 » »	15— 30	5.— 40.—
» sempervirens (arborescens)	3 » »	10— 20	5.— 40.—
» »	4 » »	15— 25	6.— 50.—
» »	Pyramiden	20— 25	75.— 700.—
» »	»	25— 30	90.— 800.—
» »	»	30— 40	150.— —
» »	»	40— 50	300.— —
» »	»	50— 60	375.— —
» »	»	60— 70	450.— —
» suffruticosa			
	10 lfde. Meter M. 3.—, 100 lfde. Meter M. 20.—		
Caragana arborescens			
	2jähr. Sämlinge	30— 60	2.— 15.—
» arborescens	2 » »	60—100	3.— 25.—
» »	3jähr. verpfl. »	70—100	5.— 40.—
» »	3 » »	100—150	6.— 50.—
» »	Sträucher	70—120	45.— —
Carpinus americana (caroliniana) 2jähr. verpfl. Sämlinge			
» Betulus	2jähr. »	20— 40	2.— 15.—
» »	2 » »	40— 80	3.— 20.—
» »	2jähr. verpfl. »	15— 30	2.— 18.—
» »	2 » »	25— 50	3.— 20.—
» »	3 » »	50— 90	6.— 50.—
» »	verpfl. buschige Pyramiden	80—100	50.— 450.—
» »	» »	100—120	60.— 550.—
» »	» »	120—150	80.— 750.—
Cornus alba			
	Ableger	—	7.— 60.—
» alba	verpfl. »	70—100	8.— 70.—
» »	3jähr. »	80—120	9.— 80.—
» »	Sträucher	100—120	30.— —
» mas (mascula)	1jähr. verpfl. Sämlinge	bis 25	10.— 80.—
» »	2 » »	40— 60	20.— 180.—
» sanguinea	1jähr. Sämlinge	20— 40	3.— 20.—
» »	1jähr. verpfl. »	—	4.— 30.—
» »	2 » »	40— 70	5.— 40.—
» »	Sträucher	100—120	40.— —
Cotoneaster applanata (Dielsiana)			
	1jähr. verpfl. Sämlinge	—	7.— 60.—
» applanata	2 » »	30— 60	12.— 100.—
» »	Sträucher	100—120	45.— —
» bullata	2jähr. verpfl. Sämlinge	40— 80	9.— 80.—
» »	3 » »	50— 90	12.— 100.—
» »	Sträucher	100—120	45.— —
» divaricata	2jähr. verpfl. Sämlinge	40— 80	9.— 80.—
» »	3 » »	40— 80	12.— 100.—

		Höhe in Zentimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Cotoneaster (Fortsetzung):				
» <i>divaricata</i>	Sträucher	60—80	45.—	—
» <i>Simonsii</i>	»	80—120	50.—	—
Crataegus coccinea	2jähr. verpfl. Sämlinge	20—40	12.—	100.—
» <i>coccinea</i>	2 » »	40—80	15.—	140.—
» ».....	Pyramiden	60—80	60.—	—
» ».....	»	80—100	70.—	—
» ».....	»	100—120	80.—	—
» ».....	»	150—200	150.—	—
» <i>crusgalli</i>	»	120—150	100.—	—
» ».....	»	150—200	150.—	—
» <i>glandulosa</i>	»	80—100	70.—	—
» ».....	»	100—120	80.—	—
» ».....	»	120—150	100.—	—
» <i>oxyacantha</i> (einsteinige).....	1jähr. Sämlinge	20—40	1.—	7.—
» ».....	1 » »	40—70	2.—	14.—
» ».....	10000 St. M. 120.—			
» » 4—7 mm Durchmesser	2jähr. verpfl. Sämlinge	30—50	2.—	14.—
» ».....	10000 St. M. 120.—			
» » 5—8 »	3jähr. verpfl. Sämlinge	50—70	2.50	22.—
» ».....	10000 St. M. 200.—			
» » 8—12 »	3jähr. verpfl. Sämlinge	70—100	3.—	28.—
» ».....	10000 St. M. 250.—			
» <i>prunifolia</i>	3jähr. verpfl. Sämlinge	80—130	6.—	50.—
» ».....	Pyramiden	100—120	80.—	—
» ».....	»	120—150	100.—	—
» <i>sanguinea</i>	1jähr. Sämlinge	7—15	6.—	50.—
» <i>splendens</i>	3jähr. verpfl. »	80—120	6.—	50.—
» ».....	Pyramiden	80—100	60.—	—
» ».....	»	100—120	80.—	—
» ».....	»	120—150	100.—	—
» ».....	»	150—200	150.—	—
Cydonia japonica	1jähr. Sämlinge	25—40	3.—	20.—
» <i>japonica</i>	Sträucher	80—120	35.—	—
Evonymus europaea	»	60—100	45.—	—
Fagus sylvatica	1jähr. Sämlinge	15—25	1.—	8.—
» <i>sylvatica</i>	2 » »	30—60	2.—	18.—
» ».....	3 » »	60—100	5.—	40.—
» ».....	3jähr. verpfl. »	30—60	6.—	50.—
Gleditschia triacanthos	1jähr. Sämlinge	15—30	3.—	20.—
» <i>triacanthos</i>	2 » »	40—70	6.—	50.—
» ».....	Sträucher	80—120	40.—	—
Hippophaë rhamnoides	»	100—150	50.—	—
Ilex Aquifolium	2jähr. verpfl. Sämlinge	10—20	12.—	100.—
» <i>Aquifolium</i>	Ballenpflanzen, Büsche	40—50	250.—	—
» ».....	» »	50—60	300.—	—
» ».....	» »	60—70	350.—	—
» ».....	» »	70—80	400.—	—
» ».....	» »	80—90	500.—	—
» ».....	» »	90—100	600.—	—
» <i>crenata</i>	Sträucher	20—30	100.—	—
Ligustrum ovalifolium	3jähr. verpfl. Stecklinge	40—60	5.—	40.—
» <i>ovalifolium</i>	3 » »	60—80	6.—	50.—
» ».....	buschige Sträucher	40—60	20.—	180.—
» ».....	» »	60—80	25.—	200.—
» ».....	» »	80—100	30.—	—
» <i>vulgare</i>	2jähr. verpfl. Sämlinge	30—50	3.—	25.—
» ».....	3 » »	50—100	4.—	35.—

Ligustrum (Fortsetzung):	Höhe in Zentimeter	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
» <i>vulgare</i> 3jähr. verpfl. Stecklinge	40—60	4.—	30.—
» » 3 » » »	60—80	5.—	40.—
» » buschige Sträucher	120—150	25.—	200.—
Lonicera tatarica 1jähr. Sämlinge	20—40	3.—	25.—
» <i>tatarica</i> 2 » »	60—100	6.—	50.—
» » Sträucher	80—100	35.—	—
» <i>Xylosteum</i> 1jähr. Sämlinge	15—30	2.—	15.—
» » 2jähr. verpfl. »	30—60	3.—	20.—
» » 3 » » »	60—100	4.—	30.—
» » Sträucher	100—150	30.—	—
Mahonia Aquifolium 1jähr. Sämlinge	—	2.—	15.—
» <i>Aquifolium</i> 2 » »	10—25	4.—	30.—
» » 2jähr. verpfl. »	10—20	5.—	40.—
» » starke Büsche	40—60	60.—	—
Morus alba 1jähr. Sämlinge	bis 25	3.—	20.—
	10000 St. M. 180.—		
Physocarpus amurensis 2jähr. Sämlinge	60—100	4.—	30.—
» <i>amurensis</i> Sträucher	100—150	80.—	—
» <i>opulifolius</i> 3jähr. verpfl. Sämlinge	60—120	5.—	40.—
Prunus Myrobalana 1jähr. »	80—120	4.—	30.—
» <i>Myrobalana</i> 2jähr. verpfl. »	70—110	5.—	40.—
» <i>Padus</i> 1jähr. »	15—30	4.—	30.—
» » 2 » »	40—70	6.—	50.—
» » 2jähr. verpfl. »	40—80	7.—	60.—
» » Pyramiden	100—150	70.—	—
» » »	150—180	80.—	—
» <i>serotina</i> 1jähr. Sämlinge	30—60	6.—	50.—
» » Sträucher	120—150	40.—	—
» » »	150—170	50.—	—
» » »	200—250	80.—	—
» <i>spinosa</i> 1jähr. Sämlinge	40—70	2.—	15.—
» » 3jähr. verpfl. »	80—120	2.—	18.—
	10000 St. M. 150.—		
» <i>virginiana</i> Pyramiden	150—200	80.—	—
» » »	200—250	100.—	—
Quercus pedunculata 1jähr. Sämlinge	10—25	1.50	12.—
	10000 St. M. 100.—		
» <i>pedunculata</i> 2jähr. Sämlinge	40—70	3.—	20.—
	10000 St. M. 180.—		
Rhamnus cathartica 1jähr. Sämlinge	10—25	3.—	20.—
» <i>cathartica</i> 2jähr. verpfl. »	20—40	5.—	40.—
» <i>Frangula</i> 1jähr. »	15—30	3.—	20.—
» » Sträucher	80—100	35.—	—
Ribes alpinum verpfl. Ableger	—	7.—	60.—
» <i>alpinum</i> Sträucher	50—70	35.—	300.—
» » »	70—100	40.—	350.—
» » <i>pumilum</i> verpfl. Ableger	—	7.—	60.—
» <i>Grossularia</i> 1jähr. Sämlinge	10—20	2.—	18.—
» » Sträucher	80—120	30.—	—
Rosa rubiginosa 2jähr. verpfl. Sämlinge	30—50	2.50	22.—
» <i>rubiginosa</i> 2 » » »	50—80	4.—	32.—
» <i>rubrifolia</i> (ferruginea) 1jähr. Sämlinge	—	3.—	25.—
» <i>rugosa</i> 1 » »	10—25	3.—	25.—
» <i>alba</i> 1 » »	10—25	3.—	25.—
» » 2 » »	30—60	6.—	50.—

			Höhe in Zentimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Sambucus nigra	1jähr. Sämlinge		30—70	2.—	15.—
» nigra	2 » »		40—80	4.—	30.—
» racemosa	1 » »		40—80	2.—	15.—
Spiraea arguta	Sträucher		50—70	45.—	—
» Vanhouttei	2jähr. verpfl. Stecklinge		20—40	10.—	90.—
» »	3 » »		60—100	12.—	100.—
» » kleine Sträucher	4 » »		80—140	20.—	180.—
» »	Sträucher		100—150	35.—	300.—
Symphoricarpus orbiculatus	»		60—100	35.—	—
» racemosus	1jähr. Sämlinge		15—30	3.—	20.—
» »	Sträucher		100—120	30.—	—
Syringa Rothomagensis	2jähr. verpfl. Stecklinge		—	25.—	220.—
Tilia grandifolia	1jähr. Sämlinge		10—20	4.—	30.—
» grandifolia	2jähr. verpfl. »		30—60	20.—	150.—
» parvifolia	1jähr. Sämlinge		bis 15	3.—	25.—
» »	2 » »		20—40	5.—	45.—
» »	2 » »		40—80	7.—	60.—
» »	2jähr. verpfl. »		25—50	8.—	70.—
» »	Pyramiden		100—120	150.—	—
» »	»		120—150	200.—	—
Ulmus campestris	1jähr. Sämlinge		10—20	2.—	15.—
» hollandica	Ableger		50—70	7.—	60.—
» »	»		70—100	9.—	80.—
» »	verpfl. Ableger		60—100	15.—	—
» montana	2jähr. verpfl. Sämlinge		40—70	4.—	30.—
» »	3 » »		80—130	6.—	50.—

Jeder Gehölzfreund

sollte Mitglied der

Deutschen Dendrologischen Gesellschaft
sein.

Über 7000 Mitglieder, Mitgliederbeitrag pro Jahr nur 5.— Mark.

Alljährlich ein schönes und ausserordentlich inhaltsreiches Jahrbuch (1925 über 400 Seiten stark mit 86 ganzseitigen Tafeln und zahlreichen Abbildungen im Text), Studienfahrten und die grosse Jahrestagung [mit mustergültig vorbereiteten Ausflügen in dendrologisch interessante Gebiete.

Nähere Auskunft erteilt bereitwilligst der geschäftsführende Präsident der Gesellschaft, Dr. phil. Fritz Graf von Schwerin, Wendisch-Wilmersdorf bei Thyrow (Kreis Teltow).

Laubhölzer.

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Kulturhandbuch für Gartenfreunde Band II: „Unsere Freiland-Laubgehölze“, neueste Auflage, siehe vorletzte Umschlagseite.

Wertvolle Bienennährpflanzen sind mit „B“ bezeichnet.

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

Ziersträucher, in guten Sorten

	pro 100 St. M. 35.—, 1000 St. M. 300.—
»	besonders schöne Zusammenstellung
	pro 100 St. M. 50.—, 1000 St. M. 400.—
»	extra starke Sträucher
	pro 100 St. M. 55.—, 1000 » » 500.—

Baumartige Gehölze pro 100 » » 60.—

Sträucher, die im Frühjahr blühen, dürfen im Winter nicht zurückgeschnitten, höchstens etwas ausgelichtet werden. Wenn bei ihnen ein starker Rückschnitt notwendig wird, so hat er gleich nach der Blütezeit zu erfolgen.

Trauerbäume, siehe Seite 144.

Schlingpflanzen, siehe Seite 146.

Abelia *R. Brown.* Abellie (Caprifoliaceae).

Graebnerana *Rehd.*, selten mit Topfballen

Zierlich verzweigter Strauch mit häutigen, ovalen bis elliptisch-ovalen Blättern, die oberseits sattgrün, unterseits heller sind. Blüten einzeln stehend, trompetenförmig mit $2\frac{1}{2}$ cm langer Röhre und etwa 2 cm breitem Saum. Färbung weiss bis blassrosa. Variiert etwas in der Belaubung sowohl als auch in der Blüte. Hier vollständig hart.

grandiflora (*Abelia rupestris hybrida Hort.*), Felsen-Abellie, mit Topfballen

Winterharter, halb immergrüner Strauch mit mittelgrossen, dunkelgrünen Blättern. Blumen rosaweiss, duftend.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

2.50	—	—
------	---	---

2.50	20.—	—
------	------	---

Acanthopanax *Dcne. et Planch.* Stachel-Kraftwurz (Araliaceae).

ricinifolium var. **Maximowiczii** *Dcne. et Planch.* (*Aralia Maximowiczii van Houtte*) 150—200 cm hoch

200—250 » »

Hochstämme 8—10 cm Umfang

Ein prachtvoller Baum und Strauch mit sehr schöner, subtropischer Belaubung. Blätter bis $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, fein gefingert und gelappt. Zweige mit kurzen, aufwärts gekrümmten Stacheln. Im Sommer grosse, gelblichweisse Blütenstände hervorbringend.

spinosum *Miquel* (*Aralia pentaphylla Thunberg*)

Schöner, stark bedornter Strauch. Zu undurchdringlichen Hecken sehr geeignet.

1.50	14.—	—
------	------	---

2.—	18.—	—
-----	------	---

4.—	35.—	—
-----	------	---

—80	7.—	60.—
-----	-----	------

Acer *Linné.* Ahorn (Aceraceae).

campestre *L.* Feldahorn Sträucher 80—100 cm hoch

» 100—120 » »

» 120—150 » »

Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet.

—60	5.—	40.—
-----	-----	------

—70	6.—	50.—
-----	-----	------

—80	7.—	60.—
-----	-----	------

Acer (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
carpinifolium <i>Sieb. u. Zucc.</i> Pyramiden 200—250 cm hoch Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung eine der inter- essantesten und merkwürdigsten Arten.	3.—	28.—	—
cissifolium <i>C. Koch</i> Sträucher 60—80 cm hoch Pyramiden 150—200 » »	—60 1.20	5.— 10.—	— —
Kleiner, japanischer Baum mit gedrehten, hellgrünen Blättern an roten Stielen.			
colchicum , siehe <i>A. laetum</i> .			
dasycarpum <i>Ehrh.</i> (<i>A. eriocarpum</i> <i>Mchx.</i>) Silberahorn. 200—250 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.— 3.—	8.— 28.—	70.— 250.—
Unterseite der Blätter silbergrau. Schöner Alleebaum, auf feuch- tem bis nassem, sandigem Boden.			
» lutescens <i>Späth</i> 200—250 cm hoch Treibt in schön leuchtend gelbem Farbenton aus. Auf feuchtem, sandigem Boden unvergleichlich schön.	1.—	8.—	—
» macrophyllum <i>Dippel</i> 150—200 cm hoch Blätter bedeutend grösser und in der Jugend reicher behaart als bei der Stammform.	1.25	—	—
» palmatum <i>Schwerin</i> 80—100 cm hoch Große, hellgrüne, zu beiden Seiten des Mittellappens tief ein- geschnittene Blätter.	—70	6.—	—
» pulverulentum <i>Späth</i> 60—80 cm hoch 200—250 » »	—70 2.—	6.— 18.—	— —
Blätter mit feinen weissen, an den Zweigspitzen zart rosa Punkten wie dicht bestäubt.			
Ginnala <i>Maxim.</i> Büsche 50—80 cm hoch » 80—120 » » » 120—150 » »	—60 —70 —75	5.— 6.— 6.50	40.— 45.— 50.—
Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rot fär- bender Belaubung. Auch die zahlreichen, schön gefärbten Früchte sind sehr zierend.			
» aidzuense , siehe <i>A. tataricum aidzuense</i> .			
Heldreichii <i>Orphan.</i> 150—200 cm hoch Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.	1.50	—	—
laetum aureum <i>Hort.</i> (<i>A. colchicum rubrum</i>). Pyramiden 60—80 cm hoch » 80—100 » »	1.50 2.—	— 18.—	— —
Sehr schöne Form mit rot und goldgelb bronzierten Blättern.			
» rubrum <i>Kirchner</i> Pyramiden 80—100 cm hoch » 100—120 » »	1.— 1.50	— 12.—	— 100.—
Ein mittelgrosser Baum mit glänzend grüner, spitzlappiger, braunrot austreibender Belaubung.			
neglectum <i>Annae Schwerin</i> 200—250 cm hoch Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv übergehend. Be- sonders schön und empfehlenswert.	2.50	—	—
» elongatum (<i>A. campestre</i> × <i>laetum</i>). Hochstämme 10—12 cm Umfang Blätter dreiteilig, tief ausgeschnitten. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.	6.—	—	—
Negundo angustifolium <i>Dieck</i> Sträucher Parallelförmig zu <i>A. Neg. heterophyllum</i> , jedoch sind die Blättchen an der Spitze lang und schmal ausgezogen.	—80	—	—
» argenteo-limbatum <i>Grf. Schwerin</i> Sträucher Sehr starkwüchsig, mit breiter, jedoch die grüne Farbe noch etwas vorherrschend lassender, reinweisser Randung der Blättchen.	—80	—	—
» argenteo-variegatum <i>Hort.</i> Sträucher 50—70 cm hoch » 70—100 » » Höhe bis zur Krone 60—80 » » » » 80—100 » » » » 100—120 »	—80 —90 1.50 1.75 2.—	7.— 8.— — 16.— 18.—	65.— 75.— — — —
Die allgemein bekannte und verbreitetste, weissbunte Form von grosser, landschaftlicher Schönheit.			
» aureo-variegatum <i>Späth</i> ... Sträucher 70—100 cm hoch Blättchen lang, spitz, dunkelgrün mit goldgelben Flecken.	—90	8.—	—

Acer (Fortsetzung):**Negundo aureum odessanum** *Rothe* Sträucher

Höhe bis zur Krone 60—80 cm

» » » » 80—100 »

Kräftig wachsende Abart mit prachtvoller, leuchtend gelber Belaubung und bronzefarbigem Austrieb.

» **rubescens** *Grf. Schwerin*. Veredlungen 100—130 cm hoch

Sehr stark wachsende Form mit hellgrünen, lebhaft bläulich weiss bereiften Trieben. Das grosse, intensiv rotgestielte Laubwerk ist im Austrieb schön braun bronziert, später tiefgrün mit bräunlichem Schein.

» **versicolor** *Dieck* Sträucher

Belaubung dunkelgrün mit hellgrünem Rand. Einige Blätter verblissen bisweilen und zeigen dann eine gelbliche Färbung.

opulifolium *Villars*. Schneeballblättriger Ahorn 60—80 cm hoch

Mittelhoher Baum, der dichte, rundliche Kronen bildet.

palmatum *Thbg.* Sträucher 60—80 cm hoch

Mit zierlich geschlitzten, braunrot austreibenden, grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtend rot färben.]

» **atrolineare** *Grf. Schwerin* Sträucher 40—50 cm hoch

Schöne, dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.

» **atropurpureum latifolium** Sträucher 40—60 cm hoch

Schöne, starkwachsende, breitblättrige Form mit prachtvoll schwarzroten Blättern, die sich bis in den Herbst hinein halten; breitwachsend.

» **Nicholsoni** *Grf. Schwerin* Sträucher 40—60 cm hoch

Blätter siebenlappig, dunkelrot gefärbt. Eine der schönsten Formen.

» **ornatum** *Carrière* Sträucher 30—40 cm hoch

Belaubung sehr fein und tief geschlitzt und gesägt, von mittlerer Grösse und von prächtiger, purpurroter Färbung.

» **reticulatum** *André* Sträucher 40—60 cm hoch

Mittelgrosse Blätter von hell graugrüner bis weissgelblicher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.

» **rubro-latifolium** *Grf. Schwerin*, Sträucher 40—60 cm hoch

Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot gefärbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.

» **versicolor** *van Houtte* Sträucher 40—60 cm hoch

Blätter von hellem, freudigem Grün mit grossen, anfangs hellrosa, später reinweissen Flecken.

platanoides *L.*, Spitzahorn Hochstämme 8—10 cm Umfang

» 10—12 » »

» 12—14 » »

» 14—16 » »

Er erwächst zu einem der schönsten und stärksten Bäume unserer Wälder. Zeigt wunderschöne Herbstfärbung in leuchtend gelben und roten Tönen.

» **acuminatum** *Grf. Schwerin* 150—200 cm hoch

Der Art ähnlich, Blätter schmaler und spitzer.

» **aureo-marginatum** *Pax* 150—200 cm hoch

Blätter auffallend schön gelb gerändert. Austrieb saftig hellgrün.

» **cucullatum** *Carr.* 150—200 cm hoch

Blätter hohlblättrig geformt.

» **Drummondii** *Drum.* 150—180 cm hoch

Hochstämme 10—12 cm Umfang

Eine in England entstandene, schöne, bunte Form. Blatt graugrün mit scharf abgesetztem, weissem Rande.

» **globosum** *Hort.*

Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 6—8 cm Umfang

» » » » 200—220 » 8—10 » »

Bildet regelmässige, dichte Kugelkronen. Sehr empfehlenswerter Kugelbaum.

» **Lorbergi** *van Houtte* 150—200 cm hoch

Blätter mit fünf, an den Rändern weit übereinander greifenden Abschnitten, in fadenförmigen Spitzen auslaufend.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1.—	—	—
1.50	—	—
1.75	—	—
1.—	—	—
1.—	—	—
1.—	—	—
1.50	—	—
—80	7.—	60.—
2.50	—	—
2.50	—	—
2.50	—	—
2.50	—	—
2.50	—	—
2.50	—	—
3.—	28.—	—
4.—	35.—	—
5.—	45.—	—
6.—	—	—
1.—	—	—
1.50	—	—
1.50	—	—
1.50	12.—	—
5.—	—	—
7.—	65.—	—
7.50	70.—	—
1.50	—	—

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Acer (Fortsetzung):				
platanoides pictum Hesse	150—200 cm hoch	1.50	—	—
Der Austrieb ist zartrosa, weiss bepudert und marmoriert. Eigenartig hervorragend schöne, auffallende Färbung.				
» Schwedleri K. Koch	Hochstämme 8—10 cm Umfang	5.—	45.—	400.—
	» 10—12 » »	6.—	55.—	500.—
	» 12—14 » »	7.—	65.—	600.—
	» 14—16 » »	8.—	—	—
Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend.				
» undulatum Dieck	Hochstämme 10—12 cm Umfang	6.—	—	—
Die nur mittelgrossen Blätter sind blasig gewellt, am Rande wellig kraus.				
Pseudoplatanus L. , Bergahorn,				
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	4.—	35.—	—
	» 12—14 » »	5.—	45.—	—
	» 14—16 » »	6.—	—	—
	» 16—18 » »	7.—	—	—
Sehr schöner, weitverbreiteter, hoher, breitröhriger Alleebaum. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden.				
» luteo-virescens Simon-Louis	120—150 cm hoch	1.—	—	—
Belaubung hellgrün mit strohgelben Flecken.				
» Nizeti Grf. Schwerin	200—250 cm hoch	1.50	—	—
Schöne Form mit rotbraunem Austrieb; Belaubung später dunkelgrün mit gelben Flecken.				
» purpurascens Pax	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.50	20.—	—
	» 8—10 » »	3.—	28.—	—
	» 10—12 » »	4.—	35.—	—
	» 12—14 » »	5.—	45.—	—
	» 14—16 » »	6.—	55.—	—
Unterseite der Blätter purpurviolett.				
» zebrinum Hort	200—250 cm hoch	1.50	—	—
Schöner, buntblättriger Ahorn.				
Sieboldianum Miquel	Sträucher 40—60 cm hoch	2.—	—	—
Blattform ähnlich A. Parsonsii, aber nicht so tief eingeschnitten. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die dunkelblutrote Herbstfärbung, während der Johannistrieb noch vollständig gelb ist.				
tataricum L. Tatarischer Ahorn. Sträucher 60—80 cm hoch		—60	5.—	—
	» 80—100 » »	—70	6.—	—
Bekannter Ahorn mit dichter, kleinblättriger Bezweigung.				
» aidzuense Franchet	Sträucher 80—120 cm hoch	—70	6.—	45.—
Blätter von dunklerem Grün und dünnhäutiger als bei der typischen Art. Besonders zierend sind die leuchtend roten Früchte.				
truncatum albo-variegatum Schwerin	60—80 cm hoch	2.50	—	—
Kleiner Baum aus China, mit weissbunten Blättern.				
Actinidia , siehe Schlingpflanzen.				
Aesculus Linné. Rosskastanie, Pavie (Hippocastanaceae).				
chinensis Bge. Chinesische Rosskastanie. 60—80 cm hoch		2.—	—	—
Ein kleiner Baum, auch Strauch. Blüten ähnlich gestaltet und geformt wie bei der gewöhnlichen Rosskastanie, aber kleiner und 14 Tage später blühend.				
flava , siehe lutea.				
glabra Willdenow (A. ohioënsis Michx.) Kahle Rosskastanie				
	80—100 cm hoch	2.—	—	—
Blüten gelblichweiss oder gelblichgrün. Ende Mai bis Mitte Juni in lockeren, bis 20 cm langen Rispen.				
» marylandica Koehne	50—60 cm hoch	2.—	—	—
Eine zu Aesc. discolor gehörende Form mit freudig grünen Blättern und ähnlichen Blüten.				

Aesculus (Fortsetzung):**Hippocastanum flore pleno Hort.**

Höhe bis zur Krone	180—200 cm,	8—10 cm Umfang	6.—	55.—	—
» » » »	180—200 »	10—12 »	8.—	75.—	—
» » » »	180—200 »	12—14 »	10.—	90.—	—

Weiss, gefülltblühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen gepflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht.

» Memmingeri Hort.	40—60 cm hoch	1.50	—	—	—
---------------------------------	---------------	------	---	---	---

Schöne Form mit gelbbeistäubten und gestrichelten Blättern.

humilis × lutea Koehne	40—60 cm hoch	2.—	—	—	—
--	---------------	-----	---	---	---

Blüht schon als ganz kleine Pflanze übertoll. Blütenrispen bis über 20 cm lang. Ende Mai bis Anfang Juni.

lutea Wangenheim (P. <i>flava Moench</i>)	60—80 cm hoch	2.—	18.—	—	—
	80—100 »	2.50	—	—	—

Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.

Lyoni Hort. (lutea × Pavia Koehne)	60—80 cm hoch	2.—	—	—	—
---	---------------	-----	---	---	---

Hellgelbblühende Hybride.

macrostachya, siehe **parviflora**.

neglecta Lindley (A. <i>discolor</i> × lutea Koehne)	40—60 »	1.50	—	—	—
	80—100 »	2.—	—	—	—

Blüte rötlichgelb mit ziegelroten Flecken.

parviflora Walter (P. *macrostachya Mch.*).

Sträucher 100—120 cm hoch

1.— 8.— 75.—

Hübsche, buschige Art mit vielen grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli—August. Sehr schöne Belaubung. Wertvoller Spätblüher.

Pavia atrosanguinea Hort.	80—100 cm hoch	2.—	—	—	—
--	----------------	-----	---	---	---

Kleiner Baum mit aufrechtstehenden Blütenständen, dunkelrot blühend.

plantierensis E. Andrè	80—100 cm hoch	2.—	—	—	—
-------------------------------------	----------------	-----	---	---	---

Hübsche Form, zwischen Aesc. *rubicunda* und *Hippocastanum*, mit blaßroten Blüten.

rubicunda Loisl.	Niedrige 40—70 cm hoch	1.—	9.—	—	—
	70—100 »	1.50	12.—	—	—

Höhe bis zur Krone	140—160 cm,	8—10 cm Umfang	5.—	45.—	—
--------------------	-------------	----------------	-----	------	---

» » » »	160—180 »	8—10 »	5.50	50.—	—
---------	-----------	--------	------	------	---

» » » »	180—200 »	8—10 »	6.—	55.—	—
---------	-----------	--------	-----	------	---

» » » »	180—200 »	10—12 »	8.—	75.—	—
---------	-----------	---------	-----	------	---

» » » »	200—220 »	10—12 »	8.50	80.—	—
---------	-----------	---------	------	------	---

» » » »	180—200 »	12—14 »	10.—	90.—	—
---------	-----------	---------	------	------	---

» » » »	180—200 »	14—16 »	12.—	100.—	—
---------	-----------	---------	------	-------	---

Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot und behält im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger als die gewöhnliche Rosskastanie. Blütezeit Mai—Juni.

» aureo-marginata Hort.	80—100 cm hoch	1.50	—	—	—
--------------------------------------	----------------	------	---	---	---

Höhe bis zur Krone	180—200 cm,	10—12 cm Umfang	8.—	—	—
--------------------	-------------	-----------------	-----	---	---

Blätter schön gelb gerandet.

» Brioti Hort.	80—100 cm hoch	1.50	12.—	—	—
-----------------------------	----------------	------	------	---	---

Höhe bis zur Krone	180—200 cm,	8—10 cm Umfang	6.—	55.—	—
--------------------	-------------	----------------	-----	------	---

» » » »	180—200 »	10—12 »	8.—	75.—	—
---------	-----------	---------	-----	------	---

» » » »	180—200 »	12—14 »	10.—	90.—	—
---------	-----------	---------	------	------	---

Blüten dunkler als vorige.

versicolor Dippel (A. <i>Whitleyi Hort.</i>)	40—60 cm hoch	2.—	—	—	—
--	---------------	-----	---	---	---

Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich, in 15 cm langen Rispen von Ende Mai—Mitte Juni.

Ailanthus Desf. Götterbaum (Simarubaceae).

glandulosa Desf.	Sträucher 60—80 cm hoch	—70	6.—	—	—
-------------------------------	-------------------------	-----	-----	---	---

Ausserordentlich rasch wachsender Baum mit sehr grossen, gefiederten Blättern. Blüht im Juli in schönen, grossen, gelblich-weissen Dolden.

Akebia, siehe Schlängpflanzen.

Alnus Gärtner. Erle, Eller (Betulaceae).

glutinosa Gärtner. Gewöhnliche Schwarzerle 250—300 cm hoch
300—350 » »

Bekannter, grosser Baum, der besonders zur Bepflanzung nasser, sumpfiger Stellen ganz vorzüglich ist.

» *crispa Hort.* Pyramiden 100—150 cm hoch
» 150—200 » »

Freudig dunkelgrüne, gekrauste Blätter.

» *imperialis Kirchner.* Pyramiden 80—100 cm hoch
Sehr zierlich, mit äusserst fein geschlitzter Belaubung.

» *oxyacanthifolia Spach* (A. glut. incisa *Dippel*)
Pyramiden 100—120 cm hoch
» 200—250 » »
» 250—300 » »

Kleine, weissdornnähnlich gelappte Blätter.

» *rubrinervia Dippel* Pyramiden 200—250 cm hoch
Aufrechte Form mit dunkelgrüner, rötlich gestielter und geaderter Belaubung.

hirsuta Turczan. Ostasiatische Weisslerle. 100—120 cm hoch
Seltene Art mit gelbgrauen, dicht filzig behaarten Zweigen und Knospen.

incana Willdenow. Weisslerle. Pyramiden 120—150 cm hoch
» 250—300 » »
Hochstämme 6— 8 cm Umfang
» 8—10 » »
» 10—12 » »

Gedeiht noch auf trockenem Boden.

» *aurea Hort.* Pyramiden 100—120 cm hoch
» 250—300 » »

Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend sind die langen, prachtvoll lachsfarbigten Blütenkätzchen.

» *laciniata Hort.* Pyramiden 120—150 cm hoch
» 150—200 » »
» 200—250 » »
» 250—300 » »

Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.

japonica Sieb. & Zucc. Japanische Erle.
Pyramiden 100—120 cm hoch

Kleiner Baum oder Strauch, Blätter schmal lanzettförmig zugespitzt, glänzend dunkelgrün. Schöne, seltene Art.

macrophylla Desf. (A. rugosa *Sprgl.*)
Pyramiden 100—120 cm hoch
» 150—200 » »
» 250—300 » »

Starkwachsende Art. Junge Triebe kantig, behaart; Blatt bis sehr gross, lang-oval, stumpf gesägt. Färbung oberseits sattgrün mit violettroten Hauptnerven.

tinctoria Sarg. 150—200 cm hoch
Ostasiatischer, dunkelrindiger Baum, der bis 20 m Höhe erreicht.
Blätter rundlichspitz, grob und stumpf gezähnt, oberseits dunkel, unterseits graugrün.

undulata Willd. (A. alnobetula *Hart.*, A. *viridis Lam.*)
80—100 cm hoch
150—200 » »

Blätter breit, stumpf eiförmig, kahl, mit deutlichen Lenticellen, junge Zweige etwas zusammengedrückt, für grosse, schattige, steinige Hänge.

Amelanchier Medikus. Felsenbirne, Traubenbirne (Rosaceae), **B.**

alnifolia Nuttall. Erlenblättrige Felsenbirne
Starkwachsend. Im April—Mai überreich in kurzen, dichtgedrängt sitzenden, weissen, kleinen Trauben blühend.

Botryapium de Candolle. Länglichblättrige Felsenbirne
Steht der A. *alnifolia* nahe und blüht wie diese.

cretica de Candolle. Kretische Felsenbirne
Kleiner Strauch mit schönen, grossen, leuchtend dunkelgrünen Blättern und rothbraunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen, an der Spitze rötlichen Trauben.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—80	7.50	—
1.—	8.—	—
—60	5.—	—
—70	6.—	—
—60	5.—	45.—
—60	5.—	—
—70	6.—	—
—90	8.—	—
—70	6.—	—
1.—	9.—	—
—50	4.—	—
—80	7.50	—
1.—	8.—	75.—
1.50	12.—	—
2.—	15.—	—
—60	5.—	—
—90	8.—	—
—70	6.—	50.—
—80	7.—	—
1.—	9.—	—
1.20	10.—	—
1.—	9.—	—
—60	5.—	—
—70	6.—	—
—90	8.—	—
—80	7.—	—
—70	6.—	—
—80	7.—	—
—50	—	—
—40	3.50	30.—
—40	3.50	30.—

Amelanchier (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
florida <i>Lindley</i> (A. oxyodon <i>Koehne</i>)	—40	3.50	30.
Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend in aufrechtstehenden, rahmweissen Rispen zu Ende April.			
levis <i>Wieg.</i>	—70	6.—	50.
Sehr schlankwachsene, rotbraun austreibende Felsenbirne mit sehr grossen, bis 10 cm langen, weissen, rosa angehauchten, lockeren Blüthenständen im April. Blätter sehr gross, hellgrün, auf langen, roten Blattstielen.			
» pumila <i>Hort.</i>	—40	3.50	30.
Niedrige, buschige Form mit schlanken, kahlen, rotbraunen Zweigen und dicklichen, grünen Blättern.			
ovalis <i>Borkhausen</i>	—40	3.50	30.
Wuchs kräftig. Blatt rundlich, verkehrt oval, etwa 7:5 cm, an der Spitze gekerbt, dunkelgrün, im Herbst in orangeroten bis tief rotbraunen Tönen variierend.			
rotundifolia <i>Dum-Cours</i> (<i>vulgaris Moench</i>). Gewöhnliche Felsenbirne	—50	4.50	—
Bis 1½ m hoch werdender Strauch. Blüht Anfang Mai in lockeren weissen Doldentrauben. Blätter schön grün, unterseits silberigweiss, stark wollig behaart.			
spicata <i>Koehne</i>	—40	3.50	30.
Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in gedrängten, mehrblütigen, weissen Trauben.			
utahensis <i>Koehne</i> . Utah-Felsenbirne mit Topfballen	1.50	—	—
Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigem Wuchse. Zweige rotbraun.			
Amorpha <i>Linné</i> . Bastardindigo (<i>Leguminosae</i>).			
fruticosa <i>Linné</i> . Gemeiner Bastardindigo, B.	—60	5.—	—
Wirkt mit den gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden, violettblauen, bis 15 cm langen, ährenartigen Blütenrispen sehrzierend.			
» crispa <i>Hort.</i>	—60	5.—	45.
Blätter kraus, sonst wie die vorige.			
» croceolana <i>C. S.</i>	—60	5.—	—
Form mit kurz gelbbraunfilzigen Trieben und leicht abstehender Behaarung. Blättchen stumpfspitzig.			
» pendula <i>Carr.</i>	—60	—	—
Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.			
microphylla <i>Pursh.</i> (<i>nana Nutt</i>)	—60	—	—
Sehr seltene, kleinblättrige Art aus Nordamerika.			
Ampelopsis , siehe Schlingpflanzen.			
Amphirapis , siehe Microglossa.			
Amygdalus <i>Linné</i> . Mandel (<i>Rosaceae</i>).			
nana <i>Linné</i> . Zwergmandel, B. starke Sträucher	1.20	10.—	80.
Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang April reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt.			
Andrachne <i>Linné</i> . (<i>Euphorbiaceae</i> .)			
colchica <i>Fisch. u. Mey.</i>	1.—	—	—
Vom Kaukasus, von niedrigem, aber sehr dichten, üppigem Wuchse. In Blatt, Blüte und Frucht an <i>Securinega</i> erinnernd.			
Andromeda <i>Linné</i> . (<i>Ericaceae</i> .)			
Reizende Ericaceen, die im Frühjahr mit den meist weissen Blüten geradezu überschüttet sind. Lieben frische, gute Heide- oder Moorerde in etwas halbschattiger Lage. Vertragen jedoch auch volle Sonne. (Siehe auch unter <i>Leucothoe</i> und <i>Lyonia</i> .)			
floribunda <i>Pursh.</i> Reichblumige Andromeda. 30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
40—50 » »	2.50	22.—	200.
60—80 » »	3.—	28.—	—
Bis über 150 cm hoch werdender, immergrüner, buschiger Strauch mit dünnen, lederartigen, länglichen Blättern. Die grossen, weissen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im März—April, aufrechtstehend, den Strauch ganz bedeckend.			

Andromeda (Fortsetzung):

japonica Thunberg. Japanische Andromeda. .20—30 cm hoch
1½—2 m höher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön
grüner Belaubung und prächtigen, weissen, etwas überhängenden
Blütenähren im März—April.

paniculata Ait. (*Lyonia paniculata* Nutt) . . .40—60 cm hoch
Ein über meterhoch werdender, sattgrün belaubter Strauch.
Blüthen weiss, am Triebende gehäuft stehend. Juni.

polifolia Linné. Poleiblättrige Andromeda . . .mit Topfballen
Niedriges, kleinblättriges Sträuchlein mit blassrosafarbenen
Blütendolden im Mai—Juni.

speciosa Mich.30—40 cm hoch
Aufrechter, 50—100 cm hoch werdender, buschiger Strauch, mit
sehr grossen, glockenförmigen, weissen Blumen.

» *pulverulenta* Mich.40—60 cm hoch
Schöne Form mit vollständig blauweiss bereiften und bepuderten
Blättern. Von grosser Wirkung.

Aralia Maximowicz u. *pentaphylla*, siehe *Acanthopanax*.

Arctostaphylos Adams. Bärentraube (*Ericaceae*).

» *nevadensis* Graymit Topfballen
Eine wunderschöne, äusserst seltene, immergrüne *Ericacee*, die
im Mai mit andromedaartigen Rispen, sehr reich blüht. Triebe ent-
lang der Erde kriechend. Blatt verkehrt langoval, kurz gestielt,
etwa 7:1 cm gross, ledrig, von glänzend dunkelgrüner Färbung.

Aristolochia, siehe Schlingpflanzen.

Aristolotelia L'Heritier de Brutille (*Elaeocarpaceae*).

Macqui L'Heritiermit Topfballen
Kleiner, immergrüner, baumartiger Strauch mit länglichen, ge-
zähnten, glänzendgrünen Blättern. Verlangt Bedeckung.

Aronia Persoon. Zwergvogelbeere (*Rosaceae*).

arbutifolia Spach. Rotfrüchtige Zwergvogelbeere
Mit glänzend grünen Blättern, die eine herrliche Herbstfärbung
annehmen. Blumen weiss im Mai—Juni. Die glänzend scharlach-
roten Beeren sind sehr zierend.

nigra Koehne (*A. melanocarpa* Elliott)
Schwarzfrüchtige Zwergvogelbeere, der vorigen ähnlich.

Aukuba Thunberg. Aukube (*Cornaceae*).

japonica Thunberg.30—40 cm hoch
Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit
grossen, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktierten Blättern.
Blumen weiss. Beeren korallenrot.

» *atrovirens punctata*30—40 cm hoch
Blätter dunkelgrün, punktiert.

» *crassifolia aureo-variegata*30—40 » »
Eine eigentümliche, dickblättrige Art, buntblättrig.

» *dentata*30—40 » »
Blätter schön gezähnt.

» *longifolia punctata*30—40 » »
Langblättrige, punktierte Form.

» *salicifolia*30—40 » »
Weidenblättrige Aukube.

» *viridis*30—40 » »
Dunkelgrüne Belaubung.

Azalea, *L.* Azalee. (Siehe auch unter *Rhododendron*.) (*Ericaceae*).

Prachtvoll und dankbar blühende Gehölze, deren Flor zum grössten Teil in das Frühjahr
fällt, nur wenige blühen später. Lieben einen guten, sandigen Boden (Heideerde) in sonniger
bis halbschattiger Lage. Die Höhe der verschiedenen Arten schwankt von etwa 0,20 m bis 3 m.

mollis, gelbblühend, mit Knospen

30—40 cm hoch pro Stück M. 2.50, 10 Stück M. 22.—, 100 Stück M. 200.—

» rotblühend, mit Knospen

30—40 cm hoch pro Stück M. 2.50, 10 Stück M. 22.—, 100 Stück M. 200.—

pro Stück	pro 10 Stück.	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2.—	18.—	—
1.20	10.—	—
1.50	—	—
2.50	22.—	—
4.—	—	—
2.50	—	—
2.—	—	—
—40	3.50	30.—
—40	3.50	30.—
1.—	8.—	—
1.—	—	—
1.—	—	—
1.—	—	—
1.—	—	—
1.—	—	—

Azalca (Fortsetzung):**mollis sinensis** Hort., prachtvoll lachsrot30—40 cm hoch pro Stück M. 3.50, 10 Stück M. 32.—, 100 Stück M. 300.—
40—50 „ „ „ „ „ 4.—, 10 „ „ 38.—.**mollis Hybriden**, in ausgesucht schönsten Varietäten, Pflanze mit Knospen:30—40 cm hoch pro Stück M. 3.50, 10 Stück M. 32.—, 100 Stück M. 300.—
40—50 „ „ „ „ „ 4.—, 10 „ „ 38.—, 100 „ „ 350.—
60—80 „ „ „ „ „ 5.50, 10 „ „ 50.—.

Sortiment:

Alphonse Lavallée.

Blume lebhaft orange, scharlach nuanciert.

Baron Edmund de Rothschild.

Blume mennigrot, stark gelb gefleckt.

Charles François Luppis.

Blume dunkelrosa, magentarosa nuanciert.

Charles Kékulé.

Blume lachsorange, dunkelorange gefleckt.

» **Rogier.**

Blume weiss mit violett, gelb gefleckt.

Chevalier de Reali.

Blume hellgelb, in Weiss übergehend.

Comte de Gomer.

Blume lebhaft rosa, orange gefleckt.

» **Papadopoli.**

Blume orangerot, mit goldgelbem Fleck.

Consul Cérésolé.

Blume orangerot, mit hellnanking Reflex.

» **Pêcher.**Blume dunkelrosa, lachsfarbig schattiert,
mit goldgelbem Fleck.**Dr. Léon Vignes.**

Blume lebhaft gelb.

Dulcinée.

Blume lachsrot (orange).

Edison.

Blume hellrot, gelb gefleckt.

Esmeralda.

Blume rot, mit gelbem Fleck.

Frédéric de Merode.

Blume scharlachrot.

mollis × sinensis (Kostersche Hybriden).

Wiederholt preisgekrönte Varietäten, die sich durch sehr grosse Blumen und durch ihr glänzendes Farbenspiel auszeichnen.

Pflanzen mit Knospen, 30—40 cm hoch pro Stück M. 4.—

Alma Tadema.

Blume zartrosa, mit rotbraunem Fleck.

C. Maarschalk.

Blume orange, stark purpurn gefleckt.

Dr. Reichenbach.

Blume salmororange mit rotbraunem Fleck.

Emil Liebig.

Blume lachsfarbig mit nanking Reflex.

Frans v. d. Bom.

Hellorange mit purpurrotem Fleck.

General Vetter.

Blume nanking, starker Fleck.

pontica Linné. (Rhododendron flavum G. Don), Pontische Azalee.

Pflanzen mit Knospen, 30—40 cm hoch pro St. M. 2.50, 10 St. M. 22.—.

Allbekannte, sehr harte, gelb oder orangegoldgelb, in grossen, lockeren Doldentrauben blühende Azalee.

» **Hybriden**, Sämlingspflanzen, gemischt, mit Knospen

40—50 cm hoch, pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—.

Frère Orban.

Blume weissgelb, rosa geflammt.

General Brialmont.

Blume rosa, obere Petale goldgelb gefleckt.

» **Goffinet.**

Blume violett.

Gloire de Belgique.

Blume hellrosa, gelb gefleckt, rosa Band.

Hendrik Conscience.

Blume rosa, mit safrangelber Zeichnung.

I. C. van Toll.

Sehr grossblumig rot.

Mad. Arthur de Warelles.

Blume lachsrot, orange gefleckt.

» **Caroline Legrelle d'Hanis.**

Blume rosa mit Aurorarosa gezeichnet.

Mignonne.

Blume lebhaft rosa, gelb gefleckt.

Oswald de Kerchove.

Blume lebhaft rosa, obere Petalen gelb schattiert.

Prinz Baudouin.

Blume hellrot, purpur Zeichnung.

Sr. de Louis v. Houtte.

Blume weiss mit Rosa.

W. E. Gumbleton.

Blume hellnanking gelb, grünlichgelb gefleckt.

Azalea (Fortsetzung):**pontica Hybriden, Pflanzen mit Knospen, aus nachfolgendem Sortiment.**

30—40 cm hoch pro St. M. 3.50, 10 St. M. 32.—, 100 St. M. 300.—.
 40—50 » » » » » 4.—, 10 » » 38.—.

Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten Sorten
 als die schönsten ausgewählt.

Beauté de Flandre.

Blume gross, blutrot, leicht orange gefleckt.

Bouquet de flore.

Blume aurorarot, weiss liniert.

Clotilde.

Reichblühend, Grund weiss mit rosa Streifen.

coccinea speciosa.

Grosse Blume, orangescharlach, dunkelgelb gefleckt.

Comte Egmont.

Blume lilaziert rosa, gelb gefleckt.

Eugenie.

Blume goldig orangepurpur mit Karmin.

Fama.

Blume karmoisin, violett schattiert.

Goldlack.

Blume goldig orange mit dunkelbraunen Flecken.

Grandeur triomphante.

Blume dunkelamarant, orange nuanciert.

Guelderroos.

Blume lebhaft orange, chromgelb gefleckt.

Guillaume II.

Blume hell orangerot, dunkelorange gefleckt.

Heureuse surprise.

Blume milchweiss, rosa nuanciert.

Jenny Lind.

Blume nankingrosa mit Lachsfarben.

La surprise.

Blume lachsrosa, weiss liniert.

Louis Hellebuyk.

Blume feurig zinnober, orange nuanciert.

Miniata floribunda.

Niedrig, reichblühend, hochrot.

Pallas.

Blume hellrot, stark gelb gefleckt.

Princess Charlotte.

Blume prachtvoll frisch rosa, heller verwaschen.

Prinz Hendrik des Pays-bas.

Blume dunkelblutrot.

Rose de Flandre.

Blume lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss.

rubra splendidissima.

Blume dunkelkarminrot, schwach gelb gefleckt.

sinensis alba grandiflora.

Grosse, reinweisse Blume.

Sully.

Blume hell lachsorange.

Victoria.

Blume lachsrot, rosa nuanciert, dunkelgelb gefleckt.

pontica flore pleno Hybriden, gefüllt blühende Sorten:

Pflanzen mit Knospen 30—40 cm hoch, pro St. M. 4.—, 10 St. 38.—.

Arethusa.

Blume rahmweiss, hellnanking gestreift.

Graf von Meran.

Blume weiss mit leichtem Rosa.

Louis Ainée van Houtte.

Blume schön zinnoberrot, innere Petalen orange gestreift.

van Houttei flore pleno.

Blume lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt.

rustica flore pleno, gefüllt blühende Sorten:

Pflanzen mit Knospen, 30—40 cm hoch, pro St. M. 4.—, 10 St. M. 38.—,

» » » 40—50 » » » » » 5.—, 10 » » 48.—,

» » » 60—80 » » » » » 5.50, 10 » » 50.—.

Aida.

Violettrosa.

Apelles.

Reinweiss mit rosa Anflug.

Ariadne.

Weiss mit Rosa.

Freyä.

Aprikosenfarbig, Zentrum rot.

Hora.

Fleischfarbig rosa, im Aufblühen nanking.

Il Tassa.

Rot mit Nanking.

Le Titien.

Durchsichtig rosa mit gelbem Fleck.

Mecène.

Weiss.

Milton.

Weiss, rosa schattiert.

Murillo.

Rosa purpurn.

Norma.

Rot mit Nanking.

Phèbe.

Schwefelgelb.

Phidias.

Gelblichweiss, Zentrum dunkler.

Praxiteles.

Rot mit Nanking.

Ribera.

Weiss mit Rosa schattiert.

Velasquez.

Durchscheinend weiss.

Virgile.

Weiss mit gelbem Fleck.

Azalea (Fortsetzung):**Verschiedene Arten und Formen.**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
albiflora <i>O. Kuntze</i> 40–60 cm hoch Bis 1,5 m hoher Strauch mit häutigem, etwa 5:2 cm grossem, tiefgrünem Blatt. Die breitglockigen, bis 2 cm langen, weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr selten.	4.—	38.—	—
amoena <i>Caldwellii Hort.</i> 20–30 cm hoch mit Topfballen Schöne Gartenform. Blüte bis 5 cm Durchmesser, hellviolettrot nach der Mitte zu dunkler, Blumenblätter gewellt. Jede einzelne Blume steckt in einer kleineren Blume wie bei <i>Primula veris</i> ; Hose in Hose.	2.50	22.—	—
arborescens <i>Pursh.</i> 30–40 cm hoch 40–50 » » Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen, weissen, rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen in reicher Fülle entfaltet. Meist 6zählige Dolde. Blüte bis 7 cm Durchmesser.	3.— 4.—	28.— 38.—	— 350.—
balsaminiflora <i>Carr.</i> Solitärpflanzen 20–30 cm hoch Eine langsam wachsende, sich gut formende und freudig blühende Pflanze, für Topfkultur sehr geeignet. Hübsche, rosa gefüllte Form.	10.—	—	—
Hatsugiri <i>Hort.</i> Solitärpflanzen 20–30 cm hoch Japanische, reichblühende Sorte mit roten Blumen.	10.—	—	—
Hinode-giri <i>Hort.</i> Solitärpflanzen 40–60 cm hoch Japanische Form, die im Frühsommer einen grossen Flor leuchtend roter Blüten hervorbringt. Blüte 4 cm Durchmesser, trübkarminrot. Blätter spatelförmig, lackglänzend.	10.—	—	—
Kaempferi <i>Planch.</i> Solitärpflanzen 80–100 cm hoch Strauch mit rostig behaarten, jungen Trieben und etwa 5:2 cm grossen, lebhaft grünen Blättern. Die im April–Mai erscheinende Blüte ist hellorangerot bis rosa.	12.—	—	—
ledifolia leucantha <i>Hort.</i> 10–20 cm hoch mit Topfballen Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig, leuchtend gelblich. In der Jugend empfindlich. Auch für Topfkultur geeignet.	2.—	—	—
» narcissiflora <i>Hort.</i> (Yodogawa der Japaner.) Solitärpflanzen 60–80 cm hoch Gefällt blühende Sorte mit leuchtend purpurroten Blumen im Mai. Tief cattleyenfarbig, bis 6 cm Durchmesser.	10.—	—	—
odorata hybrida Davisii <i>Hort.</i> 30–40 cm hoch 40–50 » » 50 60 » » Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweißen, wohlriechenden Blumen, obere Petale hellgelb gefleckt.	3.50 4.— 5.50	32.— 38.— 50.—	— — —
Omurasaki <i>Hort.</i> 10–20 cm hoch mit Topfballen Schöne, japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpurroten Blumen im Frühjahr.	2.—	—	—
Tebotan <i>Hort.</i> 10–20 cm hoch mit Topfballen Prächtige, japanische Sorte mit gefüllten, purpurvioletten Blumen mit rotbraunen Flecken.	2.—	—	—
Vaseyi <i>Hort.</i> 30–40 cm hoch 40–50 » » 50–60 » » 60–80 » » Schöner, amerikanischer, baumartiger, bis 3 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebhaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai–Juni.	3.— 4.— 5.— 6.—	28.— 38.— 48.— —	— — — —
viscosa <i>L.</i> Klebrigblütige Azalee 30–40 cm hoch 1–1½ m hoch werdender Strauch, mit klebrigen Zweigen. Blumen Anfang Mai, weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa, 2½ cm Durchmesser in 7–8 cm breiten Dolden.	3.50	32.—	—
Berberis <i>Linné.</i> Berberitze, Sauerdorn (Berberidaceae), B. » siehe auch Mahonia.			
actinacantha <i>Martius.</i> Strahlendornige Berberitze Schöner Strauch mit rötlichbraunen Zweigen und starken, mehrteiligen Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, glänzend dunkelgrün. Blüht im Mai goldgelb, Früchte sehr gross, schwarzrot, schön blau bereift.	1.—	—	—
acuminata <i>Franch.</i> mit Topfballen Immergrüner Strauch, junges Holz glänzend rot; die Blätter sitzend, lanzettförmig und dornig längs des Randes. Die gelben Blumen erscheinen in Büscheln im Mai.	1.50	—	—

Berberis (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
aetnensis Presl. Aetna-Berberitze.....	—60	5.—	45.—
Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünfteiligen Dornen. Blätter lederartig, 1—2 cm lang, 6—12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten in dichten, 5- bis 10blütigen Trauben im Mai.			
aggregata C. S.	—60	5.—	45.—
Kleinerer Strauch, der im Aussehen <i>B. buxifolia</i> ähnelt. Belaubung länglich eiförmig, bis 15:7 mm gross, hell- bis lebhaft grün. Blüte gelb, in dichten Trauben im Mai—Juni; die ihnen folgenden, kleinen Früchte sind durchscheinend gelblichweiss, schwach bereift			
amurensis Rupr.	—40	3.50	—
Schöne, grossblättrige Belaubung von rhombischer Form, lang und scharf gezähnt; prächtige Herbstfärbung.			
angulosa Wall.	1.—	—	—
Bis 1½ m hoher Strauch. Blüten meist einzeln sattgelb, 15 mm Durchmesser. Früchte rot, glänzend, essbar. Herbstfarbe rot.			
brachybotris Edgew.	—40	3.50	—
Wuchs stark, Triebe in der Jugend purpurrot, später grau. Blätter meist gebüscht, sehr kurz gestielt, Rand stachelig gezähnt, bis 5:3 cm gross, verkehrt oval bis elliptisch, grün, eine prachtvolle, glühend scharlachrote Herbstfärbung annehmend.			
brachypoda Maxim.	1.—	9.—	—
Ein hübscher, bis 2 m hoch werdender Strauch aus dem westlichen Hupeh, vorkommend in einer Höhe von 3200—3600 m. Blumen gelb, Früchte scharlach.			
Bretschneideri Rehd.	1.50	14.—	—
Aufrechtwachsender Strauch. Einjährige Zweige dunkelbraunrot, später grau. Dorn einfach, hellbraun, über 1 cm lang. Blüten erscheinen im Mai. Früchte reifen im September. Herbstfärbung orange und scharlach.			
brevipaniculata C. S.	—60	5.—	45.—
Aufrecht- und dichtwachsender Strauch mit abfallenden Blättern, der bis 180 cm hoch wird. Zweige leuchtend rot. Blumen hellgelb. Im Herbst sind seine rosa gefärbten Früchte sehr zierend.			
buxifolia Poir (<i>B. dulcis Sweet</i>) Buchsbaumblättrige Berberitze.....	—60	5.—	—
Bis ½ m hoch werdender, ausgebreiteter Strauch mit rotbraunen Zweigen und schönen, goldgelben Blütentrauben im April—Mai. Beeren gross, schön blau bereift.			
buxifolia nana Hort. (<i>B. dulcis nana</i>)..... 20—30 cm hoch	—60	5.—	45.—
30—40 „ „	—70	6.—	50.—
Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.			
Caroli hoanghensis Schneider (<i>B. Vernae</i>).....	1.—	8.—	—
Stammt aus dem westlichen Szechuan aus einer Höhe von 3000 bis 4000 m. Busch 1,30—3 m hoch. Frucht lachslot. Bildet schöne Hecken.			
caroliniana Loud.	—60	5.—	—
Blüht im Juli, hellgelb.			
chitria Hamilt.	—60	5.—	—
Sehr hübsche Art, die bis fast 2 m Höhe erreicht und in Blatt und Frucht viel Ähnlichkeit mit <i>B. aristata</i> hat.			
circumserrata , siehe <i>B. diaphana circumserrata</i> .			
concinna Hort.	—40	3.50	30.—
Strauch hat rotbraune Zweige mit bis 1,8 cm langen Dornen. Blatt bis 3:2 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits stark weisslich. Blüte tiefgelb, Mai—Juni. Frucht rot.			
Coryi Veitch	1.—	8.—	—
Ein dichtwachsender Strauch von aufrechtem Wuchs. Blätter klein, aber zahlreich. Im Herbste durch seine Massen von korallenroten Beeren in herrlichen Büscheln und im Frühjahr durch die reichlich hervorgebrachten, gelben Blumen sehr zierend.			
Darwini Hooker mit Topfballen	1.50	12.—	—
Bis 1 m hoch werdender Strauch mit oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten goldgelb, April—Mai, oft rötlich angehaucht. Immergrün.			
diaphana Maxim	—60	5.—	—
Aus China stammender, kräftig und aufrechtwachsender Strauch. Die gelbbraunen Zweige sind mit über 2 cm langen Stacheln besetzt. Frucht durchsichtig gelbrot.			

Berberis (Fortsetzung):**diaphana circumserrata** (B. circumserrata) *Schneider*

mit Topfballen

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

1.50

—

—

Neue, sehr seltene Varietät, die besonders durch die ringum gesägten Blätter leicht zu erkennen ist. Die Früchte enthalten nur 4 Kerne, während die Art 6—12 Kerne in einer Frucht aufweist. Die Früchte gleichen B. Tischleri, aber mit Bezug auf Blütenstand und Grösse nähert die Form sich mehr B. diaphana.

dulcis, siehe B. buxifolia.**dictiophylla Franch.**

1.—

—

—

Bis fast 2 m hoher Strauch mit kantigen, schön bläulichweiss bereiften Zweigen und etwa 2:1 cm grossen Blättern, die im Herbst herrlich gefärbt sind und bis nach Weihnachten am Strauch verbleiben. Blüten einzeln, schwefelgelb, im April—Mai. Die Früchte korallenrot.

» **albicaulis Hort.**, neu, sehr selten

1.50

—

—

Diese neue Form ist eine wirkliche Verbesserung; der Bau ist lockerer, die Belaubung grösser, und die Zweige und Unterseite der Blätter sind intensiv weissblau gefärbt. Sehr zierend, von grosser Wirkung.

Dielsiana Fedde

1.50

—

—

Ausgebreiteter, locker bezweigter Strauch. Die Blätter sind meist schmal elliptisch, diejenigen der kräftigen, jungen Triebe stumpfer und breiter mit ausgesprochen weisslicher Unterseite. Die Blütenstände sind verschieden, kürzer und fast traubenartig an der Spitze der Zweige und länger und mehr oder weniger rispig am Grunde. Die Früchte haben eine sehr kurze, zuweilen sehr unregelmässige Form.

Francisci-Ferdinandi Schneider

1.50

—

—

Ein 2—3 m hoch werdender Strauch mit rötlichen, bewehrten Trieben und ovaler bis ovallanzettlicher, meist zu sechs gehäufte, lebhaft grüner Belaubung, von 2—7:1—3 cm Grösse. Die im Mai bis Juni zahlreich erscheinenden Blüten sind gelb; Früchte scharlachrot.

Gagnepaini C. S.

1.50

—

—

Eine hübsche, immergrüne Berberitze von kompaktem Wuchs, die im Monat Juni einen reichen Flor hellgelber Blumen bringt. Beeren bläulichpurpurrot. Blätter lanzettförmig 5—10:1—2 cm gross mit stacheligen Rändern, tiefgrün.

glaucescens St. Hill

—60

5.—

45.—

Strauch 1,5 m hoch mit dünnledrigen Blättern und schwarzen Früchten.

Guimpeli K. Koch

1.50

—

—

Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchs und etwa 1 m Höhe. Blüte goldgelb, Mai—Juni.

Hookeri compacta Hort.

1.50

—

—

Ähnlich der Art, von mehr kompaktem Wuchs, mit kleineren, mehr gebuchteten Blättern.

» **var. typica Lemaire**

1.50

—

—

Schöner, immergrüner Strauch mit gelbrötlichen Zweigen und dreiteiligen scharfspitzen, bis 3 cm langen Dornen. Blätter meist zu dreien stehend, dick lederartig, kurz gestielt, bis 8 cm lang und 2—2½ cm breit, glänzend dunkelgrün. Blüte schwefelgelb. Frucht bläulichschwarz mit hellem Reif.

integerrima Bnge

—60

—

—

Ganzrandiger Sauerdorn mit härtlichen, fast lederartigen Blättern. Beeren heller oder dunkler rot.

japonica Spreng.

—60

—

—

Schöner, zu B. Thunbergi gehörender Strauch. Blätter feiner und dunkler grün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektiv.

Julianae Schneider

1.50

—

—

Bis 2 m hoher Strauch mit jugendlich gelblichen Trieben, Stacheln stark, dreizählig, bis 4 cm lang, gelblichbraun. Blätter meist zu 5 gehäuft, lederig, oval bis ovallanzettlich, 3—8:1—2 cm gross; Rand stachelzählig. Färbung oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte gelb, bis 15 in Trauben, Beeren schwarz, bläulich bereift.

Neuberti Lemaire (M. Aquifolium × B. vulgaris)

1.50

14.—

—

Grosse, lederartige, graugrüne, teils einfache, teils gefiederte Blätter. Halbimmergrün, ziemlich starkwachsend.

pachyacantha Koehne

1.50

—

—

Strauch bis 2 m hoch. Zweige dunkelgelbbraun, glänzend, dick und starr, rutenförmig aufrecht, Stacheln einfach oder dreiteilig, bis 2 cm lang. Blätter auffallend hellgrün, gleichmässig borstig gezähnt.

Berberis (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
parvifolia <i>Sprag</i>	—60	—	—
Eine äusserst schöne, 1—1,25 m hoch werdende, kompakt wachsende Art mit bis 25 mm langen, zu dreien rechtwinklig zueinander gestellten Dornen. Blätter spatelförmig, bis zu 10 in einer Rosette vereinigt. Blüten klein, kugelförmig, goldgelb bis zu 10 in den Achselhöhlen vereinigt.			
pruinosa <i>Franchet</i> . Bereifte Berberitze mit Topfballen	1.50	—	—
Schöner Strauch mit grossen, unterseits weisslichen Blättern von rundlich-ovaler Form und von etwa 5:3 cm Grösse. Wuchs breitgehend. Blüte hellgoldgelb, April—Mai.			
ruscifolia <i>Lam.</i>	—60	—	—
Schwachwachsender Strauch von sparrigem Wuchs. Blatt 25:12 mm, eirundlich, stumpfgrün, leicht gewellt.			
sinensis <i>Desf.</i>	—40	3.50	30.—
Bis 1,8 m hoher Strauch mit tiefpurpurnen, etwas kantigen Zweigen. Blatt 4:1 cm gross, tiefgrün.			
spathulata <i>Schrad.</i>	—40	3.50	30.—
Dekorative Art mit langen, übergeneigten Ästen und Zweigen, die im Mai mit zahlreichen, lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt sind. Beeren korallenrot.			
subcaulialata <i>C. S.</i>	1.50	—	—
Strauch dichtverzweigt, von kräftigem Wuchs. Blatt derb, verkehrtlanceförmig, bis 2,5:0,7 cm gross, hellbläulichgrün.			
Thunbergi <i>de Cand.</i>	—60	5.—	45.—
Niedriger Strauch mit blassgelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennigrote Herbstfärbung.			
• Maximowiczii <i>Franchet & Savat</i>	—60	5.—	—
Blätter kleiner als die der Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>B. japonica</i> , jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei <i>B. japonica</i> .			
• minor <i>Hort.</i>	1.50	—	—
Niedrig bleibende Form von kompaktem Wuchs.			
Tischleri <i>Schneider</i> mit Topfballen	1.50	—	—
Strauch von etwa 2½ m Höhe, Stacheln bis zu dreien, etwa 2½ cm lang, gelblich gefärbt. Blätter hautartig, zu 8 gebüschtelt, länglich oval, kurz gezähnt gesägt, oberseits tiefgrün, unterseits heller und bereift. Blüte gelb in Scheindolden. Früchte gelblichrot.			
Veitchii , <i>Schneider</i> mit Topfballen	1.50	—	—
Ein besonders schöner, immergrüner Strauch. Blätter sitzend 3:15 cm, lanzettförmig und dornig längs des Randes. Die Blattform gleicht <i>B. acuminata</i> , ist jedoch in allen Teilen grösser. Sehr empfehlenswert.			
Vernae , siehe <i>B. Caroli hoanghensis</i> .			
verruculosa <i>Hemsl et Wils.</i> mit Topfballen	1.50	—	—
Schöner, immergrüner Strauch mit hellgrüner, scharf stachelzähniger, kleiner Belaubung. Blüte groß, goldgelb; Früchte länglich, hellblau.			
virescens <i>Hooker fil.</i>	—60	5.—	—
Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.			
vulgaris <i>Linné</i> . Gemeine Berberitze	—40	3.50	30.—
Die roten Früchte werden zum Einmachen benutzt.			
• atropurpurea <i>Regel</i>	—40	3.50	30.—
Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung, der in keinem Garten fehlen dürfte. Blüht ungemein dankbar.			
• emarginata <i>Hort.</i>	—40	3.50	—
Eine von der Art wenig abweichende Form, mit eingekerbten Blättern.			
• sulcata <i>K. Koch</i>	—40	3.50	—
Von der Art wenig unterschiedliche Form.			
Wilsonae <i>Hemsl.</i>	1.50	—	—
Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche bildend, mit langen Stacheln. Die Blumen sind von einer schön goldigen Farbe, jedoch die Hauptanziehung dieser Neuheit ist die schöne, karminrote Färbung des Laubes im Herbst.			
yunnanensis <i>Franch.</i>	—60	—	—
Strauch bis 2 m hoch, ähnlich <i>B. diaphana</i> , doch sind die Zweige rundlicher, Blätter kleiner, an Blütenzweigen meist ganzrandig. Blüte bis 18 mm Durchmesser.			

Buxus (Fortsetzung):**sempervirens** *L. (arborescens Miller)*

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1000 St. M. 700.—	Pyramiden 20—25 cm hoch	1.—	8.—	75.—
1000 » » 800.—	» 25—30 » »	1.50	10.—	90.—
	» 30—40 » »	2.50	20.—	150.—
	» 40—50 » »	3.50	32.—	300.—
	» 50—60 » »	4.—	38.—	375.—
	» 60—70 » »	5.—	48.—	450.—
	» 70—80 » »	7.—	65.—	—
niedrige, feste Kugel	15—20 cm breit	2.—	15.—	125.—
» » »	» 20—25 » »	2.50	20.—	180.—
» » »	» 25—30 » »	3.—	25.—	200.—
» » »	» 30—35 » »	3.50	30.—	250.—
» » »	» 35—40 » »	4.50	42.—	—
niedrige, viereckig geschnittene	30 40 » hoch	2.50	20.—	150.—
» » »	40—50 » »	3.50	32.—	300.—

Kronenbäumchen:

Stammhöhe 25—30 cm, Kronendurchmesser	20—25 cm	3.—	25.—	200.—
» 35—50 » »	15—20 »	4.—	35.—	300.—
» <i>angustifolia</i> <i>Loud.</i> ... breite Pyramiden	80—100 cm hoch	10.—	—	—
Baumartigwachsende, in Algier wild auftretende Form mit schmalen, etwa 4:1 cm grossen Blättern.				
» <i>argenteo-variegata</i> <i>Hort.</i> ... Pyramiden	55—70 cm hoch	6.—	—	—
Schöne weissbunte Form.				
» <i>aureo-variegata</i> <i>Hort.</i> ... Pyramiden	100—125 » »	10.—	—	—
Belaubung gelbbunt.				
» <i>Handworthi aureo-variegata</i> <i>Hort.</i>	Pyramiden 125—150 cm hoch	12.—	—	—
Schöne, grossblättrige, gelbbunte Form.				

Callicarpa *L. Schönfrucht (Verbenaceae).*

Schöne, bis etwa 2 m hohe Gehölze für sonnige, warme Lagen und durchlässigen Boden. Den im Juni—Juli erscheinenden, kleinen Blüten folgen beerenartige Früchte, die im Herbst eine prächtige, rötlich- bis bläulichviolette Färbung annehmen, über welche ein zarter, weisser Reif liegt.

americana *L.* Amerikanische Schönfrucht ... mit Topfballen
Etwa 1 m hoher Strauch. Blüht Juni—Juli in blaupurpurnen Scheindolden.

chinensis *Hort.* ... mit Topfballen
In der Belaubung *C. americana* ähnlich. Hat hier noch nicht gefruchtet.

Giraldiana *Hesse* ... 1.50 — —
Der Strauch wächst sehr stark und ist härter als alle anderen Arten, bringt im Sommer eine Unmasse Blüten und ist besonders im Herbst eine prachtvolle Zierde, wenn er mit den grossen, wunderschön rötlich blauvioletten, weiss bereiften Früchten bedeckt ist.

japonica *Thunb.* Japanische Schönfrucht ... 1.50 12.— —
1 1/2 m hoher Strauch, mit vielblütigen, weissen Scheindolden. Er hat von allen *Callicarpa*-Arten das kleinste Blatt.

longifolia *Lam.* ... mit Topfballen 1.50 — —
Sehr starkwachsende Art mit grosser, länglicher, lang zugespitzter Belaubung von sattgrüner Färbung. Unterscheidet sich in der Belaubung wenig von *C. Giraldiana*. Hat hier noch nicht gefruchtet.

Calluna *Salisbury.* Besenheide. Siehe auch **Erica** (*Ericaceae*), **B.**

<i>vulgaris</i> <i>Alporti</i> <i>Hort.</i> ...	— .75	6.—	50.—
Von aufrechtem Wuchs, mit leuchtend dunkelroten Blüten.			
» <i>argentea</i> <i>Hort.</i> ...	— .75	6.—	50.—
Belaubung silbergrau, Blüten lila, Wuchs niederliegend.			
» <i>aurea</i> <i>Hort.</i> ...	— .75	6.—	—
Intensiv gelbe Belaubung, Blüten hellilarosa.			
» <i>compacta</i> <i>Hort.</i> ...	— .75	6.—	50.—
Gedungen wachsende Zwergform mit rötlichen Blüten, ähnlich <i>pumila</i> .			
» <i>cuprea</i> <i>Hort.</i> ...	— .80	—	—
Die kupferfarbige Belaubung ist besonders wirkungsvoll.			

Calluna (Fortsetzung):

<i>vulgaris erecta alba Hort.</i>	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Aufrechtwachsende, weissblühende Form, ähnlich <i>stricta</i> , jedoch etwas stärker wachsend.	—75	6.—	—
» <i>nana Hort.</i>	—75	6.—	—
Ebenfalls rotblühende Zwergform.			
» <i>pitosa Hort.</i>	—75	6.—	—
Starkwachsende, feine und zierliche Form mit reinweissen Blüten.			
» <i>pumila Hort.</i>	—75	6.—	50.—
Dichte, zierliche Polster bildend. Blüten rötlichlila.			
» <i>stricta Hort.</i>	—75	6.—	50.—
Aufrechtwachsende, sehr empfehlenswerte, weissblühende Form.			

Calycanthus L. Gewürzstrauch (Calycanthaceae).

Schön belaubte, 2—4 m hohe Sträucher für halbschattige bis sonnige Lage und jeden guten Boden. Die fleischigen, meist rötlich-braun gefärbten Blüten erscheinen im Frühsommer.

<i>florida L.</i>	1.20	10.—	—
Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben einen starken, erdbeerartigen Geruch.			

Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.**Caragana Lamarck.** Erbsenstrauch (Leguminosae).

Schönblühende, bis 6 m hohe Sträucher, mit meist gelben Blüten im Frühjahr. Sie gedeihen selbst in trocknen, sonnigen Lagen und sandigem Boden noch sehr gut.

<i>ambigua Stocks.</i>	Sträucher 60—80 cm hoch	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 »		2.—	—	—
Sehr starkwachsende Sorte mit langen, gebogenen Zweigen.				

<i>arborescens Lam.</i> Baumartiger Erbsenstrauch.	Sträucher	—60	5.—	45.—
Allbekannter Strauch mit feingefiederten Blättern und gelben Blüten im Mai; bis 6 m hoch.				

» <i>albescens Bois</i>	Sträucher 60—80 cm hoch	1.50	12.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 »		2.—	18.—	—
Der Art ähnlich, mit hellerer Belaubung.				

» <i>Boisi C. S.</i>	Sträucher 40—60 cm hoch	1.50	12.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 »		2.—	—	—
Kleinere, mässig stark wachsende Form, dünntriebige. Blatt klein, dunkelgrün; Fiederchen mit langer Stachelspitze.				

» <i>Lorbergii Koehne</i>	Sträucher 80—100 cm hoch	1.50	12.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm, 8—10 cm Umfang		2.—	18.—	—
Ausserordentlich zierliche, federartige Belaubung.				

» *pendula*, siehe Trauerbäume.

» <i>Redowskii Fischer</i>	Sträucher 100—120 cm hoch	1.50	12.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 »		2.—	—	—
Strauch bis 2 m hoch werdend. Blätter länglich keilförmig, oft abgestutzt. Im Mai blühend.				

argentea, siehe Halimodendron.

brevispina Royle. Kurzdorniger Erbsenstrauch.

Sträucher 80—100 cm hoch	1.50	12.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 »	2.—	18.—	—

<i>decorticans Hemsl.</i>	Veredelungen 40—60 » hoch	1.50	—	—
Kleiner, dünntriebiger Strauch, stark und scharf stachelspitz.				

frutescens de Cand. Kleiner Erbsenstrauch.

Sträucher 40—60 cm hoch	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 »	2.—	—	—

Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai lebhaftgelb. Sehr früh, schwefelgelb austreibend.

» <i>acutifolia Hort.</i>	Sträucher 60—80 cm hoch	1.50	12.—	—
Spitzblättrige Form mit goldgelben, über 3 cm lang gestielten Blüten.				

» <i>cucullata Hort.</i>	Sträucher 20—30 cm hoch	1.50	—	—
Schmallängliche, etwas muldenförmige Fiederblättchen.				

<i>glomerata</i>	Sträucher 40—60 cm hoch	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 »	2.—	—	—	—
Belaubung graugrün, Blättchen vierteilig.				

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Carpinus L. Weissbuche, Hornbaum (Betulaceae).			
Betulus L. Gewöhnliche Weissbuche.			
Verpflanzte, buschige Pyramiden 80—100 cm hoch	—70	6.—	50.—
1000 St. M. 450.—			
» » » 100—120 cm hoch	—80	7.—	60.—
1000 St. M. 550.—			
» » » 120—150 cm hoch	1.—	9.—	80.—
1000 St. M. 750.—			
» » » 150—170 cm hoch	2.—	18.—	—
» » » 200—250 » »	2.50	—	—
Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwendet.			
„ Siehe auch unter „Junge Laubhölzer“.			
» <i>incisa Hort.</i> Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	—	—
120—150 » »	2.—	—	—
Zierlich eingeschnittene Belaubung.			
» <i>pyramidalis erecta nova Hort.</i>			
Pyramiden 80—120 cm hoch	2.—	18.—	—
» 120—150 » »	3.—	28.—	—
» 150—200 » »	5.—	—	—
Form von aufrechtem, straff pyramidalem Wuchs. Sehr empfehlenswerte Säulenform.			
<i>yedoënsis Max</i> Pyramiden 60—80 cm hoch	1.50	—	—
Sehr zierend durch dichte, feine, überhängende Zweigchen und silberglänzende Triebspitzen.			
Castanea Miller. Kastanie (Fagaceae).			
<i>vesca albo-marginata Hort.</i> Veredelungen 50—80 cm hoch	1.50	—	—
Form mit schön weiss berandeten Blättern.			
» <i>heterophylla dissecta Hort.</i> Veredelungen 50—80 cm hoch	1.50	—	—
Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet.			
Ceanothus L. Säckelblume (Rhamnaceae).			
<i>americanus L.</i> Amerikanische Säckelblume 1.— 9.— 80.—			
Der Strauch ist während des ganzen Sommers mit zierlichen, weissen Blütenrispen bedeckt.			
<i>hybridus azureus grandiflorus</i> mit Topfballen 1.50 — —			
Grossblumig, blassblau.			
» <i>Céres</i> mit Topfballen 1.50 — —			
Eine Hybride mit rosa gefärbten, aufrechten Dolden.			
» <i>Gloire de Versailles</i> mit Topfballen 1.50 — —			
Eine der allerschönsten Varietäten mit langen Rispen dunkel-azurblauer Blumen.			
» <i>Pinguet-Guidon</i> mit Topfballen 1.50 — —			
Sehr schön leuchtend karminrot.			
Celastrus , siehe Schlingpflanzen.			
Celtis Linné. Zürgelbaum (Ulmaceae).			
<i>australis L.</i> Sträucher 60—80 cm hoch 1.— — —			
Alte Bäume von malerischer Tracht. Blätter geschwänzt, ziemlich derbhäutig. Früchte violettbraun.			
<i>occidentalis L.</i> Sträucher 40—60 cm hoch 1.— 9.— —			
Kleiner bis mittelgrosser, ganz harter Baum mit etwas hängenden, weisspunktigten Ästen; Blätter bis 15 cm lang.			
Cephalanthus L. Knopfblume (Rubiaceae).			
<i>occidentalis L.</i> Abendländische Knopfblume —70 6.— —			
Bis 1½ m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner, glänzender Belaubung und weissen, langgestielten, kugelligen Blütenköpfchen im Juli—September. Feuchte Lagen.			
Cerasus , siehe Prunus.			
Ceratostigma Bunge. Hornnarbe (Plumbaginaceae).			
<i>plumbaginoides Bunge.</i> Bleiwurzarartige Hornnarbe mit Topfballen 2.— — —			
Aus China. Mit kriechendem Wurzelstock, dünnen, roten Trieben mit ganzrandigen Blättern und tiefblauvioletten Blütenköpfchen im August—Oktober.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 1 Stück M. Pf.
Cercidiphyllum Sieb. u. Zucc., Judasbaumblatt (Trochodendraceae).			
<i>japonicum</i> Sieb. u. Zucc. Sträucher	— 90	8.—	75.—
Schön belaubter, japanischer Baum von schlankem, pyramidalem Bau. Blätter rund oder rundoval, bis 6 cm Durchmesser. Austrieb braunrot oder purpurfarbig.			
Chaenomeles , siehe Cydonia.			
Chamaecerasus , siehe Lonicera.			
Chionanthus L. Schneeflockenbaum (Oleaceae).			
<i>retusa</i> Ldl. et Paxt. mit Topfballen	2.—	—	—
Mittelhoher, gedrunken wachsender Strauch mit mässig grosser, tiefgrüner Belaubung und kompakten, rahmweissen Blütenständen.			
Choisya Kunth (Rutaceae).			
<i>ternata</i> Kunth mit Topfballen	1.50	—	—
Immergrüner, kleiner Strauch mit dreizähliger, sattgrüner Belaubung. Blüte weiss, duftend, in Trugdolde; April—Mai.			
Cladrastis Raf. Gelbholz (Virgilia) (Leguminosae).			
<i>amurensis</i> Bürgeri Maxim. (Maackia) Sträucher	1.—	—	—
Kleiner Baum oder Strauch mit gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen, einfachen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben.			
» <i>floribunda</i> Shir. Sträucher	1.—	—	—
Eine reichblühende Form.			
Clematis , siehe Schlingpflanzen.			
Clethra L. Scheineller (Clethraceae).			
<i>acuminata</i> Michaux. Spitzblättrige Clethra	1.—	—	—
Seltener, bis 2 m hoher Strauch mit hellgrünen Blättern. Blüten im Juli—September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend, reinweiss.			
<i>alnifolia tomentosa</i> Michx.	1.—	—	—
Dichtwachsender Strauch mit glänzend dunkelgrünen, keilförmigen Blättern. Blumenknospen zart rosa, aufgeblüht reinweiss.			
<i>barbinervis</i> Siebold u. Zucc. (C. canescens) ca. 80—100 cm hoch mit Topfballen	2.—	—	—
In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit verkehrt eiförmigen Blättern und grossen, weissen Blütentrauben im Juli—September. Sehr selten.			
Cocculus , siehe Schlingpflanzen.			
Colletia Commers. Jussieu (Rhamnaceae).			
<i>spinosa</i> Lam. mit Topfballen	2.—	—	—
Kleiner Strauch mit dicht verzweigten, dornigen Trieben von dunkelgrüner Färbung mit kleinen, lanzettlichen Blättchen.			
Colutea L. Blasenstrauch (Leguminosae).			
<i>arborescens</i> L. Baumartiger Blasenstrauch, B. Sträucher	— 50	4.—	35.—
3—4 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb den ganzen Sommer hindurch.			
» <i>crispa</i> Kirch.	— 75	7.—	—
Niedriger Strauch mit gekrausten Blättern.			
» <i>pygmaea</i> hort.	1.—	—	—
Niedrige Form mit 5—7 etwas blasigen Blättchen.			
<i>gracilis</i> Freyn. et Sint	1.—	—	—
Sehr seltener, äusserst zierlicher Strauch, der bis 3 m Höhe erreicht.			
<i>longialata</i> Koehne.	— 75	7.—	—
Langflügeliger Blasenstrauch mit goldgelben Blüten.			
<i>media</i> Willd. (arborescens × orientalis) Bastard-Blasenstrauch	— 75	7.—	—
Blüten von Ende Mai bis September, orange-gelb.			
<i>orientalis</i> Mill. Rotblühender Blasenstrauch	— 75	7.—	—
Belaubung graugrün, Blumen braunrot. Strauch 2 m hoch.			
<i>violacea</i>	— 75	7.—	—
Starkwachsend, aufrecht. Belaubung sattgrün, unterseits seidig behaart. Blüten tiefgelb mit kleiner, roter Zeichnung in ungemein zahlreichen, vielblütigen Trauben.			
Comptonia , siehe Myrica.			
Corchorus , siehe Kerria.			

Coriaria L. Gerberstrauch (Coriariaceae).

myrtifolia L. Wuchs stark, überhängend, halbstrauchig; Holz rötlich, stark fächerartig verzweigt. Blatt sitzend, eiförmig, 7:3½ cm gross, sattgrün, ganzrandig, unterseits heller.

Cornus L. Hartriegel. (Cornaceae.)

alba *Wangenheim*. Weisses Hartriegel Holz rotbraun, blüht den ganzen Sommer hindurch in weissen, endständigen Blütenköpfen. Beeren blauweiss.

» **flaviramea**, *Späth* Wirkt im Winter durch hellgelbe Bezweigung recht zierend und bildet einen hübschen Gegensatz zu den rotholzigen Sorten.

» **albo marginata elegans** *Hort.* (sanguinea albo-marginata) Kronenbäumchen, 80—100 cm bis zur Krone Die schönste, weissbuntblättrige Form.

» **argenteo marginata** *Hort.* Starkwachsende Form, mit weiss gerandeten Blättern.

» **Gouchaulti** Sträucher Pyramiden 100—150 cm Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel, ähnlich „Späthi“ jedoch kräftiger wachsend.

» **nitida** *Koehne* Eine sehr grossblättrige, schöne Varietät.

» **Späthi Wittmack** Sträucher Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt goldgelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb.

alternifolia L. Ein bis 8 m hoher, kleiner Baum oder Strauch. Blüten Anfang Juli in lockeren, 8 cm breiten Scheindolden.

Amomum *Mill.* (C. sericea). Bläulicher Hartriegel 2—3 m hoher, buschiger Strauch, braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugeligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau. Für feuchte Lagen.

asperifolia *Michaux* Hübscher, raubblättriger Strauch mit graubraunen Ästen und blaurötlichen Zweigen. Blätter in der Jugend graufilzig, später dunkelgrün, Blumen weiss. Steinbeere kugelig, weiss.

australis *C. A. Meyer* Wuchs kräftig, Triebe rotbraun, in der Jugend leicht grau behaart. Blatt rundlich oval, 10:6½ cm, dunkelgrün. Herbstfärbung tief violettbraun.

Baileyi *Coulter et Evans* Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst C. alba ähnlich.

candidissima, siehe C. paniculata.

femina *Miller* (C. stricta L'Hér.) Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2 bis 3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen.

mas L. (Cornus mascula *Du Roi*), **B.** Kornelkirsche, starke Sträucher Bis 6 m hoher Strauch. Blüht goldgelb, vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse, längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.

» **argenteo-marginata** *Hort.* Sträucher, 80—100 cm hoch Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.

» **aurea** *Schelle* Pyramiden 100—120 » » Belaubung intensiv gelb.

» **fructu luteo** *Hort.* » 120—150 » » Sehr zierend durch die gelben Früchte.

» **macrocarpa** *Dippel* Pyramiden 150—200 » » Form mit grossen Früchten.

pubescens *Nutt.* Weichhaariger Hartriegel Aufrechter Strauch, bis 4 m hoch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren pfirsichrot gefärbt.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Coriaria L. Gerberstrauch (Coriariaceae).			
myrtifolia L.	1.50	—	—
Cornus L. Hartriegel. (Cornaceae.)			
alba <i>Wangenheim</i> . Weisses Hartriegel	—40	3.50	30.—
» flaviramea , <i>Späth</i>	—70	6.—	—
» albo marginata elegans <i>Hort.</i> (sanguinea albo-marginata) Kronenbäumchen, 80—100 cm bis zur Krone Die schönste, weissbuntblättrige Form.	—75 2.—	7.— 18.—	— —
» argenteo marginata <i>Hort.</i>	—70	6.—	50.—
» Gouchaulti Sträucher Pyramiden 100—150 cm Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel, ähnlich „Späthi“ jedoch kräftiger wachsend.	—75 1.50 2.—	7.— 14.— —	— — —
» nitida <i>Koehne</i>	—50	4.—	—
» Späthi Wittmack Sträucher Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt goldgelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb.	—75	7.—	60.—
alternifolia L.	—60	5.—	—
Amomum <i>Mill.</i> (C. sericea). Bläulicher Hartriegel	—50	4.—	35.—
asperifolia <i>Michaux</i>	—75	—	—
australis <i>C. A. Meyer</i>	—75	6.—	—
Baileyi <i>Coulter et Evans</i>	—50	4.—	35.—
candidissima , siehe C. paniculata.			
femina <i>Miller</i> (C. stricta L'Hér.)	—70	6.—	—
mas L. (Cornus mascula <i>Du Roi</i>), B. Kornelkirsche, starke Sträucher Bis 6 m hoher Strauch. Blüht goldgelb, vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse, längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.	1.50	12.—	—
» argenteo-marginata <i>Hort.</i> Sträucher, 80—100 cm hoch Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.	2.—	—	—
» aurea <i>Schelle</i> Pyramiden 100—120 » » Belaubung intensiv gelb.	2.—	—	—
» fructu luteo <i>Hort.</i> » 120—150 » » Sehr zierend durch die gelben Früchte.	2.—	—	—
» macrocarpa <i>Dippel</i> Pyramiden 150—200 » » Form mit grossen Früchten.	2.50	—	—
pubescens <i>Nutt.</i> Weichhaariger Hartriegel Aufrechter Strauch, bis 4 m hoch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren pfirsichrot gefärbt.	—75	6.—	—

Cornus (Fortsetzung):

sanguinea *L.* Gewöhnlicher Hartriegel
Mit braunroten Zweigen, etwa 3 m hoch werdend. Für
schattige bis sonnige Lagen, auch im trocknen Boden gut.

sericea, siehe *C. Amomum*.

tatarica argenteo-marginata *Hesse* Sträucher
Höhe bis zur Krone 100–120 cm

Unstreitig eine der schönsten, bunten *Cornus*-formen, die zu jeder
Jahreszeit eine andere Wirkung hervorruft. Im Herbst nimmt das
weissbunte Blatt eine lebhaft, rote Färbung an, während im Winter
die lebhaft korallenroten Zweige ins Auge fallen.

» **sibirica** *Lodd.*
Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigrotem, im Sommer
karminrotem Holze. Sehrzierend.

» **sibirica albo-variegata**
Effektvolle, buntblättrige Varietät der bekannten Art, mit im
Winter leuchtend-, fast mennigrotem, im Sommer karminrotem Holze.

Corokia *A. Cunn.* (Cornaceae.)

Cotoneaster *Raoul.* mit Topfballen
Niedrig bleibender Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Blätter
länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen, gelben, duftenden
Blumen erscheinen im Frühjahr. Winterschutz.

Coronilla *L.*, Kronwicke (Leguminosae).

Emerus *L.*
Niedriger Strauch mit gefiederten Blättern. Blüht von Mai bis
Juli in bis 3 cm lang gestielten, bis 3blütigen Dolden, hell- bis leb-
haft gelb. Für Halbschatten.

Corylopsis *Sieb. & Zucc.* Scheinhasel (Hamamelidaceae).

pauciflora *Sieb. & Zucc.* Armblütige Scheinhasel mit Topfballen
Dieser reizende Strauch wirkt im zeitigen Frühjahr durch seinen
reichen, mehrere Wochen anhaltenden Flor kleiner, schwefelgelber
Blüten.

platypetala levis *Rehd. et Wils.*, neu mit Topfballen
Bis 2 m hoher Strauch mit schlanken Zweigen und sehr schöner,
ovaler, hellgrüner Belaubung, die im Austrieb eine schöne, bronzirte
Färbung hat. Triebe lebhaft violettrot.

spicata *S. & Z.*
Hübsch belaubter, mittelhoher Strauch mit hellgelblichen Blüten-
trauben im Frühjahr.

Corylus *L.* Hasel (Betulaceae), **B.**

americana *Walt.*
Eine bis 3 m hoch werdende Art des östlichen Nordamerikas.
Auffallend sind die grossen Hüllen der Nüsse.

Avellana laciniata *Kirchn.*
Eine Form mit zierlich eingeschnittenen und gesägten Blättern.

» Grossfrüchtige Sorten, Goldhaselnüsse und rotblättrige
Zeller siehe Seite 12.

Columna *L.* Baumhasel, **B.** 100–150 cm hoch
Geschätzter Allee- und Parkbaum mit schöner Korkrinde, von
pyramidalem Wuchs und schöner, dunkelgrüner Belaubung, die bis
spät im Herbst grün bleibt.

rostrata *Ait.* Schnabelhasel
Fruchthülle in eine lange Röhre ausgezogen, die Nuss um mehr
als das Doppelte überragend. Meist zu dreien gepaart und dann
wagrecht abstehend. Sehrzierend.

Sieboldiana *Blume* mit Topfballen
Bildet einen dichtzweigigen Strauch mit bräunlichem Austrieb
und ovalen bis fast elliptischen, langgestielten Blättern an hell-
braunen Zweigen.

Cotoneaster *Med.* Zwergmispel (Rosaceae), **B.**

acuminata *Lindley.* Zugespitzblättrige Zwergmispel. Sträucher
Gelblichgrüne, später rotbraune Zweige. Längliche Blätter,
härtlich, mit Stachelspitze. Blüten weiss, Frucht braunviolett.

acutifolia *Lindley.* Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher
Schöne, glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braun-
schwarz. Strauch etwa 2 m hoch.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<i>sanguinea</i> <i>L.</i>	—,60	5.—	40.—
<i>tatarica argenteo-marginata</i> <i>Hesse</i>	—,75	7.—	60.—
	2.—	—	—
» <i>sibirica</i> <i>Lodd.</i>	—,70	6.—	50.—
» <i>sibirica albo-variegata</i>	—,75	7.—	60.—
<i>Cotoneaster</i> <i>Raoul.</i>	2.—	—	—
<i>Coronilla</i> <i>L.</i>	—,70	6.—	—
<i>Corylopsis</i> <i>Sieb. & Zucc.</i>	2,50	—	—
<i>pauciflora</i> <i>Sieb. & Zucc.</i>	3.—	—	—
<i>platypetala levis</i> <i>Rehd. et Wils.</i>	1,25	10.—	—
<i>spicata</i> <i>S. & Z.</i>	1.—	8.—	—
<i>Avellana laciniata</i> <i>Kirchn.</i>	1,50	—	—
<i>Columna</i> <i>L.</i>	2.—	18.—	—
<i>rostrata</i> <i>Ait.</i>	1.—	—	—
<i>Sieboldiana</i> <i>Blume</i>	2.—	—	—
<i>Cotoneaster</i> <i>Med.</i>	—,75	7.—	60.—
<i>acuminata</i> <i>Lindley.</i>	—,60	5.—	45.—

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cotoncaster (Fortsetzung):				
adpressa Boiss.	20—40 cm hoch	1.—	8.—	75.—
Ähnlich <i>C. horizontalis</i> , die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot. Für Felsenpflanzung.				
ambigua Rehd. et Wils.		—75	7.—	60.—
Etwa 2 m hoher Strauch mit ausgebreiteten, gekrümmten Ästen. Diesjährige Triebe gelblich striegelhaarig, vorjährige kahl, rotbraun. Blatt elliptisch oval, zugespitzt, 3—5:1—2,5 cm gross, oberseits anfangs spärlich behaart, aber bald kahl, untermits dicht behaart. Blütenstand 5—10blütig; Blüte klein. Frucht schwarz, eiförmig, 8—9 mm lang.				
amoena Wilson	mit Topfballen	1.50	—	—
Zu <i>C. Francheti</i> Bois. gehörend, unterscheidet sich davon durch lockeren, ausgebreiteten Wuchs, grössere Dolden und längere Blüten, wächst bedeutend kräftiger.				
applanata Veitch. (<i>C. Dielsiana</i>)	Sträucher	—60	5.—	45.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm				
Neue, sehr stark wachsende Art mit ovalen, dunkelgrünen Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzend roten Früchte werden in Massen hervorgebracht.				
bullata Boiss.	Sträucher	—60	5.—	45.—
Schöner Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgebauchten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgelblichgrauen Wolle bedeckt. Früchte lebhaftrot.				
congesta Bak. (<i>C. glacialis</i>)	mit Topfballen	2.—	—	—
Varietät von <i>C. microphylla</i> mit langen, kriechenden Zweigen und kleinen, freudiggrünen Blättern. Für Felsenpflanzung.				
Dammeri , siehe <i>C. humifusa</i> .				
divaricata Rehd. et Wils.		—60	5.—	45.—
1—2 m hoher Strauch mit zierlicher, feiner Verzweigung. Die schönen, eiförmigen Blätter sind 8—20 mm lang und 5—8 mm breit, oberhalb glatt, tiefgrün, unterseits leicht behaart. Blüten rosa, Früchte hübsch rot.				
foveolata Rehd. et Wils.		1.50	—	—
Eine neue, chinesische Art, die 2—3 m Höhe erreicht. Blatt elliptisch bis elliptisch eiförmig, bis 6 cm lang und 3 cm breit; oberseits dunkelgrün, unterseits an den Nerven dicht behaart. Rand gewimpert. Blüten weiss, leicht rosa getönt. Frucht kugelig, schwarz.				
Franchetii Boiss.	Sträucher	—70	6.—	50.—
Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone				
» 140—160 » » » »				
Bis 2 m hoher, sehr schöner Strauch mit langen, gebogenen Zweigen und oberseits sattgrüner, unterseits weissgelblicher Belaubung. Früchte von orangeroter Farbe.				
Henryana Rehd. et Wils. (<i>C. rugosa</i> Henryi <i>C. S.</i>)	mit Topfballen	2.—	—	—
Der <i>C. rugosa</i> sehr ähnlich, weicht aber ab durch dünnere und grössere Blätter, bis 9:3 cm gross, beiderseits behaart.				
horizontalis Decaisne (<i>C. Davidiana</i>).		—75	7.—	60.—
Starke Sträucher 30—40 cm Durchmesser				
Strauch mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, fast immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot. Für Felsenpflanzung.				
» perpusilla Schneider.	20—30 cm Durchmesser	—75	7.—	60.—
Es ist eine schmal- und kleinblättrige Form von <i>C. horizontalis</i> , die hauptsächlich in offenem Felsenrunde vorkommt.				
humifusa Duth. (<i>C. Dammeri</i>)		2.—	18.—	—
Eine kriechende, immergrüne Art von dichtem Wuchs, mit langen, niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkelgrüner Farbe bedeckt sind; einen erhöhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst. Für Felsenpflanzung.				
integerrima Med.		—60	5.—	—
Blüht mit kleinen, rosafarbenen Blüten in reichlichen Rispen entlang des vorjährigen Holzes.				
lanata Decne		1.—	8.—	75.—
Halb immergrüner, niedriger Strauch mit filzigen, einjährigen Trieben und Blättern. Blüte klein. Für Felsenpflanzung.				
laxiflora Jacq. fil. Blaufrüchtige Zwergmispel	Sträucher	—60	5.—	45.—
Bis 1½ m hoch werdender Strauch mit lauggestielten Doldentrauben. Frucht schwarz. Belaubung dunkelgrün.				

Cotoneaster (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lindleyi Steudel	—60	5.—	—
Empfehlenswerter Strauch mit blaugrünen Blättern und scharlachroten Früchten.			
lucida , siehe <i>C. acutifolia</i> .			
microphylla Wall.	1.—	8.—	75.—
Kleiner, niederliegender, meist immergrüner Strauch. Blatt klein, schmalelliptisch, dunkelgrün, Früchte klein, rot. Felsenpflanze.			
moupinensis Franchet	—60	5.—	45.—
Neuere, schöne Art, die <i>C. bullata</i> ähnelt, aber viel längere, nicht so blasig aufgetriebene Blätter hat. Früchte schwarz.			
multiflora Bunge (C. reflexa)	—75	7.—	—
Mit zierlichen, überhängenden Zweigen. Rötlich austreibend. Sehr reichblühend, weiss. Frucht rot. Blüht in 8—12 blütigen, kurzgestielten Trauben entlang des vorjährigen Holzes. Blüthen milchweiss, 10 mm Durchmesser.			
nigra Wahlberg. Schwarzfrüchtige Zwergmispel... Sträucher	—60	5.—	—
Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Frucht schwarz, bereift.			
nitens Rehd. et Wils	—75	7.—	60.—
Ziemlich niedrig bleibender, höchstens reichlich meterhoher Strauch mit dichter ausgebreiteter Verzweigung. Junge Triebe gelblichgrau behaart, ältere kahl, graubraun. Blatt breitovale bis rundlich, zugespitzt, etwa 10—12:9—10 mm gross, gleichfarbig lebhaft grün, unterseits spärlich behaart. Frucht schwärzlichrot, rundlich bis breit eiförmig, 7—8:5—6 mm gross.			
obtus Wall.	—60	5.—	45.—
Sträucher Starkwachsend, aufrecht, Belaubung mässig gross, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblich. Früchte schwarzpurpurn.			
pannosa Fr.	1.50	—	—
mit Topfballen Blätter klein, länglich, dunkelgrün, unterseits wollig und weiss. Die sehr zierende Frucht ist lebhaft rot.			
praecox Nan Shan, neu	2.50	20.—	—
Eine neue, wertvolle Einführung, die alle Cotoneasterarten von niederliegendem Wuchs an Schönheit weit übertrifft. Zweige oberseits glänzend rotbraun, unterseits grün. Die Blätter, mit kleineren Nebenblättchen, sind fast kreisrund, etwa 1 cm im Durchmesser, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün, stark gewellt. Hierdurch werden teilweise beide Blattseiten sichtbar und eigenartige Reflexe hervorgerufen, die dem Strauch einen schönen, metallischen Glanz verleihen. Unstreitig eine der besten kriechenden Felsenpflanzen.			
prostrata Hook.	1.—	8.—	—
Schöne, stark verzweigte, an der Erde liegende Art. Blatt sehr gross, hellgrün, abfallend. Sehr reichblühend, später übertoll von roten Früchten. Empfehlenswert für Felspartien.			
racemiflora K. Koch (C. Fontanesi Spach). Traubenblütige Zwergmispel.....	—60	5.—	45.—
Sträucher Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Doldentrauben, weiss. Frucht rot.			
» Meyeri Zabel.	—75	—	—
Ausgebreiteter, niedriger Strauch mit rundlichen, graugrünen Blättern und roten Früchten.			
» microcarpa Rehd. et Wils.	1.—	—	—
Diese Varietät steht der „ <i>C. racemiflora soongarica</i> “ betreffs ihrer Behaarung sehr nahe, aber die kleinen, eiförmigen Früchte unterscheiden sie leicht von dieser und allen anderen Formen von <i>C. racemiflora</i> . Es mag vielleicht eine bestimmte Art sein.			
» soongarica Schneider.	1.—	8.—	—
Ein 2—3 m hoher Strauch, in den trockenen, unfruchtbaren Flusstälern des westlichen Szechuan in einer Höhe bis 3000 Metern vorkommend.			
salicifolia floccosa Rehd. et Wils	2.—	18.—	—
mit Topfballen Strauch 2—4 m hoch mit schlanken, gekrümmten Ästen. Blätter ledrig, immergrün, länglich lanzettlich, kurz zugespitzt mit keilförmigem Grunde; meist 3—5 cm lang, 8—10 mm breit, oberseits lebhaft grün, glatt, runzelig, unterseits dicht flockig weissfilzig. Blütenstand dicht, 9—15 blütig. Frucht fast kugelig etwa 6 mm Durchmesser, lebhaft rot. Für Felsenbepflanzung geeignet.			

Cotoneaster (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<i>Simonsii Baker</i> Sträucher	—70	6.—	50.—
Kronenbäumchen 120—140 cm Stammhöhe	2.—	18.—	—
» 140—160 » »	2.50	20.—	—
Bekannter, halbbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend. Blüten rötlichweiss. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend.			
<i>tomentosa Lindl.</i> Sträucher	—60	5.—	45.—
1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblichgrau filzigen Zweigen. Blätter dunkelgrün, unterseits hell graufilzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.			
<i>vulgaris Lindley.</i> Gewöhnliche Zwergmispel Sträucher	—70	6.—	—
$\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit langen, rutenförmigen, braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulichdunkelgrün, unterseits gelbgrau filzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht scharlachrot.			
<i>Zabelii Schneider</i> Sträucher	—70	6.—	—
Aus dem westlichen Hupeh in 2000 m Höhe gesammelt. Zwei Meter hoher Strauch mit schlanken Zweigen; junge Triebe meist gelbgrau filzig. Blüten nelkenfarbig. Früchte rundlich, rot.			
Crataegus L. Weissdorn (Rosaceae).			
<i>Carrieri Vauvel</i> Pyramiden 150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 5—7 cm Umfang	4.—	35.—	300.—
Schöne, grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbbrot. Schöner Solitärbaum.			
<i>coccinea L.</i> Scharlachfrüchtiger Weissdorn.			
Pyramiden 60—80 cm hoch	—80	7.—	60.—
» 80—100 » »	—90	8.—	70.—
» 100—120 » »	1.—	9.—	80.—
» 150—200 » »	2.—	18.—	150.—
Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehr zierend. Blüht Mai.			
<i>crusgalli L.</i> Hahndorn Pyramiden 120—150 cm hoch	1.50	12.—	100.—
» 150—200 » »	2.—	18.—	150.—
Bis 8 m hoher, ostamerikanischer Strauch mit langen Dornen und glänzenden, verkehrt eilanzettlichen, nur gezähnten Blättern. Schöne Herbstfärbung.			
<i>fissa fructu luteo</i> Pyramiden 150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
Hochstämme 5—7 cm Umfang	4.—	35.—	—
Unter diesem Namen erhielt ich eine prächtig fruchtende Form mit sehr reichem, gelbem Fruchthehang. Blätter Sorbusähnlich, frischgrün, oberseits glänzend, unterseits matt hellgrün.			
<i>glandulosa Mönch.</i> Pyramiden 80—100 cm hoch	—90	8.—	70.—
» 100—120 » »	1.—	9.—	80.—
» 120—150 » »	1.50	12.—	100.—
» 150—200 » »	2.—	—	—
Ein sehr schöner Dorn, blüht in vielen, grossen, weissen Blütentrauben. Reichlich Früchte tragend, welche sehr zierend sind.			
<i>oxyacantha (monogyna) flore albo pleno Hort.</i>			
Pyramiden 150—180 cm hoch	2.—	18.—	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 5—7 cm	4.—	35.—	300.—
» » » 180—200 » » 5—7 »	5.—	45.—	—
Blumen weiss, gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitärs sehr geeignet. Etwa 4 m hoch.			
<i>flore puniceo (flore coccineo) Hort.</i>			
Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	—
» 150—180 » »	2.—	18.—	—
Blüten einfach, prächtig leuchtend dunkelrot, mit weisser Mitte.			
<i>flore puniceo pleno Hort.</i> Pyramiden 120—150 cm hoch	1.75	15.—	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 5—7 cm	4.—	35.—	—
» » » 180—200 » » 5—7 »	5.—	45.—	—
Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste Rotdorn.			
<i>flore roseo Hesse</i> Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	—
Blumen einfach, leuchtend rosa mit grosser, weisser Mitte. Beaubung glänzend dunkelgrün. Gegenstück zu der einfachblühenden, dunkelroten Form <i>flore puniceo</i> .			

Crataegus (Fortsetzung):*oxyacantha flore roseo pleno Hort.*

Pyramiden 120—150 cm hoch
 Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 5—7 cm
 » » » 180—200 » » 5—7 »
 Blüten gefällt rosa

» *stricta Hort. (fastigiata)*.. Pyramiden 120—150 cm hoch
 » 150—200 » »
 » 200—250 » »

Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel. Übervoll weiss blühend.

prunifolia Pers. Pyramiden 100—120 cm hoch
 » 120—150 » »
 » 150—200 » »

Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Früchte ziegelrot, sitzen bis zum Frühjahr.

Pyracantha Pers. (Pyracantha coccinea Roem.), Feuerdorn.
 mit Topfballen 40—60 cm hoch

Ausgebreiteter, sparrig verästelter, immergrüner Dornstrauch, der bis 2 m hoch wird. Blüten weiss, doldentraubig, Früchte schön leuchtend rot.

» *Lalandi (Pyracantha coccinea latifolia)*
 mit Topfballen 30—40 cm hoch
 » 40—60 » »
 » 60—80 » »

Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.

sanguinea Pall. Pyramiden 120—150 cm hoch
 Empfehlenswerter Dorn mit glänzend purpurnen Zweigen und leuchtend blutroten Früchten.

splendens Hort. Pyramiden 80—100 cm hoch
 » 100—120 » »
 » 120—150 » »
 » 150—200 » »

Mit schöner, dunkelgrün glänzender Belaubung.

Crinodendron Mol. (Eleocarpaceae).

dependens C. S. (Fricuspidaria dependens Ruiz & Pavon)

mit Topfballen

Kleiner, immergrüner Strauch von breitgehendem Wuchs mit meist ovaler, dicklicher Belaubung von glänzend tiefgrüner Färbung. Winterschutz.

Cydonia Tournefort Quitte (Rosaceae).

japonica Pers. (Chaenomeles japonica Lindl.)
 Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.

» *Abricot Hort.*
 Bildet einen niedrigen Busch. Zweige mit zahlreichen, halbgefüllten Blumen von wunderschöner, glänzend kupfriger Farbe dicht besetzt.

» *alba Hort.*
 Einfach weiss.

» *atrococcinea plena Hort.*
 Gefüllt, scharlach.

» *Aurora Hort.*
 Lachsrot.

» *Baltzii Hort.*
 Sehr gross, karmoisin bis dunkelrosa.

» *candicans Hort.*
 Reinweiss.

» *Columbia Hort.*
 Grosse, wohlriechende, grünlichgelbe Früchte.

» *eximia Hort.*
 Hellrot.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1.75	15.—	—
4.—	35.—	—
5.—	45.—	—
1.75	15.—	120.—
2.—	18.—	—
3.—	—	—
1.—	9.—	80.—
1.50	12.—	100.—
2.—	18.—	—
1.—	9.—	—
1.50	12.—	100.—
2.—	15.—	120.—
2.50	20.—	150.—
1.50	12.—	—
—80	7.—	60.—
1.—	9.—	80.—
1.50	12.—	100.—
2.—	18.—	150.—
2.—	—	—
—50	4.—	35.—
1.50	—	—
—80	7.50	—
—80	7.—	60.—
—80	7.—	60.—
1.50	—	—
1.50	12.—	—
1.50	—	—
—80	7.—	60.—

Cydonia (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
japonica Gaujardi Hort. Sträucher	—80	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	18.—	—
» » » » 140—160 »	2.50	20.—	—
Grossblumig, purpur.			
» Mallordi Hort.	—80	7.—	—
Hellrot.			
» Moerlosi Hort.	—80	7.—	60.—
Dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt.			
» nivalis Hort.	1.50	12.—	—
Grossblumig, reinweiss.			
» nivea extus coccinea Hort. Sträucher	—80	7.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	18.—	—
Niederliegende Form, fast weiss.			
» rubra grandiflora, Hort. Sträucher	—80	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.50	20.—	—
Sehr gross, karmoisinrot.			
» sanguinea plena, Hort.	—80	7.—	60.—
Gefüllt, blutrot.			
» Simoni Hort. Sträucher	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.50	20.—	—
Halbgefüllt, dunkelscharlachrot.			
» umbilicata Hort.	—80	7.—	60.—
Hellrosa.			
» versicolor lutescens Hort. Sträucher	—80	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	18.—	—
» » » » 140—160 »	2.50	20.—	—
Gelblichrot.			
lagenaria var. Wilsoni Rehd.	—80	7.—	60.—
Sehr stark, pyramidal wachsender Strauch aus China. Blumen gross, apfelblütig. Früchte $\frac{1}{4}$ kg schwer, 10 cm lang und ca. 8 cm Durchmesser.			
Maulei Moore, B. Sträucher	—80	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.50	—	—
Niedrigbleibend, zinnberrot.			
» alpina Hort.	1.50	—	—
Reichblühend, prächtig orange bis zinnberrot.			
» grandiflora perfecta O. Froeb.	1.50	—	—
Belaubung leuchtend dunkelgrün. Blumen sehr gross, leuchtend zinnberrot.			
Cytisus L. Gaisklee, siehe auch Laburnum. (Leguminosae.)			
austriacus L. Österreichischer Kopf-Gaisklee.....	—60	5.—	—
Goldgelbblühend. Aufrechter, fast 1 m hoher Strauch. Üppig wachsend, blüht im Sommer.			
capitatus Jacq.	—60	5.—	—
Blüht gelb, im Juni und Juli, an den Spitzen der jungen Triebe.			
hirsutus L.	—60	5.—	—
Blumen hellgelb, sich später bräunend, $\frac{1}{2}$ —1 m hoch.			
nigricans L. (C. racemosus elegans).....	—60	5.—	45.—
Blumen im Juni und Juli, dottergelb. Strauch bis 2 m hoch.			
purpureus Scop.	1.50	—	—
Bekannter Strauch, im Mai purpurrosaviolett blühend.			
ratisbonensis Schaeff (C. supinus).....	—60	5.—	—
Ein $\frac{1}{2}$ —1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.			
sempervirens Hort.	—60	5.—	—
Blüht in endständigen Köpfchen an diesjährigen Trieben. Blüte goldgelb. Belaubung und junges Holz dicht behaart.			
sessilifolius L.	—80	—	—
Blüten Ende Mai bis Mitte Juni, in 7—15 cm langen Trauben, hellgelb. Strauch aufrecht, bis $\frac{1}{2}$ m hoch, sonnige Lage.			

Dabeocia D. Don. Glanzheide (Ericaceae).

polifolia D. Don (Menziesia *polifolia Juss*).....
 Bis $\frac{1}{2}$ m hoher, graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte
 September bläulichrot.

» *alba*
 Weissblühend.

Davidia Baill. (Nyssaceae.)

involucrata Baillon..... mit Ballen

Dieser merkwürdige, aus Westchina eingeführte Baum ist von lockerem, pyramidalem Wuchs, wird bis 20 m hoch und erreicht einen Stammumfang von 2 m. Die hängenden Blumen werden an kurzen, seitlichen, stachelähnlichen Zweigen hervorgebracht und sind durch die grossen, schneeweissen Deckblätter besonders auffallend. Die grossen, glänzenden Blätter und Triebe an jungen Pflanzen sind dunkelrot gefärbt.

Decaisnea Franch. (Lardizabalaceae).

Fargesii Franch......

Schöner Strauch mit bis 60 cm langen, gefiederten Blättern. Fiederchen 12:7 cm gross. Zweige blaubereift. Blumen grünlich-gelb im Mai. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blaugefärbten, hängenden Früchte.

Decumaria L. Sternhortensie (Saxifragaceae).

barbara L...... mit Topfbällen

Wenig bekannter, niederliegender oder kletternder Strauch mit länglichen Blättern und wohlriechenden, im Juli erscheinenden weissen, bis 7 cm breiten, aus Scheindolden zusammengesetzten Rispen.

Desmodium Desv. Wandelklee (Leguminosae).

penduliflorum Oudem. (Lespedeza *Sieboldi Miq.*).....

Ein bis 2 m hoch werdender Strauch mit langen Zweigen. Blüht vom August bis zum Frost in zahlreichen, lockeren, langen, vielblütigen, purpurfarbenen Trauben.

Deutzia Thunberg. Deutzie (Saxifragaceae).

Bekannte, dankbare Blütensträucher von $\frac{1}{2}$ –2 m Höhe. Die weissen bis rosafarbenen, glockigen Blüten stehen in vielblumigen Rispen und erscheinen in grosser Anzahl von Mai bis Juli. Der Strauch wächst kräftig, aufrecht.

corymbiflora rosea.....
 Rosablühend.

crenata S. et Z......
 Einfach weiss- und rotblühend.

» *candidissima*.....
 Blüht rein weiss.

» *eburnea*.....
 Form von auffallender Reichblütigkeit. Die zierlichen Blütenrispen tragen eine grosse Anzahl grosser, einfacher, herrlich elfenbeinfarbiger Blüten mit goldgelben Staubfäden.

» *flore roseo pleno*.....
 Rosa gefüllt blühend.

» *Fortunei Voss*.....

» *macrosepala*.....
 Schön grosskelchig, weissblühend.

» *magnifica*.....
 Kräftigwachsende, neue Form. Die in gedrängten Trauben stehenden Blüten sind gefüllt und schön rein weiss.

» *Pride of Rochester*.....
 Weiss gefüllt. Grosse Rispe.

discolor elegantissima (D. *scabra* × *discolor purpurascens*)..

Bildet einen ziemlich hohen Strauch. Die langen, aufrechten dünnen Blütenzweige tragen in den Achseln doldenartige Blütenstände, die je 15–18 runde, gut geöffnete, 2 cm grosse, rosafarbige, karmin gerandete Blumen enthalten.

» *fasciculata*.....
 Blumen flachgeformt, rosaweiss, im Zentrum in kartrosa übergehend.

» *floribunda*.....
 Aufrechtwachsend. Blumen in dichten Rispen, rein weiss, weit geöffnet, Rückseite und Knospen kaum rosa. Juni–Juli.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

—70	6.—	50.—
-----	-----	------

—70	6.—	50.—
-----	-----	------

7.50	—	—
------	---	---

—70	6.—	50.—
-----	-----	------

3.—	—	—
-----	---	---

1.50	12.—	—
------	------	---

1.—	—	—
-----	---	---

—50	4.—	35.—
-----	-----	------

—50	4.—	35.—
-----	-----	------

—60	5.—	45.—
-----	-----	------

—50	4.—	35.—
-----	-----	------

—50	4.—	35.—
-----	-----	------

—60	5.—	45.—
-----	-----	------

—50	4.—	35.—
-----	-----	------

1.—	—	—
-----	---	---

—80	7.—	—
-----	-----	---

—80	7.—	—
-----	-----	---

Deutzia (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
discolor grandiflora	—80	7.—	60.—
Aufrechtwachsend. Blumen schön geöffnet mit breiten, zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa gefärbt, Rückseite und Knospen rosa. Blüht im Juli.			
» lactea	—80	—	—
Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milchweiss mit goldgelben Antheren.			
» major Veitch	—80	—	—
Aus China stammender, winterharter Strauch, einen kompakten Busch bildend. Blumen 1½—2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.			
glomeruliflora Franch.	1.—	—	—
Mit an den Zweigenden der Seitentriebe gehäuft, dichten, kleinblütigen Blütenständen.			
gracilis S. et Z.	—50	4.—	35.—
½ m hoch werdend, weissblühend. Bekannte Treibsorte.			
» campanulata Hort. Lem.	—70	6.—	50.—
Die grossen, glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.			
» carminea Hort. Lem.	—80	—	—
Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.			
» eximia Hort. Lem.	—70	6.—	—
Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen.			
» fastuosa (D. gracilis × Sieboldianum)	—80	—	—
Blüht in aufrechten Sträussen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durchmesser halten.			
» medio-picta Hort.	—80	—	—
Bunte Belaubung.			
» multiflora	—80	—	—
Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzählbaren, weissen Blumen bedeckt.			
» rosea Hort. Lem.	—70	6.—	—
Rosablühende Form von <i>D. gracilis</i> .			
» venusta Hort. Lem.	—80	—	—
Weisse Miniatur-Azalee, interessante, wertvolle Form.			
hybrida Watereri Veitch.	—50	4.—	35.—
Blumen sehr gross, reinweiss.			
» Welsi Veitch.	—50	4.—	35.—
Reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend.			
Lemoinei Lem.	—60	5.—	40.—
Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vorpflanzungen in Gärten und Parks. Im Mai blühend.			
» Boule rose (D. Lemoinei × discolor)	1.—	—	—
Blüten aufrecht, gut geöffnet, 20—25 in einer Dolde vereinigt, rosa weiss. Mai—Juni.			
» compacta Lem.	—80	7.—	—
Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich, reinweiss, Mai.			
» multiflora Hort. Lem. (Boule de neige)	1.—	—	—
Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.			
parviflora Bnge	—60	5.—	—
Reichblühender Strauch von aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung. Blumen weiss, im Juni.			
scabra Thunb	—80	7.—	—
Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten zahlreich, weiss, im Juni.			
Schneiderana Rhd. mit Topfballen	2.—	—	—
staminea Brown	—50	4.—	35.—
Blumen rosenschwarz und weiss.			
Vilmoriniana Lem.	—80	7.—	—
Strauch bis 1,25 m hoch. Blumenrispen mit bis 25 weissen, mehr als 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen.			

Deutzien in besten Sorten meiner Wahl.

100 St. M. 35.—, 1000 St. M. 300.—.

Diervillea, Tournefort (Jussieu). Weigeliae (Caprifoliaceae).

	pro Stück M. Pl.	pro 10 Stück M. Pl.	pro 100 Stück M. Pl.
amabilis Carr.	— .70	6.—	50.—
Blumen hellrosa.			
» alba	— .80	7.—	—
Mit weissen, leicht rosa gefärbten Blumen.			
biformis	— .70	6.—	50.—
Grosse, hell- und dunkelrosa Blüten.			
Chamaeléon	— .70	6.—	50.—
Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.			
Eduard André	— .80	7.—	—
Dunkelrot blühend.			
Eva Rathke	— .90	8.—	—
Prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühend.			
grandiflora Vanhouttei Hort.	— .70	6.—	50.—
Blumen rosa mit Weiss bordiert.			
Groenewegeni	— .70	6.—	50.—
Rosenrot mit gelbem Schlund.			
Hendersoni	— .80	7.—	—
Dunkelblutrot.			
hortensis Conquête	1.—	—	—
Enorm grosse, dunkelrosa Blumen.			
» giganteaeiflora	— .80	7.—	—
Durchscheinend mattrosa.			
Hybriden, ohne Namen	— .60	5.—	45.—
intermedia Zab.	— .70	6.—	50.—
Rosa und weisse Blumen.			
» Desboisii Hort.	— .70	6.—	50.—
» Isoline Hort.	— .70	6.—	50.—
Hellrosenrot.			
» Stelzneri Hort.	— .70	6.—	50.—
Rosa gefärbte Blumen.			
Lowi	— .70	6.—	50.—
Blumen dunkelpurpurrot.			
Mad. Couturier	— .70	6.—	50.—
Lebhaft rosa und weisse Blumen.			
» Lemoine	— .70	6.—	50.—
Hell- und dunkelrosa, reichblühend.			
» Tailler	— .70	6.—	50.—
Weisse und blassrosa Blumen.			
praecox Bouquet rose Lem.	1.—	—	—
Seidigrosa mit hellgelbem Schlund im Mai.			
» Gracieux	1.—	—	—
Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig.			
Président Duchartre	— .80	7.—	—
Dunkelpurpur.			
splendens Carr. (D. lutea)	— .80	7.—	—
Treibt mit glänzend gelben Blättern aus. Herbstfärbung wunder- schön metallisch kupferrot.			
styriaca Klenert	— .80	7.—	—
Reichblühend, leuchtend hellrot; starkwachsend.			
venosa	— .70	6.—	50.—
Schmalblättrig, rosa blühend.			
Verschaffelti	— .70	6.—	—
Purpurrosa mit weissen Borden.			

100 Diervilla in Sorten nach meiner Wahl

M. 50.—.

Dimorphantus, siehe Aralia.**Diospyros Linné, Dattelpflaume (Ebenaceae).**

virginiana L.	60–80 cm hoch	1.50	—	—
Harte, nordamerikanische Sorte. Blüten grünlich gelb. Frucht gelbrot, etwa 2,5 cm Durchmesser.				

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Dipelta Maxim. Doppelschild (Caprifoliaceae).			
floribunda Max. mit Topfballen	2.50	—	—
Ein schöner, an <i>Diervillea</i> erinnernder Blütenstrauch mit sehr zahlreich in kleinen Büscheln entlang den Zweigen erscheinenden, weissen und lilafarbenen überlaufenden Blüten von trichterförmiger Form. Die eilänglichen, zugespitzten Blätter sind 5–10 cm lang, ganzrandig und fast kahl.			
Drimys Forst. (Magnoliaceae.)			
aromatica F. Mueller 60–80 cm hoch mit Topfballen	2.50	24.—	—
Immergrüner Strauch mit rötlichen Zweigen, einfachen, ganzrandigen, mehr oder weniger kurz zugespitzten, aromatischen, oberseits sattgrünen, unterseits blaugrauen Blättern.			
Ehretia L. (Borraginaceae.)			
macrophylla Wall. mit Topfballen	2.50	—	—
Starkwachsener Baum mit grossen, hellgrünen Blättern und weissen Blüten.			
Elaeagnus L. Ölweide (Elaeagnaceae.)			
argentea Pursh. 1.—	1.—	—	—
Schöner Strauch mit goldig bronzierten Zweigen und silberigem Laub.			
macrophylla Thunb. mit Topfballen	2.—	—	—
Immergrüner Strauch mit grossen, oberseits graugrünen, unterseits weissen Blättern, liebt warme, geschützte Lage.			
pungens maculata aurea Hort. mit Topfballen	2.50	—	—
Immergrüner Strauch mit goldbunten Blättern.			
» Simoni Carr mit Topfballen	2.50	—	—
Eine schöne Form mit langen, schmalen, glänzend hellgrünen Blättern, oberseits weiss bestäubt, unterseits silberig mit gelben Punkten, immergrün.			
» Simoni tricolor Hort. mit Topfballen	2.50	—	—
Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelbem Fleck.			
reflexa Morr. u. Decsne mit Topfballen	2.50	—	—
Immergrüne Art mit etwas grösseren Blättern als „Simoni“, die jedoch oberseits dunkelgrün, unterseits silberweiss gefärbt sind.			
umbellata Thunberg. Doldenblütige Ölweide 1.—	1.—	—	—
Mehrere Meter hoch werdender Strauch mit silberfarbenen beschuppten, jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silberfarben.			
Eleutherococcus Maxim. Stachelstrauch (Araliaceae)			
Simoni Decne 1.—	1.—	—	—
Strauch aufrecht, Zweige kahl, glatt, rotbraun, schwach bereift, mit hellbraunen, abwärtsgerichteten Stacheln besetzt. Die Blätter sind fünf-, manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, dunkelgrün.			
Empetrum L. Rauschbeere (Empetraceae.)			
nigrum L. Schwarze Rauschbeere 1.—	1.—	—	—
Etwa 25 cm hoher Strauch mit immergrüner Belaubung. Blättchen etwa 5 mm lang, grün.			
scoticum Hook (E. nigrum scoticum) —.80	—.80	7.—	60.—
Sehr zierliches Gewächs, von viel feinerem Aussehen als <i>nigrum</i> , mit sehr kleiner, sattgrüner Belaubung.			
Ericilla Jussieu (Phytolaccaceae.)			
volubilis A. Jussieu (<i>Bridgesia spicata Hooker</i>) 2.50	2.50	—	—
Schlingender Halbstrauch mit abwechselnden, einfachen, lederigen Blättern, Blüten klein, weislich, ährig; Früchte beerenartig. Winterschutz.			
Erica L. Heide, siehe auch unter <i>Calluna</i> (Ericaceae), B.			
Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende, kleine Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen, humusreichen Heide- oder sandigen Moorboden. Gedeihen in sonniger bis halbschattiger Lage. Schöne Felsenpflanzen.			
Besonders starke, kräftige Ballenpflanzen.			
carnea , siehe <i>E. herbacea</i> .			
ciliaris L. —.75	—.75	6.—	—
Graubehaariges Laub. Bringt vom Juni bis Herbst grosse, schöne, purpurrothe Blüten.			

Erica (Fortsetzung):

cinerea alba Hort. Form mit weissen, nickenden Blüten, in quirligen Trauben.

» *atropurpurea Hort.* Dunkelrot.

» *coccinea Hort.* Scharlachrot.

herbacea Auct. (E. carnea L.) Ein 20—30 cm hoher Strauch. Blüten im April und Mai an den Endspitzen und in den Blattachseln, lebhaft rosenrot.

» *alba Hort.* Form mit weissen Blüten.

Mackayana Babingt Blüht von Juni bis August in rosenroten Dolden bis traubenähnlichen Büscheln. Hübscher Bastard.

Tetralix alba Ait. Ein 25—50 cm hoch werdender Strauch. Wächst an feuchten bis sumpfigen Stellen. Blüten weiss, von Juni bis August, auf kurzen, nickenden Stielchen in doldenartigen Büscheln.

» *intermedia Hort.* Hellrot.

» *rubra Bedf.* Dunkelrot.

vagans alba Hort. Strauch mit weisslichgrauen Ästen. Blüht von Juli bis September in von unten her aufblühenden 15 cm langen, ährenartigen Trauben; Blumenkrone eiglockenförmig, weiss.

» *carnea Hort.* Fleischfarbig.

» *rubra Hort.* Dunkelrot.

Escallonia L. Escallonie (Saxifragaceae).

Lieben sämtlich Winterschutz.

langleyensis Veitch. (E. Philippiana × macrantha) mit Topfballen

Die langen, dünnen Zweige bedecken sich mit zahlreichen, karminroten, glockenförmigen Blumen.

macrantha Hooker & Arnott. Grossblütige Escallonie. mit Topfballen

Blüht im Juli bis August lebhaft rot.

rubra Pers. mit Topfballen

Strauch mit abwechselnden, immergrünen, lederartigen Blättern. Blüht in endständigen Trauben oder Rispen im August.

Eueryphia Cav. (Eueryphiaceae)

pinnatifida Gay. mit Topfballen

Immergrüner Strauch mit schön gefiederten, grünen Blättern und grossen, einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen, zierenden Staubgefässen.

Euptelea Sieb. et Zucc.

polyandra Sieb. et Zucc. mit Topfballen

Ein noch neuerer, schöner Strauch, mit grossen, rundlichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtig metallisch glänzenden Blättern.

Evonymus L. Spindelbaum (Celastraceae).

alata triflora Franch. & Sav. Eine Form, bei der die Korkflügel teilweise ganz fehlen oder nur wenig in Erscheinung treten.

americana angustifolia Wood. Wuchs ziemlich stark, aufrecht. Blatt eilanzettlich, schwach gekerbt, bis 8:3,2 mm, dunkelgrün, von Anfang September an prächtige, schwärzlichrothbraune Färbung mit violettem Schein.

» *angustifolia purpurea Pursh.* Mit schmalen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkelpurpurfarbenen Blättern. Herbstfarbe prächtig dunkelrotbraun mit violettem Schein.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—75	6.—	—
—75	6.—	—
—75	6.—	—
—75	6.—	50.—
—80	—	—
—75	6.—	50.—
—75	6.—	—
—75	6.—	50.—
—80	—	—
—75	6.—	50.—
—75	6.—	—
1.50	12.—	—
1.50	12.—	100.—
1.50	12.—	100.—
2.50	—	—
2.—	—	—
1.50	—	—
1.50	—	—
1.50	—	—

Evonymus (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
atropurpurea Jacquin. Purpurbblütiger Spindelbaum	1.50	—	—
Sehr seltener, mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkelpurpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlachkarminrot. Erwächst bis zu einem kleinen Baume.			
Bungeana Maxim.	1.50	—	—
Mittelhoher Strauch. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennigrotem Mantel.			
europaea L. Gemeiner Spindelbaum (Pfaffenhütchen)	— .60	5.—	45.—
Mittelhoher bis baumartiger Strauch mit korkig gefügten, grünen Ästen. Samenkapsel rosa bis karminrot, Samenmantel orangegeb.			
» argenteo-variegata Hort.	1.50	—	—
Blattfärbung dunkelgrün mit weissen Flecken. Herbstfarbe prachtvoll rotbraun, von der sich die elfenbeinweissen Flecken wunderschön abheben.			
» pubescens Hort.	1.50	—	—
Grosse, gewellte Blätter.			
Hamiltoniana Wallich	1.50	—	—
Mittelhoher, buschiger Strauch. Blüten mit lebhaft roten Staubbeuteln. Blätter lederartig, bis 12 cm lang und 3 cm breit. Kapsel gelblich bis fleischrot. Samenmantel mennigrot.			
» semi persistens Rehd.	1.50	—	—
Sehr zierlicher, halbbimmergrüner Strauch mit schöner, hellgrüner Belaubung. Blumen sehr zahlreich von grüner Farbe mit lebhaft roten Staubbeuteln.			
lanceifolia Loesener.	1.50	—	—
Starkwachsende, chinesische Art mit lanzettlichen, gelblichgrünen Blättern. Den weissen Blüten folgen orangerote Früchte.			
latifolia planipes Koch.	1.50	—	—
Unterscheidet sich von der Art durch die spitzeren und grob gesägten Blätter.			
nana Koopmanni Dipp.	1.50	—	—
Wuchs straff aufrecht. Blätter grösser als die der Stammart, bis 80:8 mm gross, dunkelgrün, im Herbst prächtig leuchtend rotbraun.			
oxyphylla Miq.	1.50	—	—
Kahler Strauch bis Baum. Zweige vierseitig, jung grünlich, ältere bräunend. Blätter oval, bis 9 cm lang und 5 cm breit, kerzbähnig, oberseits hellgrün, unterseits blässer. Frucht dunkelrot mit gelbem Mantel.			
pauciflora Maxim.	1.50	—	—
Ein 2 m hoher Strauch mit leichter, dunkelwarziger Borke. Blatt dunkelgrün, bis 6:3 cm gross. Blüte braunrot, Mai—Juni.			
radicans Hort.	— .50	4.—	—
Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen Blättern. Einfassungspflanze, sehr hart.			
» vegeta Rehder	1.50	—	—
mit Topfballen			
Höhe bis zur Krone 60— 80 cm			
» » » » 80—100 »			
Harte, fast rundblättrige, glänzend dunkelgrüne Form, für Felspartien besonders geeignet.			
rotundifolia	— .70	6 —	—
sanguinea Loes.	1.50	—	—
Gut verzweigter, baumartiger Strauch mit dunkelgrüner, zugespitzt-ovaler und feingesägter Belaubung von 5—7 cm Länge; nimmt eine prachtvoll tiefscharlachrote Herbstfärbung an. Fruchtkapsel rot, Samenmantel gelb.			
yedoënsis Koehne	— .70	6.—	—
Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross. Frucht karminrosa.			

Exochorda Lindley. Scheinfelsenbirne (Rosaceae).

Prachtvolle Ziersträucher, die mit weissen Blütenrispen von Ende April bis Ende Mai geradezu überschüttet sind. Die schön belaubten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2—3 m, sind vollständig hart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. Lieben sonnige Lage.

Exochorda (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Alberti Regel	2.—	18.—	—
Aus Asien. Wuchs mehr aufrecht als der der alten <i>E. grandiflora</i> , Belaubung weit schöner, auch blüht sie früher als <i>E. grandiflora</i> . Blüte kleiner, Blüthenrauben aufrecht. Belaubung blaugrün.			
Giraldi Hesse	2.—	18.—	—
Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden, endständigen, sechs- bis acht- blütigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser; Blumenblätter, teils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend.			
grandiflora Lindl.	2.—	18.—	—
Bekannte Art mit unzähligen, grossen, weissen Blüthenrauben.			
Fagus Linné. Rotbuche, Buche. (Fagaceae.)			
orientalis LipskyPyramiden 100—120 cm hoch	8.—	—	—
» 120—150 » »	10.—	—	—
Diese Art weicht von <i>F. sylvatica</i> ab durch ganz andere Blattform, schmalere Kronenbildung und pyramidal aufstrebenden Wuchs.			
Sieboldi Endl.Pyramiden 80—100 cm hoch	5.—	—	—
Japanische Art. Blätter lang zugespitzt mit stark hervortretenden Blattnerven.			
sylvatica argenteo-marginata Hort.			
Pyramiden 60—80 cm hoch	4.—	—	—
» 80—100 » »	5.—	—	—
Form der gewöhnlichen Rotbuche mit weissgerandeten Blättern.			
» asplenifolia Lodd.Pyramiden 100—120 cm hoch	6.—	—	—
Mit sehr feinen, tiefgeschlitzten Blättern.			
» cristata Hort.Pyramiden 80—100 cm hoch	5.—	—	—
Mit dicht büschelweis beisammensitzenden, eigentümlich ge- krümmten Blättern.			
» Dawyckii HessePyramiden 100—120 cm hoch	6.—	50.—	—
» 120—150 » »	8.—	70.—	—
» 150—180 » »	10.—	90.—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm, Umfang 6—8 cm	10.—	—	—
» » » » 120—140 » » 6—8 »	12.—	—	—
Prächtige Säulenform der Rotbuche. Der Wuchs ist pyramidal säulenförmig, straff aufrecht. Das Laub ist gross, schön glänzend dunkelgrün und von fester Beschaffenheit. Eine gute Form, die mit der Pyramidenreihe in erfolgreichen Wettbewerb tritt.			
» grandidentata Hort.Pyramiden 100—120 cm hoch	6.—	—	—
» 120—150 » »	8.—	—	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm, Umfang 6—8 cm	10.—	—	—
Mit grossen, eckigen, ausgeschnittenen Zähnen.			
» heterophylla Lodd.Pyramiden 100—120 cm hoch	6.—	—	—
Eine niedrigbleibende Form mit mehr oder weniger tiefe- geschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen Blättern.			
» purpurea major Hort. Bluthuche			
Pyramiden 100—120 cm hoch	6.—	50.—	—
» 120—150 » »	8.—	70.—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	38.—	—
» » » » 80—100 » » 6—8 »	5.—	48.—	—
» » » » 100—120 » » 6—8 »	6.—	—	—
» » » » 120—140 » » 6—8 »	8.—	—	—
» » » » 140—160 » » 6—8 »	10.—	—	—
» » » » 160—180 » » 6—8 »	15.—	—	—
» » » » 180—200 » » 6—8 »	20.—	—	—
Bekannte Bluthuche mit grossen, tiefdunkel- bis schwarzrot ge- färbten Blättern.			
» purpurea roseo-marginata Hort.			
Pyramiden 80—100 cm hoch	6.—	—	—
» 100—120 » »	8.—	—	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm, Umfang 6—8 cm	8.—	—	—
» » » » 100—120 » » 6—8 »	10.—	—	—
» » » » 120—140 » » 6—8 »	12.—	—	—
» » » » 160—180 » » 6—8 »	15.—	—	—
Die dunkelroten Blätter sind leuchtend rosa gerandet.			

Fagus (Fortsetzung):

sylvatica quercifolia Hort. Pyramiden 60—80 cm hoch
 » 80—100 » »

Mit eichenähnlichem Blatt.

» *Rohani V. Mašek* Pyramiden 80—100 cm hoch
 Höhe bis zur Krone 60—80 cm, Umfang 6—8 cm
 » » » » 100—120 » » 6—8 »
 » » » » 120—140 » » 6—8 »

Die Blattform ist ganz die der *F. sylv. quercifolia*; die Färbung der Blätter ist im Frühjahr prächtig dunkelrot und geht im Herbst wie bei der gewöhnlichen Blutbuche in braungrün über.

» *Zlatia C. S.* Serbische Goldbuche.

Pyramiden 80—100 cm hoch
 » 120—150 » »
 Höhe bis zur Krone 80—100 cm, Umfang 6—8 cm
 » » » » 100—120 » » 6—8 »
 » » » » 160—180 » » 6—8 »

Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.

Fontanesia *La Bill.* Fontanesie (Oleaceae).

Fortunei Carr. 1.— — —
 Harter, bis 3 m hoher, dichtbuschiger Strauch. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 10 cm lang und 2 cm breit. Blüht in lockeren, traubenartigen Blütenständen, weiss, rosa angehaucht. Juni—Juli.

phillyreoides La Bill. 1.— — —
 Ein ähnlicher Strauch, nur 1½ m hoch. Blüht in vielblütigen, büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe, Juni. Liebt warmen, durchlässigen Boden.

Forestiera *Poiret.* Forestiera (Oleaceae).

acuminata Poiret. Zugespitzte Forestiera mit Topfballen
 Wenig verbreiteter, bis 3 m hoher, langsam wachsender Strauch mit lanzettlichen, 4—8 cm langen und 1½—3 cm breiten, dunkelgrünen Blättern.

neomexicana A. Gray 2.— — —
 Bildet einen kleinen, starren, sparrigen, etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.

Forsythia *Vahl.* Forsythie (Oleaceae). **B.**

intermedia Zabel Sträucher —.80 7.— 60.—
 Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone 1.50 — —
 Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.

» *densiflora Koehne* —.80 7.— —
 Grosse, hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt.

» *vitellina Koehne* Sträucher —.80 7.— 60.—
 Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone 2.— — —
 Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb.

suspensa Vahl 1.— — —
 Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen, Blumen trichterig glockig, hellgelb.

» *Fortunei Rehd.* 1.— 9.— —
 Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler gelb.

» *Fortunei atrocaulis Rehder* 1.— — —
 Unterscheidet sich von der vorhergehenden sofort durch die schwarzroten, jungen Triebe und durch schmalere, rotaustreibende Belaubung.

» *Sieboldi Zabel* 1.— — —
 Von hängendem Wuchs, ähnlich *F. suspensa*, Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb gestreift.

viridissima Lindley —.80 — —
 Aufrechtwachsender, buschiger, bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<i>sylvatica quercifolia</i> Hort. Pyramiden 60—80 cm hoch	5.—	—	—
» 80—100 » »	6.—	—	—
Mit eichenähnlichem Blatt.			
» <i>Rohani V. Mašek</i> Pyramiden 80—100 cm hoch	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, Umfang 6—8 cm	5.—	—	—
» » » » 100—120 » » 6—8 »	6.—	—	—
» » » » 120—140 » » 6—8 »	8.—	—	—
Die Blattform ist ganz die der <i>F. sylv. quercifolia</i> ; die Färbung der Blätter ist im Frühjahr prächtig dunkelrot und geht im Herbst wie bei der gewöhnlichen Blutbuche in braungrün über.			
» <i>Zlatia C. S.</i> Serbische Goldbuche.			
Pyramiden 80—100 cm hoch	5.—	—	—
» 120—150 » »	8.—	—	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm, Umfang 6—8 cm	8.—	—	—
» » » » 100—120 » » 6—8 »	10.—	—	—
» » » » 160—180 » » 6—8 »	15.—	—	—
Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.			
Fontanesia <i>La Bill.</i> Fontanesie (Oleaceae).			
<i>Fortunei Carr.</i> 1.— — —			
Harter, bis 3 m hoher, dichtbuschiger Strauch. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 10 cm lang und 2 cm breit. Blüht in lockeren, traubenartigen Blütenständen, weiss, rosa angehaucht. Juni—Juli.			
<i>phillyreoides La Bill.</i> 1.— — —			
Ein ähnlicher Strauch, nur 1½ m hoch. Blüht in vielblütigen, büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe, Juni. Liebt warmen, durchlässigen Boden.			
Forestiera <i>Poiret.</i> Forestiera (Oleaceae).			
<i>acuminata Poiret.</i> Zugespitzte Forestiera mit Topfballen 2.— — —			
Wenig verbreiteter, bis 3 m hoher, langsam wachsender Strauch mit lanzettlichen, 4—8 cm langen und 1½—3 cm breiten, dunkelgrünen Blättern.			
<i>neomexicana A. Gray</i> 2.— — —			
Bildet einen kleinen, starren, sparrigen, etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.			
Forsythia <i>Vahl.</i> Forsythie (Oleaceae). B.			
<i>intermedia Zabel</i> Sträucher —.80 7.— 60.—			
Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone 1.50 — —			
Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.			
» <i>densiflora Koehne</i> —.80 7.— —			
Grosse, hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt.			
» <i>vitellina Koehne</i> Sträucher —.80 7.— 60.—			
Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone 2.— — —			
Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb.			
<i>suspensa Vahl</i> 1.— — —			
Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen, Blumen trichterig glockig, hellgelb.			
» <i>Fortunei Rehd.</i> 1.— 9.— —			
Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler gelb.			
» <i>Fortunei atrocaulis Rehder</i> 1.— — —			
Unterscheidet sich von der vorhergehenden sofort durch die schwarzroten, jungen Triebe und durch schmalere, rotaustreibende Belaubung.			
» <i>Sieboldi Zabel</i> 1.— — —			
Von hängendem Wuchs, ähnlich <i>F. suspensa</i> , Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb gestreift.			
<i>viridissima Lindley</i> —.80 — —			
Aufrechtwachsender, buschiger, bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb.			

Fraxinus L. Esche (Oleaceae).

americana L. (F. *alba Marsh.*) Weissesche 150—200 cm hoch
Schöner, hoher Baum mit grauweissen Ästen und grossen, oberseits freudig grünen, unterseits weissgrünen Blättern.

excelsior L. Gemeine Esche. Heister 150—200 cm hoch
» 200—250 » »
Hochstämme 6— 8 cm Umfang
» 8—10 » »

Einheimischer Baum, der gegen 40 m Höhe erreicht.

» *aurea Pers.* Goldesche. ... Pyramiden 100—120 cm hoch
Höhe bis zur Krone 140—160 cm, Umfang 10—12 cm
» » » 180—200 » » 12—14 »
Mit goldgelbem, besonders im Winter zierendem Holze.

» *concafolia variegata Hort.*

Pyramiden 120—150 cm hoch
Schöne, grossblättrige, weissbunte Belaubung.

» *globosa Hort.* Kugelesche.

Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 8—10 cm
» » » 140—160 » » 8—10 »
» » » 180—200 » » 8—10 »
» » » 200—220 » » 8—10 »
» » » 180—200 » » 10—12 »

Schöner Allee- und Kugelbaum, bei beschränktem Raum.

» *heterophylla Hort.* Pyramiden 150—200 cm hoch
Verschiedenblättrige Esche.

longicuspis Sieb u. Zucc. Pyramiden 100—120 cm hoch
Kleiner Baum oder Strauch. Die bis 30 cm langen Blätter sind langgestielt. Blüten im Mai und Juni in end- und seitenständigen Rispen, alabasterweiss.

mandschurica Rpr. Pyramiden 150—200 cm hoch
Erwächst zu einem hohen Baume mit bis 50 cm langen Blättern, die oberseits tiefgrün, unterseits hellgrün sind.

oregona Nutt. Pyramiden 200—250 cm hoch
Hoher, hübsch belaubter Baum des westlichen Nordamerikas.

» *pulverulenta Dieck* Pyramiden 120—150 cm hoch
Schöne, weissbestäubte Form der vorigen.

Ornus L. Gemeine Blumenesche. 150—180 cm hoch
Blüht in grossen, weissen Rispen im Mai und Anfang Juni. Laub hat schöne Herbstfärbung. Liebt warme, trockene Lage.

potamophila Herder. Pyramiden 120—150 cm hoch
Ein kleiner, höchstens 10 m hoher Baum mit etwa 30 cm langen, graugrünen Blättern. Ziemlich unbekannte Art.

sambucifolia Lam. (F. *nigra March.*)

Pyramiden 120—150 cm hoch
Bis 30 m hoher Baum. Blatt sehr groß, tiefgrün.

Washingtoni Hort. Pyramiden 150—200 cm hoch
Kräftigwachsender, hoher Baum mit ausgebreiteter Krone und schöner, grosser, dunkelgrüner Belaubung.

Fuchsia Linné. Fuchsia (Onagraceae).

Die nachfolgend aufgeführten, winterharten Fuchsien halten im Freien aus, wenn sie Anfang des Winters am Boden abgeschnitten und mit Laub gedeckt werden.

corallina Hort. mit Topfballen
Sehr blühbare Sorte, mit grossen, karmesinroten Blumen.

Riccartoniana Hort. mit Topfballen
Bringt unaufhörlich schöne, scharlachrote Blumen.

Garrya Douglas. Garrya (Cornaceae).

Fadyenii Hooker mit Topfballen
Blätter immergrün, ledrig, oberseits stark glänzend, unterseits graufilzig, Blütenstand kätzchenartig hängend, achselständig, oft verzweigt. Frucht beerenartig.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<i>americana L.</i> (F. <i>alba Marsh.</i>) Weissesche 150—200 cm hoch	1.50	12.—	100.—
» 200—250 » »	1.25	10.—	80.—
Hochstämme 6— 8 cm Umfang	2.—	18.—	160.—
» 8—10 » »	3.—	28.—	250.—
» <i>aurea Pers.</i> Goldesche. ... Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm, Umfang 10—12 cm	3.—	28.—	—
» » » 180—200 » » 12—14 »	5.—	—	—
» <i>concafolia variegata Hort.</i>	1.75	15.—	—
» <i>globosa Hort.</i> Kugelesche.	3.—	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 8—10 cm	5.—	—	—
» » » 140—160 » » 8—10 »	6.—	55.—	—
» » » 180—200 » » 8—10 »	7.—	—	—
» » » 200—220 » » 8—10 »	7.—	—	—
» » » 180—200 » » 10—12 »	2.50	24.—	—
» <i>heterophylla Hort.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
» <i>longicuspis Sieb u. Zucc.</i> Pyramiden 100—120 cm hoch	1.75	15.—	—
» <i>oregona Nutt.</i> Pyramiden 200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
» <i>pulverulenta Dieck</i> Pyramiden 120—150 cm hoch	1.50	12.—	—
» <i>potamophila Herder.</i> Pyramiden 120—150 cm hoch	2.—	18.—	—
» <i>sambucifolia Lam.</i> (F. <i>nigra March.</i>)	1.50	12.—	—
» <i>Washingtoni Hort.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
Fuchsia Linné. Fuchsia (Onagraceae).	1.25	10.—	—
<i>corallina Hort.</i> mit Topfballen	1.25	10.—	—
<i>Riccartoniana Hort.</i> mit Topfballen	3.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Gaultheria L. Scheinbeere (Ericaceae).			
Shallon Pursh. Grosse Scheinbeere	2.—	18.—	—
G. procumbens ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig, bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudig grün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz.			
» acutifolia Hort.	2.—	18.—	—
Der vorigen ähnlich, mit mehr länglich zugespitzten Blättern.			
Genista L. Ginster (Leguminosae).			
Anspruchslose Gehölze, deren meist gelber, sehr reichlicher Blütenfior in das Frühjahr fällt. Die gewöhnlich nicht sehr hohen Sträucher lieben sonnige Lage und einen leichten, bis trocknen Boden.			
alba dura Simon Louis	1.50	—	—
Zierlicher, ganz harter Strauch mit reinweissen Blumen.			
praecox Hort (Cytisus praecox)	1.20	10.—	—
Bildet 2 m hohe Sträucher mit überhängenden, grünen Zweigen und beginnt ca. Mitte April überreich ihre lichtgelben, duftenden Blumen zu entfalten.			
» alba Hort.	1.20	10.—	—
Ein hübscher Gartenbastard mit weissen Blumen. Sehr früh blühend.			
radiata Scop	2.50	—	—
mit Topfballen Kleiner, sparrig verzweigter, fast kugeligcr Strauch. Blüht in 6—8blütigen Köpfchen am diesjährigen Holze. Ein prächtig dankbar blühendes Gewächs von zierlicher Erscheinung.			
sagittalis L.	2.50	20.—	—
mit Topfballen Die eigentümlich pfeilförmigen Blätter und Zweige sind fast miteinander verwachsen. Sie überdecken sich im Frühling über und über mit goldigen Blumen.			
scoparia Wall, B.	—50	4.—	—
Bekannter, einheimischer Ginster mit überreichem Fior goldgelber Blüten im Frühjahr.			
» Andreana Dippel	1.50	—	—
Schöne, reichblühende Form mit goldgelb und glühend purpur gefärbten Blüten; liebt wie folgende geschützte Lage.			
» Butterfly Hort.	1.50	12.—	—
Flügel der Blume an der Basis und in der Mitte lebhaft gelb. Blütezeit Mai.			
» Daisy Hill Hort	1.50	12.—	—
Flügel und Fahne weisslichgelb mit karminroter Tönung; Schiffchen schwefelgelb.			
» Firefly Hort.	1.50	12.—	—
Blumen granatrot, gelb gerandet. Fahne mit schwach granatrot verwaschen. Kelch purpur. Blütezeit Mai.			
» Maifly Hort.	1.50	12.—	—
Flügel der Blumen mit Granatrot verwaschen. Mai blühend.			
» pallida Hort.	—80	7.—	60.—
Schöne Form mit blassgelben Blumen.			
» stricta Hort.	—80	7.—	—
Aufrechtwachsende Form, sonst wie die Art.			
tinctoria flore pleno Hort.	1.50	14.—	—
Hübscher, niedrig bleibender Strauch mit vielen, grossen, goldgelben, gefüllten Blumen. Langandauernder Fior.			
Gleditschia L. Gleditschie (Leguminosae).			
texana Sarg.	2.—	—	—
mit Topfballen Mit sehr feiner, schön leuchtend grüner Belaubung.			
triacanthos L. Christudorn	—60	5.—	40.—
Sträucher Hoher Baum mit lichter, breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen.			
Glycine , siehe Wistaria unter Schlingpflanzen.			
Halimodendron Fisch. Salzstrauch (Leguminosae).			
argenteum Fisch.	1.50	12.—	—
Veredelungen 40—60 cm Kronenbäumchen 120—140 cm Stammhöhe			
Sehr schöner Strauch mit graugrüner, gefiederter Belaubung und hellvioletten Blüten im Juni—Juli.			
	2.50	20.—	—

Hamamelis L. Zaubernuss (Hamamelidaceae).

Die mit jedem Boden vorliebnehmenden, harten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von mehreren Metern. Sie sind schön belaubt und entwickeln im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter, einen überreichen Flor bizarr geformter, gold- und braungelb gefärbter Blüten.

japonica S. u. Z. (H. arborea Mast.)..... 4.— 38.—

Mit grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurzgestielt, den Strauch vollständig überdeckend.

» **rubra Hort.**..... 5.— —

Schöne, noch neuere Form mit roten Blumen, sehr selten.

» **Zuccariniana Hort.**..... 4.— —

Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.

mollis Oliver..... 5.— 48.—

Ein in allen Teilen grösserer Strauch. Blätter bis 15 cm lang und breit, von prachtvoll metallisch glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen.

vernalis Sargent...... 6.— —

Neuer und sehr interessanter, amerikanischer Strauch, von sehr verzweigtem Wuchs, der sich zu Anfang des Jahres, wenigstens 10 Tage früher als die japanischen und chinesischen Arten, voll mit gelben, angenehm duftenden Blüten bedeckt und in der Belaubung der gewöhnlichen Erie ähnelt.

virginica L...... Sträucher 30—40 cm hoch 1.50 12.— 100.

» 40—60 » » 2.50 20.— —

Hübsch belaubter, bis 5 m hoch werdender Strauch. Die hellgelben Blüten erscheinen im Herbst, während alle vorübergehenden Arten von Weihnachten bis März ununterbrochen blühen.

Hedera, siehe Schlingpflanzen.

Helianthemum, siehe Stauden.

Melwingia Willd. (Araliaceae).

ruscifolia Willd. (H. japonica Dietr.)..... mit Topfballen 3.— —

Kaum meterhoher Strauch von verzweigtem Wuchs mit kleiner, tiefgrüner Belaubung und grünlichen Blüthen.

Hibiscus L. Eibisch (Malvaceae).

syriacus-Hybriden:

Bis 2 m hoch werdende Sträucher, die in den meisten Gegenden Deutschlands aushalten. Die Blüten erscheinen von Juli an in den mannigfaltigsten Farben. Blumenkrone trichterig glockig, bis 6 cm im Durchmesser. Verlangt guten, durchlässigen, etwas feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.

albus plenus..... 1.— —

Gefüllt, reinweiss.

coelestis..... 1.— —

Einfach, blau.

Duchesse de Brabant..... 1.— —

Stark gefüllt, dunkelrot.

luteus plenus..... 1.— —

Gefüllt, schön gelblichweiss.

monstrosus van Houtte..... 1.— —

paeoniaeflorus..... 1.— —

Stark gefüllt, weisslich rosenrot.

puniceus plenus..... 1.— 9.—

Halbgefüllt, dunkelrosa.

ranunculiflorus plenus..... 1.— —

Gefüllt, weiss.

roseus plenus..... 1.— 9.—

Dicht gefüllt, dunkelrosa.

ruber plenus..... 1.— —

Gefüllt, dunkelrot.

Rubin..... 1.— —

Einfach, die dunkelste der roten Sorten.

Sir Charles Breton..... 1.— —

Halbgefüllt, violett.

variegatus..... 1.— —

Buntblättrig.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hibiscus (Fortsetzung):			
syriacus-Hybriden:			
<i>violaceus</i>	1.—	—	—
Hellviolett.			
» <i>variegatus</i>	1.—	—	—
Hippophaë <i>L.</i> Sanddorn (Elaeagnaceae).			
<i>rhamnoides</i> <i>L.</i>	—70	6.—	50.—
Bis 4 m hoch werdender Strauch mit silberglänzender, feinblättriger			
Belaubung. Im Herbst wirken die orangefarbenen Früchte sehr zierend.			
<i>salicifolia</i> <i>D. Don.</i>	—80	7.—	—
Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unter-			
seits grünlich silberfarbenen, glänzenden Blättern.			
Hydrangea <i>L.</i> Hortensie (Saxifragaceae).			
Dankbare, reichblühende Ziersträucher, die in jedem guten,			
mässig feuchten Gartenboden in sonniger Lage gut gedeihen.			
<i>altissima</i> <i>Wall.</i>	1.50	12.—	—
mit Topfballen			
Hochkletternder Wasserstrauch, in Nepal und in dem Himala			
a heimisch. Blätter oberseits lebhaft- bis dunkelgrün, unterseits hell-			
grün. Hat hier noch nicht geblüht. Winterschutz.			
<i>arborescens cordata</i> <i>Pursh.</i>	1.—	—	—
Mit grossen, herzförmigen Blättern. Grosse, platte Blumendolden			
von weisser Farbe im Juli—August.			
» <i>grandiflora</i> <i>Rehder.</i>	1.—	8.—	—
Vollständig winterharter Strauch mit breiter Belaubung und sehr			
grossen, reinweissen Blumen.			
» <i>urticifolia</i> <i>Hort.</i> , nesselblättrige Hortensie	1.—	—	—
<i>cinerea sterilis</i> <i>Rehder</i>	1.—	8.—	—
Die meist eiförmigen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits			
dicht und kurz weisshaarig. Blütendolden bis 15 cm Durchmesser,			
mit grossen, weissen, sterilen Blüten.			
<i>hortensis Lindleyana</i> <i>Hort.</i>	2.—	18.—	—
Starkwachsend, in voller Sonne reichblühend. Randblüten rosa,			
die inneren, fruchtbaren blau.			
» <i>Mariesi</i> <i>Hort.</i>	2.—	18.—	—
Sehr grosse Dolden aus malvenartig blauen Blumen zusammen-			
gesetzt. Bedarf der Deckung.			
» <i>Otaksa</i> <i>Hort.</i> , blaublühende Kugelhortensie	2.—	18.—	—
<i>nivea</i> , siehe <i>H. radiata</i> .			
<i>opuloides stellata rubra</i> <i>Dipp.</i> siehe <i>H. stellata rubra</i> <i>Hort.</i>			
<i>paniculata grandiflora</i> <i>Sieb.</i> Gartenhortensie.			
Sträucher 5— 8 Triebe	—70	6.—	50.—
» 8—12 »	—80	7.—	60.—
Kronenbäumchen 40— 60 cm bis zur Krone	1.20	10.—	90.—
» 60— 75 » » » »	1.75	15.—	130.—
» 75— 90 » » » »	2.50	22.—	—
» 90—105 » » » »	3.—	28.—	—
» 105—120 » » » »	3.50	32.—	—
» 120—140 » » » »	4.—	—	—
Die grossen, reinweissen, später rosafarbenen, breit pyramiden-			
förmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem Strauche eine			
ausserordentliche Zierde.			
<i>pubescens</i> <i>Dec.</i> Weichhaarige Hortensie	—80	—	—
Ein hier ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit			
rotbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm lang und 10 cm breit. Blüten			
im Juli, in breiten Scheindolden, weiss.			
<i>radiata</i> <i>Walter</i> (<i>H. nivea</i> <i>Mich.</i>)	1.—	8.—	—
Harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis			
grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser			
haltenden, reichblütigen Doldentrauben. Randblüten reinweiss.			
<i>Sargentiana</i> <i>Rehder</i>	2.—	—	—
mit Topfballen			
Von Wilson eingeführte Art aus China, von allen andern durch			
das dichtbehaarte Holz und Stiele zu unterscheiden. Strauch wird			
etwa 2 m hoch, verlangt in der Jugend Winterschutz. Das ovale			
Blatt ist ungefähr 25:15 cm gross, mattgrün. Blütendolden gross mit			
weissen sterilen Randblüten und violetten fertilen Blüten in der Mitte.			
<i>stellata rubra</i> <i>Hort.</i> (<i>H. opuloides stellata rubra</i> , <i>Dipp.</i>)			
mit Topfballen	1.50	14.—	—
Reichblühende Dolden mit Blüten von rosaroter Färbung.			

Hymenanthera Rob. Brown (Violaceae).

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<i>crassifolia</i> Hook. mit Topfballen	1.50	12.—	—

Kleiner, immergrüner, brautmyrtenblättriger, buschiger Strauch mit kleinen, dicklichen, lederartigen Blättern, bis 2 cm lang und 1/2 cm breit. Beeren bläulichpurpur. Bildet schöne Hecken.

Hypericum L. Hartheu, Johanniskraut (Hypericaceae).

Schöne, kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hindurch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch einzeln, über und über voll, meist gelb, selten weiss blühen. Sie lieben leichten, durchlässigen Boden in sonniger Lage.

<i>Ascyrum</i> L., sibirisches Hartheu	—60	5.—	—
--	-----	-----	---

Sehr reichblühend, mit grossen, gelben Blumen, 1 m hoch.

» <i>macropetalum</i> Hort	—60	5.—	—
----------------------------------	-----	-----	---

Blumenblätter grösser als bei der vorigen Art.

<i>aureum</i> Bartr.	—60	5.—	—
---------------------------	-----	-----	---

Grosse, goldgelbe, bis 5 cm im Durchmesser haltende Blumen, Strauch bis 1 m hoch, reichblühend.

<i>densiflorum</i> Pursh.	—60	5.—	—
--------------------------------	-----	-----	---

Niedriger Strauch, der sich im Juli bis August mit zahlreichen, kleinen, gelben Blüten bedeckt, über 1 m hoch.

<i>inodorum</i> Willdenow. Geruchloses Hartheu	—80	—	—
--	-----	---	---

Halbsträuchige, aufrechtwachsende Art, welche 1/2—3/4 m Höhe erreicht und im Juli—August gelbe Blüten hervorbringt.

<i>patulum</i> Henryi Veitch	—80	7.—	—
------------------------------------	-----	-----	---

Bis meterhoher, vollständig winterharter Strauch mit prächtigen, grossen Blüten, ähnlich *H. Moserianum*, von August ab.

<i>Richeri</i> Vill.	—80	7.—	—
---------------------------	-----	-----	---

Starkwachsende, holzartige, winterharte Sorte. Blumen goldgelb, Staubbeutel orangegebl.

Ilex L. Hülsen. Stechpalmen (Aquifoliaceae).

<i>Aquilolium</i> L.	40—50 cm hoch	3.50	30.—	250.—
---------------------------	---------------	------	------	-------

50—60 » » 4.— 35.— 300.—

60—70 » » 4.50 40.— 350.—

70—80 » » 5.— 45.— 400.—

80—90 » » 6.— 55.— 500.—

90—100 » » 7.— 65.— 600.—

100—125 » » 8.— 75.— —



Bekannter, immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten. Für Hecken besonders geeignet.

Aquifolium-Varietäten:

<i>angustifolia aureo-marginata</i>	30—40 cm hoch	2.—	—	—
---	---------------	-----	---	---

Schmalblättrig, gelb gerandet.

<i>argenteo-marginata</i>	30—40 » »	2.—	18.—	—
---------------------------------	-----------	-----	------	---

Weiss gerandet.

<i>aureo-marginata</i>	30—40 » »	2.—	—	—
------------------------------	-----------	-----	---	---

40—55 » » 4.— 35.— —

55—70 » » 5.— 45.— —

Gelb gerandet.

» » <i>lucida</i>	30—40 » »	2.—	—	—
-------------------------	-----------	-----	---	---

Leuchtend gelb gerandet.

<i>balearica</i> Loes.	30—40 » »	2.—	—	—
-----------------------------	-----------	-----	---	---

Mit sehr grossen, grünen Blättern.

<i>bicolor</i>	30—40 » »	2.—	—	—
----------------------	-----------	-----	---	---

Bekannte, hübsche, gelbbunte Form.

<i>calamistrata</i>	30—40 » »	2.—	—	—
---------------------------	-----------	-----	---	---

Blätter tütenförmig gedreht.

<i>camelliaefolia</i>	30—40 » »	2.—	—	—
-----------------------------	-----------	-----	---	---

Kamellenähnliche Blätter.

<i>crispa argenteo-maculata</i>	30—40 » »	2.50	—	—
---------------------------------------	-----------	------	---	---

Krause, gelbgefleckte Blätter.

» <i>aureo-maculata</i>	30—40 » »	2.50	—	—
-------------------------------	-----------	------	---	---

Dieselbe Blattform, gelbgefleckt.

Ilex (Fortsetzung):

Aquifolium-Varietäten:

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Doningtonensis	30—40 cm hoch	2.—	—	—
Mittelgrosse, scharfstachelige Blätter.				
ferox (J. Aquif. echinata)	30—40 » »	2.—	—	—
Dicht mit Stacheln besetzt.				
» aureo-maculata	20—30 » »	2.—	—	—
Form mit gelbgeleckten Blättern.				
Foxii Moore	30—40 » »	2.—	—	—
	55—70 » »	5.—	—	—
	70—85 » »	7.—	—	—
	85—100 » »	10.—	—	—
Besonders schöne, dunkelgrüne Form, die früh Beeren ansetzt.				
Golden Queen	20—30 cm hoch	2.50	—	—
Eine sehr schöne, buntblättrige Varietät, die äusserst hart ist.				
heterophylla Ait. (J. Mahoon)	30—40 cm hoch	2.—	—	—
Blätter sehr gross und verschieden geformt, teils stachellos, teils mit langen Stacheln.				
» Lawsoniana (J. Mahoon aureo-maculata)	30—40 cm hoch	2.50	—	—
Gelbgeleckte Varietät.				
Hodgensii argenteo-variegata	30—40 cm hoch	3.—	—	—
Noch seltene Varietät mit dornlosen, silberberandeten Blättern; von J. Aquifolium ganz verschieden.				
latifolia argenteo-marginata	30—40 cm hoch	2.—	—	—
Weiss gerandet.				
laurifolia	30—40 » »	2.—	18.—	—
	40—55 » »	4.—	35.—	—
	55—70 » »	5.—	—	—
Bekannte, stachellose, lorbeerblättrige Sorte.				
longifolia argenteo-marginata	30—40 » »	2.50	—	—
Schmalblättrig, weiss gerandet.				
» pyramidalis (J. latifolia)	30—40 » »	2.—	18.—	—
	40—55 » »	4.—	35.—	—
	55—70 » »	5.—	45.—	—
	70—85 » »	6.—	55.—	—
	85—100 » »	7.—	65.—	—
	100—125 » »	10.—	95.—	—
Mit glänzend grünen Blättern. Beeren rot, stark fruktifizierend.				
Madame Briot	20—30 cm hoch	2.50	—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
Eine der schönsten, bunten Varietäten.				
Mahoon , siehe J. Aquif. heterophylla.				
minor aureo-marginata	30—40 » »	2.—	—	—
Kleinblättrig, gelb gerandet.				
occidentalis platyphylloides Christ. (I. Wilsoni Aug. Henry)	30—40 cm hoch	2.50	—	—
Blatt dunkelgrün, 12 cm lang und 8 cm breit.				
pendula	30—40 » »	2.—	—	—
Form mit stark hängenden Zweigen.				
» argenteo-marginata	30—40 » »	2.50	—	—
Ebenfalls hängend. Blätter weiss gerandet.				
Perado	30—40 » »	2.—	—	—
Grossblättrig und starkwachsend.				
planifolia	40—55 » »	4.—	—	—
Sehr grosses, dunkelgrünes Blatt.				
Regina versicolor	30—40 » »	2.—	—	—
Schön gelb- und weissbunte Form.				
scotica	30—40 » »	2.—	—	—
Mit gedrehten Blättern.				
Watereriana	20—30 » »	2.—	—	—
Glänzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form.				

Verschiedene Arten und Formen:

cornuta Lindl.	mit Topfballen 15—20 cm hoch	3.—	—	—
Aus Nordchina. Bildet einen dichten, bis 2 m hohen Strauch.				
Blatt rechteckig, mit 4 starken Ecken- und einem Enddorn.				

Ilex (Fortsetzung):

crenata Thunb. Gekerbblättrige Hülse 20—30 cm hoch
Zeigt in Belaubung und Wuchs viel Ähnlichkeit mit *Buxus*.
Von dunkelgrüner Färbung.

» (**Fortunei**) **aureo-variegata Hort.** 40—55 cm hoch
55—70 » »

Gelbbunt, Blätter noch kleiner als die der Art.

Fargesii Franch. mit Topfballen 60—80 » »
Ein schöner, immergrüner Strauch, der 1½ bis 3 m Höhe erreicht
und einem Ilex sehr unähnlich sieht.

glabra Gray (*Prinos glaber L.*) mit Topfballen
Wird etwa 1½ m hoch mit oberseits tiefgrüner, unterseits
hellerer Belaubung. Früchte schwarz, 5—8 cm Durchmesser.

pedunculosa continentalis Loesener 60—80 cm hoch
Kommt im westlichen Hupch in einer Höhe von 1500 m in Wäldern
vor. Blätter lederartig bis 7½ cm lang und bis 3 cm breit, nach
beiden Seiten zugespitzt verlaufend, gewellt, obere Hälfte gesägt.
Einem immergrünen *Ligustrum* ähnlich.

Pernyi Franch. mit Topfballen 10—20 cm hoch
Eine seltene, dicht wachsende Hülse. Blätter bis 4 cm lang mit
1—3 starken Zahnpaaren. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün.

» **manipurensis Loes.** (*I. Veitchii*) 30—40 cm hoch
Blatt etwas breiter, am Grunde stärker abgestutzt.

purpurea Oldhamii Loesener . mit Topfballen 20 30 » »
Blätter dünnlederig, bisweilen sehr dünn, Austrieb schön rot,
Blätter 10:4 cm, lanzettlich, leicht gezähnt.

Sieboldi Miqu. Sträucher 40—60 cm hoch
Ein winterharter, sommergrüner Strauch, im Herbst über und
über mit korallenroten Früchten bedeckt.

spinosissima Hort. 30—40 cm hoch
40—60 » »

Mit schöner, leuchtend grüner Belaubung. Blätter gewellt, mit
sehr langen Stacheln besetzt.

Veitchi, siehe *I. Pernyi manipurensis*.

Wilsoni Aug. Henry, siehe *I. Aquifol. occidentalis platy-*
phylloides Christ.

yunnanensis Franch mit Topfballen 15—20 cm hoch
Langsam wachsender, immergrüner Strauch, dicht besetzt mit
kleinen, eiförmigen Blättern. Die Ränder derselben sind stark gekerbt
und dornlos.

Itea L. Rosmarinweide (*Saxifragaceae*).

virginica L. 1.— 8.—
Bis 2 m hoch werdender, dichtbuschiger Strauch mit glänzend
grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Juli bis August
in aufrechten, ährenartigen Trauben.

Jasminum L. Jasmin (*Oleaceae*).

Beesianum Bees. 1.50 12.—
Starkwachsend, mit leicht schlingenden, grünen Trieben. Be-
laubung elliptisch, tiefgrün; Blüte 1½ cm breit, von leuchtend
blutroter Färbung.

floridum Bge. (*J. floribundum*) mit Topfballen 1.50 — —
Zweige kantig. Blätter 3—5 zählig. Blüten fast geruchlos,
von Juni bis August. Erreicht etwa 1 m Höhe. Blüten gelb.

nudiflorum L. Echter Jasmin 1.50 — —
Frühblühender Strauch, der bereits vor dem Austrieb der
Blätter im März seine schönen, gelben Blüten entfaltet.

officinale L. 1.50 — —
Leicht kletternder Strauch, der bis 3 m Höhe erreicht. Blüten
bis zu 12, weiss, duftend. Juli—August.

Juglans L. Walnuss (*Juglandaceae*).

nigra L. Schwarze Walnuss. Hochstämme 8—10 cm Umfang 8.— — —
Bildet selbst in geringen Bodenarten und in freier Lage mächt-
tige Bäume von imposanter Wirkung.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 10 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1.50	12.—	100.—
5.—	—	—
6.—	—	—
5.—	45.—	—
2.—	18.—	—
5.—	45.—	—
3.—	—	—
5.—	—	—
5.—	—	—
1.—	8.—	—
2.50	—	—
4.—	—	—
1.—	8.—	—
4.—	—	—
1.—	8.—	—
1.50	12.—	—
1.50	—	—
1.50	—	—
1.50	—	—
8.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Juglans (Fortsetzung):			
regia L. Edle Walnuss. Hochstämme 6— 8 cm Umfang	2.75	25.—	—
» 8—10 » »	3.50	30.—	—
» 10—12 » »	4.—	38.—	—
Allbekannter Baum, dessen Holz eines der allerwertvollsten ist, und dessen Früchte teuer bezahlt werden.			
» laciniata A. de C. nd. Pyramiden 200—250 cm hoch Laub fein geschlitzt und eingeschnitten.	6.—	—	—
» monophylla Hort. Pyramiden 80—100 cm Mit grossem, einfachem Blatt.	4.—	—	—
Kalmia L. Kalmie (Ericaceae).			
Wunderschön blühende, immergrüne Gehölze von mässiger Höhe, die vollständig hart sind und in etwas feuchter Moorerde, sonnig oder halbschattig, vorzüglich gedeihen.			
angustifolia L. Schmalblättrige Kalmie 30—40 cm hoch 1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai—Juni vollständig mit karminroten, schalenförmigen, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt.	3.—	—	—
» rubra Hort. 30—40 cm hoch Blumen dunkelrot, sonst wie die Art.	3.—	28.—	—
latifolia L. Breitblättrige Lorbeerrose 30—40 » »	2.50	22.—	—
» 40—60 » »	3.—	28.—	250.—
» 60—80 » »	5.—	48.—	—
Immergrüner, bis 3 m hoher, dichtwachsender Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen, schalenförmigen, blassrosa bis leuchtend rosenroten Blumen erscheinen im Mai und Juni.			
Kerria de Candolle. Kerrie, Ranunkelstrauch. (Rosaceae.)			
japonica de Candolle 1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden, goldgelben Blüten.	— .80	7.—	—
Laburnum Griseb. Goldregen (Leguminosae).			
Adamii Petz & Kirchner (Laburnocytisus Adami). 80—100 cm hoch 100—120 » »	2.— 2.50	18.— 22.—	— —
Eine interessante Hybride (C. purpureus × L. alpinum) mit dreierlei verschiedenfarbigen, roten, gelben und purpurfarbigen Blüten.			
alpinum Griseb. Alpengoldregen Sträucher Hochstämme 5—7 cm Umfang	1.— 4.—	9.— 38.—	80.—
Belaubung glänzend dunkelgrün, Blüthentrauben bedeutend grösser und später erscheinend wie vulgare.			
vulgare Griseb. (Cytisus Laburnum L.) Gemeiner Goldregen Sträucher 100—150 cm hoch Hochstämme 5—7 cm Umfang	— .80 3.50	7.— 30.—	60.— 250.—
Ein kleiner, hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen, hängenden Blüthentrauben bedeckt.			
» chrysophyllum Späth (L. aureum Rehd.) Sträucher Belaubung schön goldgelb.	2.—	—	—
Watereri Dippel (Lab. vulg. Parksii) Sträucher Eine Kreuzung von Laburnum alpinum mit L. vulgare von kräftigem Wuchs und mit langen, gelben Blüthentrauben.	2.—	18.—	—
Laurus (Lauraceae).			
tinus variegatus mit Topfballen, 30—40 cm hoch Ziemlich starkwachsend. Blätter hellgelb gerandet.	2.50	—	—
lavandula siehe Stauden.			
Lespedeza Michaux. Buschklée (Leguminosae).			
bicolor Turcz. Zweifarbiges Buschklée Über meterhoher, reichverzweigter Strauch mit dreiteiligen, oberseits sattgrünen Blättern und violetten bis karminroten Blüten im Juli—September.	2.—	—	—
Leucothoë D. Don. Leucothoë (Ericaceae.) (Siehe auch Andromeda und Lyonia.)			
axillaris D. Don. (Andromeda axillaris Lam.) Kleiner, immergrüner Strauch mit glänzendgrüner Belaubung und vielen, hübschen, weissen Blüthentrauben.	2.—	—	—

Leucothoë (Fortsetzung):**Catesbaei** *Asa Gray*. (*Andromeda Catesbaei* und *Rollinsoni*).Über 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blütentrauben als *L. axillaris*. Wächst an feuchten, hellen Lagen gut.**Leycesteria** *Wallich*. *Leycesterie* (*Caprifoliaceae*)**formosa** *Wall*.

Reichlich meterhoch werdender Strauch mit spitzovaler bis lanzettlicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüten rötlich-weiße, trichterig, in endständigen Scheinähren.

Ligustrina, siehe *Syringa*.**Ligustrum** *L.* Rainweide (*Oleaceae*).**acuminatum** *Koehne*

Strauch breitwachsend, Belaubung düster graugrün. Blüht früh, in kurzen Rispen, die mehr am Ende der vorjährigen Zweige stehen.

amurense *Carrière*

Starkwachsender Strauch mit aufwärtsgerichteten Ästen und ziemlich kleinen Blütenrispen mehr gegen das Ende der Zweige hin. Blüht früh, anfangs Juni.

ciliatum *Sieb*

Ein zierlicher, ziemlich klein bleibender Strauch mit eirhombischen, oberseits sattgrünen, unterseits helleren Blättern; Blütenstand kopfförmig, wenig auffallend.

coriaceum *Nois*mit Topfbällen
Von gedrängt verzweigtem Wuchs mit stumpf oder rundlichen, glänzenden Blättern und dichten, ährig-rispigen Blütenständen.**Delavayanum** *Hariot*

Aus China stammende Art, mit kleinen, fast rundlichen Blättern, die sich nach oben und unten fast gleichmässig verschmälern. Der Strauch erreicht etwa 1,20 m Höhe.

Ibota *Sieb. & Zucc.*

Schöner, 2–3 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Blüten 5–8 zusammengedrängt am Ende der seitlichen Zweige oder Hauptäste.

» **aureo-marginatum** *Hort.*

Eine niedliche Form mit kleinen, gelbumrandeten Blättern.

» **variegatum** *Hort.*

Weissbuntblättrige Form.

ionandrum *Diels*mit Topfbällen
Neuer, chinesischer, dichtwachsender Strauch, der in der Belaubung wenig Unterschiede von *L. Delavayanum* zeigt. Hat hier noch nicht geblüht.**japonicum** *Thunberg* (*L. latifolium* *Hort.*). Japanische Rainweide

mit Topfbällen 30–40 cm hoch

» » 80–100 » »

Immergrüner Strauch, der über 2 m Höhe erreicht, mit rundlich bis eiförmigen Blättern und bis 10 cm langen, lockeren Blütenrispen.

macrocarpum *Koehne*

Wenig verbreiteter, kräftig wachsender, harter Strauch mit grossen, elliptischen Blättern, 5 cm langen, dichten Blütenrispen und ovalen, schwarzen Beeren.

medium *Franch. & Sav.*Eine mit *L. ovalifolium* viel Ähnlichkeit besitzende Art, die jedoch reichlicher blüht. Es dürfte sich vielleicht um eine Varietät von *L. ovalifolium* handeln.**ovalifolium** *Hasskarl*. Eiblättrige Rainweide

Buschige Sträucher 40–60 cm hoch

1000 St. M. 180.—

» » 60–80 cm hoch

1000 St. M. 200.—

» » 80–100 cm hoch

Halbimmergrüner, harter Strauch mit dunkelgrünen Blättern, für Hecken besonders geeignet.

» **aureo-elegantissimum** *Hort.*

Blätter schön goldgelb gerändert, besonders schön.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 10 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2.—	18.—	—
2.—	—	—
—60	5.—	45.—
—60	5.—	—
1.50	14.—	—
2.—	—	—
2.—	18.—	—
—60	5.—	45.—
1.—	8.—	—
1.—	8.—	—
2.—	—	—
1.50	—	—
3.—	—	—
—60	5.—	45.—
—60	5.—	45.—
—30	2.50	20.—
—40	3.—	25.—
—50	4.—	30.—
—80	7.—	60.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ligustrum (Fortsetzung):			
ovalifolium aureo-marginatum Hort. Gelb gerandete Blätter.	— 80	7.—	—
» elegans argenteum Hort. Schöne Form mit silberweisser Belaubung.	— 80	7.—	—
Purpusi Hoefk. (L. species himalayense Purpus) mit Topfballen Schöne Art von flottem, aufrechtem Wuchs mit dunkelpurpur- farbigen Trieben. Blätter schmal lanzettlich, bis 15 cm lang, von gelblichgrüner Färbung mit bräunlichem Rand. Austrieb purpurfarbig.	2.—	18.—	—
Regelianum Koehne. Breitwachsener und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten, hellgrünen Blättern, vielen, kleinen, weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.	— 60	5.—	45.—
Simoni tricolor Hort. mit Topfballen 20—30 cm hoch	1.50	—	—
» » 40—60 » »	2.—	—	—
Blätter rot, weiss und grün gefärbt.			
sinense Stauntonii Rehd. Niedriger, ausgebreiteter, reichblühender Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis August in reichblütigen Rispen.	— 60	5.—	45.—
strongylophyllum Hemsley mit Topfballen Aus China eingeführter, immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abge- rundeten Blättern.	2.—	—	—
vulgare L. Gemeine Rainweide. Buschige Sträucher 120—150 cm hoch 1000 St. M. 200.— Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken.	— 40	3.—	25.—
» chlorocarpum Hort. (L. vulg. fructu luteo) Die gelblichgrünen Früchte sind sehr zierend.	— 60	5.—	45.—
» glaucum Hoefk. (L. vulg. glauc. albo marg. Rehd.) Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig, weiss- gerandet Starkwüchsig.	— 80	7.—	—
» italum Mill. Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmälern, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.	— 60	5.—	45.—
» reticulatum Hort. Mit gelbgenetzten Blättern.	— 80	7.—	—
Lindera Thunb. Lindera (Lauraceae).			
praecox Blume mit Topfballen Wohlriechender Fieberstrauch, der bis 3 m hoch wird. Blätter gerieben wohlriechend, auf 1½ cm langen Stielen, verkehrt lanzett- förmig, bis 13 cm lang und 7 cm breit, oberseits freudig grün, unter- seits blaugrün. Blüten vor dem Ausbruch des Laubes.	2.50	—	—
sericea Blume mit Topfballen Blätter verkehrt elliptisch, länglich zugespitzt, jung seidig filzig, später oberseits angedrückt weichhaarig, unterseits weichzottig. Blüte mit der Belaubung.	2.50	—	—
Liquidambar L. Amberbaum (Hamamelidaceae).			
styraciflua L. Sträucher Mittelgrosser, prächtig belaubter Baum. Blatt mehr oder weniger fünflappig, sattgrün, im Herbst herrliche, rote Färbungen annehmend.	1.—	—	—
Liriodendron L. Tulpenbaum (Magnoliaceae).			
tulipifera L. Pyramiden 100—150 cm hoch Schöner, grosser Baum mit bis 15 cm breiten und 10 cm langen, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durchmesser habenden, tulpen- artigen, gelblichgrünen, aussen orangefarbig gezeichneten Blüten.	2.50	24.—	—
Lithospermum , siehe Stauden.			
Lonicera L. Heckenkirsche (Caprifoliaceae). (Siehe auch Schlingpflanzen.)			
Alberti Rgl. (L. spinosa Alberti) Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belau- bung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich.	1.50	—	—

Lonicera (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
amoena alba Zabel (L. floribunda × L. tatarica).....	—50	4.—	35.—
Schöne Hybride, weissblühend, beim Verblühen gelblich.			
bella Zabel (L. Morrowi × L. tatarica).....	—50	4.—	—
Schöne Hybride, flottwachsend, mit prächtigen, karminroten Blüten.			
chaetocarpa Rehder mit Topfballen	2.—	—	—
In Habitus und allgemeinem Aussehen unterscheidet sich diese Spezies wesentlich von der typischen L. hispida, von der sie als Varietät anzusehen ist. Sie ist leicht zu unterscheiden an ihren borstigen, drüsigen Fruchtknoten, der grösseren und weiteren Korolle, sichtlich sackförmig an der Basis, den grösseren Blütendeckblättern und Blättern, rauhhaarig auf beiden Seiten und unterseits graugrün, sowie an dem zottigen Flaumhaar der ganzen Pflanze.			
chrysantha Turcz	1.—	—	—
Buschiger Strauch, bis 4 m hoch. Blätter 8—12 cm lang, 3—5 cm breit. Blumen gelb. Beeren dunkelrot.			
coerulea L.	—60	5.—	45.—
Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender, im April bis Mai blühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blaubereifte, längliche Früchte trägt.			
» dependens Regel	—80	7.—	—
Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulich-grünen Blättern. Blüte wie die der Art.			
» Kirilowi Hort	—80	—	—
Steif aufrechter, rotzweigiger Strauch mit ovalen, oberseits freudig grünen, unterseits helleren Blättern.			
coerulescens Dippel	—60	5.—	—
Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rötlichen Zweigen, Blumen hellkarmesinrot.			
deflexicalyx Batalin	—60	5.—	—
Aufrechter, schlankzweigiger Strauch mit lanzettlicher, oberseits lichtgrüner, unterseits hellgraugrüner Belaubung. Blüte tiefgelb, Juni, Frucht orangefarben.			
depressa Royle	1.—	—	—
Harter, bis 1 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Blumen röhrig-glockig, hellrosa, Mai—Juni erblühend.			
diversifolia Wall.	—80	—	—
Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weichbehaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb im Sommer. Beeren durchsichtig weiss.			
floribunda Boiss & Buhse	—60	5.—	—
Strauch mit feinfälzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbbrot.			
gracilipes Mig.	—60	5.—	—
Ein bis 1½ m hoher Strauch mit eirundlichen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich gefärbt sind. Blüten trichterig, rosaweiss, Frucht eiförmig, rot.			
helvetica Brügger	—60	5.—	—
Entstanden durch Kreuzung von L. nigra mit L. Xylosteum.			
involucrata Banks.	—60	5.—	45.—
1 m hoher Strauch mit gelbbraunen Ästen; hat verkehrt eiförmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgrüne Blätter. Blumen goldgelb oder gelbbrot im Mai—Juni.			
» flavescens Rehder	—60	5.—	45.—
Von aufrechtem Wuchs, etwa 1 m hoch, mit grossen, länglichen Blättern. Die gelben Blüten erscheinen im Mai, Frucht schwarz, von grossen, roten Deckblättern umgeben.			
» serotina Koehne	—60	5.—	45.—
Unterscheidet sich von der Art hauptsächlich durch die spät erscheinenden, scharlachrot überlaufenden, bis 2 cm langen Blätter.			
Kesselringi Regel (L. orientalis kamtschatica Hort.).....	—60	5.—	45.—
Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.			
Korolkowi Stapf	—80	7.—	—
Schöner, turkestanischer Strauch von zierendem Wuchs. Belaubung blaugrün. Blüten zartrosafarben im Mai—Juni.			

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
onicera (Fortsetzung):			
Ledebouri <i>Eschsch.</i> Ledebours-Heckenkirsche	—60	5.—	45.—
Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch; Blatt dicklich, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen orange, mit rot übertüncht im Mai—Juni. Früchte schwärzlich purpur.			
Maacki <i>Maxim.</i>	—80	7.—	—
Bis 3 m hoch werdender, buschiger Strauch mit grossen Blättern. Die grossen, reinweissen Blumen erscheinen im Juni. Früchte blutrot.			
podocarpa <i>Franch.</i>	—80	7.—	—
Neuerdings aus China eingeführt von mehr ausgebreitetem Wuchs als die typische Form. Blätter breiter, oval bis elliptisch, plötzlich zugespitzt.			
Maximowiczii <i>Regel.</i>	—80	7.—	—
Bis 3 m hoher Strauch, aufrecht und stark verzweigt, Blätter oval, eiförmig bis eilänglich, Blüte purpurviolett.			
micantha <i>Dipp.</i>	—80	—	—
Graugrün belaubter, schlankzweigiger Strauch, der etwa 1 bis 1½ m hoch wird. Blumen klein, rosa. Beeren korallenrot.			
minutiflora <i>Zabel</i> (L. <i>micantha</i> × L. <i>Morrowi</i>)	—60	5.—	45.—
Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.			
Morrowii <i>A. Gr.</i>	—60	5.—	45.—
Strauch mit überhängenden Ästen und eirundlichen Blättern von dunkelgrüner, unterseits graugrüner Färbung. Blüten weissgelb im Mai—Juni. Beeren blutrot.			
myrtilloides <i>Purpus</i>	—60	5.—	—
1—1½ m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spätsommer, weiss, unten rötlich, wohlriechend. Beeren kugelig, rotglänzend.			
nigra pyrenaica <i>Dippel</i>	—60	5.—	—
Zeichnet sich durch kleinere, oberseits dunkelblaugrüne, unterseits hellbläulichgrüne Blätter und kleinere Blüten aus.			
nitida <i>Wilson</i>	1.—	8.—	75.—
mit Topfbällen 40—60 cm hoch			
» » 60—80 » »			
Aufrechwachsender, reich verzweigter und dicht belaubter, immergrüner Strauch von 1—2 m Höhe. Blatt ledrig, oval, reichlich 1 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss, Frucht erbsengross, purpurblau.			
obovata <i>Royle</i>	—80	—	—
2 m hoher, buschiger Strauch mit kleinen, abgerundeten Blättern und wohlriechenden, hellila Blumen im Mai.			
orientalis <i>Lam.</i>	—60	5.—	—
1½—3 m hoher, buschiger Strauch mit aufrechten Zweigen und lebhaft dunkelgrünen, unterseits bläulichgrünen, bis 9 cm langen und 6 cm breiten Blättern. Blüten im Mai violett oder rosa. Doppelbeere schwarz.			
Leroyana <i>Zabel</i>	1.—	—	—
Von zwergigem, gedrunenem und dichtzweigigem Wuchs.			
parvifolia <i>Hook. & Thoms.</i> (L. <i>Myrtillus</i>)	—60	5.—	—
1—1½ m hoher, buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2½ cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.			
pileata <i>Oliver</i>	—80	7.—	60.—
mit Topfbällen			
Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit eirunden, immergrünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattachseln. Früchte prachtvoll durchscheinend violett.			
prostrata <i>Rehder</i>	—80	7.—	—
Niederliegender Strauch, der in West-Szechuan bei Sungpan in einer Höhe von 3000—3500 m gefunden worden ist.			
rapicola <i>Hooker fils & Thomson.</i> Felsenheckenkirsche	—80	7.—	—
Schöner Strauch aus Tibet, bis 1½ m hoch, mit überhängenden Zweigen und schönduftenden, hellila Blumen im Juni.			
Euprechtiana <i>Regel.</i>	—50	4.—	35.—
2½ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni, weiss, später hellgelb, Beeren orangerot.			
Schmitziana <i>Rozzl.</i>	—50	4.—	35.—
1—1½ m hoher Strauch. Blätter 2—4 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits heller. Blüten im Juli bis August am Ende der Zweige. Blumenkrone schön rot.			

Lonicera (Fortsetzung):

segreziensis *Lavall.* (*L. diversifolia* × *L. Xylosteum*).....
 Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, oberseits
 dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig behaart. Blüten im
 Mai, gelb. Beeren korallenrot.

species chinensis *Lavall.*.....
 Nach der Belaubung zu urteilen, scheint es sich um eine Form
 zu handeln, die zwischen «*L. orientalis*» und «*L. or. longifolia*» liegt.
 Blattgrösse etwa 4.5 × 8.5 cm.

Standishi lancifolia *Rehder*.....
 Unterscheidet sich von der Art besonders durch die schmalen,
 lanzettlichen Blätter. Ist eine neue Wilsonsche Einführung.

syringantha *Max.*.....
 Aufrechtwachsender Busch, selten. Die Blüte erscheint Ende
 Mai, rosalia, stark, angenehm duftend, Frucht scharlachrot.

tatarica *L., B.*.....
 Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schönblühender Strauch mit
 hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten.

» **alba** *Lois-Desl.*.....
 Weissblühend.

» » **rosea** *Späth.*.....
 Blüte hell atlasrosa.

» **bicolor** *Carr.*.....
 Blumen innen rosa, aussen dunkelrot.

» **Fenzlii** *Hort.*.....
 Gelbbunt gestreifte und gefleckte Blätter.

» **micrantha** *Trautv.*.....
 Feinbehaarte Form.

» **pulcherrima** *Reg.*.....
 Schön dunkelrot blühend.

» **rosea** *Reg.*.....
 Blumen rosa.

» » **grandiflora** *Hort.*.....
 Trägt grössere Blumen als vorige Form.

» **ruberrima** *Hort.*.....
 Dunkelrot blühend.

» **splendens** *Reg.*.....
 Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.

» **virginialis** *Jäg.*.....
 Blumen weiss mit zartrosa.

» » **grandiflora**.....
 Grössere Blumen als vorige Form.

tibetica *Bur. & Franch.*.....
 Bis 2 m hoher, schlankzweigiger, teils niederliegender Strauch
 mit lanzettlicher, tiefgrüner Belaubung. Blüte violett-purpurn.

translucens *Carr.*.....
 Strauch aufrecht, mit eiförmiger, lichtgrüner Belaubung. Blüte
 gelblich; Beere weiss.

trichosantha *Franch.*.....
 Neuer, chinesischer Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit
 langen, oft fast niederliegenden Zweigen von braungrauer Farbe.
 Blätter auf 3–5 mm langen Stielen, 3–5.2–4 cm gross. Blumen ähnlich
 wie bei *L. deflexicalyx*. Beeren orangefarben.

Xylosteum *L.*, gemeine Heckenkirsche. **B.**.....
 Von mittelstarkem Wuchs mit überhängenden Zweigen, gelblich-
 weissen Blumen und dicken, roten Beeren.

Lonicera, in besten Sorten meiner Wahl, aus vorstehenden
 Sorten ausgewählt..... 100 St. M. 35.—
 1000 » » 300.—

Lycium, siehe Schlingpflanzen.

Lyonia *Nuttall.* Lyonie, siehe auch *Andromeda* und *Leucothoë*
 (*Ericaceae*).

calyculata *Reichenbach* (*Andromeda calyculata* *L.*). Zwerg-
 lorbeer.....

Bis ½ m hoher, immergrüner Strauch. Blätter lederartig, bis
 4 cm lang und 1½ cm breit. Blüten im April weiss oder hellrötlich.

pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück
M. Pf.	M. Pf.	M.
—50	4.—	35
—60	5.—	45
150	—	—
—80	7.—	—
—50	4.—	35
—60	5.—	—
—50	4.—	—
—50	4.—	35
—60	5.—	—
—60	5.—	—
—50	4.—	35
—50	4.—	35
—50	4.—	35
—50	4.—	35
—50	4.—	35
—50	4.—	35
—50	4.—	35
—80	7.—	—
—80	7.—	—
—80	7.—	—
—50	4.—	30
150	14.—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Yonia (Fortsetzung):			
<i>calyculata minor Hort.</i>	1.50	—	—
Eine in allen Teilen kleinere, zierlichere Varietät.			
» <i>nana Hort.</i> (<i>Andromeda vaccinoides Hort.</i>).....	1.50	—	—
Ein niederliegender, immergrüner Strauch, der mit weissen Blumen im Frühling vollständig bedeckt ist.			
Magnolia L. Magnolie (Magnoliaceae).			
Harte, reich- und schönblühende Gehölze. Die Blütezeit fällt je nach der Art vom Frühjahr bis Hochsommer. Ein guter, frischer und tiefgründiger Gartenboden sagt ihnen am besten zu. Lage sonnig.			
<i>acuminata L.</i> 60—80 cm hoch	3.—	—	—
Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblich- grünen Blüten erscheinen im Juni und Juli. Schöner Wald- und Parkbaum.			
<i>glauca L.</i> 40—60 cm hoch	5.—	—	—
Auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern mit silbrigweisser Unterseite und weissen, wohlriechenden Blüten im Juli—August.			
<i>Kobus D.C.</i> Pyramiden 80—100 cm hoch	5.—	45.—	—
» 100—120 » »	6.—	55.—	—
» 140—160 » »	10.—	—	—
» 180—200 » »	15.—	—	—
Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen, weissen, tulpen- artigen Blüten. Bildet einen schön belaubten, kleinen Baum. Junges Laubwerk braunrot.			
<i>parviflora S. & Z.</i> 40—60 cm hoch	6.—	—	—
Sehr schöne, japanische Art, die im Juni oder Juli mit der Belaubung blüht; Blumen weiss, Staubfäden rot. Zeichnet sich durch gedrungenen, in die Breite gehenden Wuchs aus.			
<i>purpurea Curt.</i> (<i>M. obovata Thunb.</i>) Pyramiden 60—80 cm hoch	4.—	35.—	—
Bekannter Frühjahrsblüher, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.			
» <i>nigricans Hort.</i> Pyramiden 60—80 cm hoch	4.—	35.—	—
Varietät mit dunkleren Blüten.			
<i>salicifolia Maxim.</i> Weidenblättrige Magnolie,			
Pflanzen mit Topfbällen 20—30 cm hoch	4.—	—	—
Eine der allerhärtesten Arten mit schlanken Zweigen und hell- grünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die im April massenhaft hervorgebrachten Blumen sind weiss, ähneln jenen von <i>M. Kobus</i> und haben einen köstlichen Wohlgeruch. Die frühblühendste der Ma- gnolien.			
<i>stellata Max.</i> , Stern-Magnolie .. Pyramiden 60—80 cm hoch	8.—	—	—
» 80—100 » »	12.—	—	—
» 100—120 » »	15.—	—	—
Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser.			
<i>tripetala L.</i> Schirm-Magnolie..... 40—60 cm hoch	3.—	—	—
Locker wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross, erblühen Mai—Juni. Fruchtstand und Samen rot.			
<i>Yulan Desf.</i> , Lilien-Magnolie Pyramiden 60—80 cm hoch	6.—	55.—	—
» 80—100 » »	8.—	—	—
Ein kleiner Baum, der sich im April mit blendend weissen, wohl- riechenden Blüten bedeckt.			
Hybriden (<i>M. obovata</i> × <i>M. Yulan</i>):			
<i>alba superba</i> Pyramiden 80—100 cm hoch	8.—	—	—
Hybride mit schöngeformten, schneeweissen Blumen.			
<i>Alexandrina Hort.</i> Pyramiden 60—80 » »	6.—	55.—	—
Frühjahrsblüher. Blumen purpur, innen weiss.			
<i>amabilis</i> Pyramiden 80—100 » »	8.—	75.—	—
Weissblühende Hybride mit flachgeformten Blumen.			
<i>angustifolia</i> Pyramiden 80—100 » »	6.—	—	—
Blumen weiss, leicht purpurrosa.			

Magnolia (Fortsetzung):**Hybriden (M. obovata × M. Yulan):**

Lenneana *Topf*.....Pyramiden 60—80 cm hoch 6.—
 » 100—120 » » 10.—

Hybride vom Wuchs der *M. purpurea* mit grossen, blutroten Blüten. Eine der schönsten Formen. Frühjahrsblüher.

Norbertiana *Hort*.....Pyramiden 60—80 cm hoch 6.—
 Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur. 55.—

Soulangeana *Soul.-Bod*.....Pyramiden 60—80 cm hoch 6.—
 » 80—100 » » 8.—
 » 100—120 » » 10.—

Bekannte Hybride zwischen *M. Yulan* und *M. purpurea*. Blumen weiss, rötlich gezeichnet. Frühjahrsblüher.

» **nigra** *Hort*.....Pyramiden 60—80 cm hoch 6.—
 » 80—100 » » 8.—
 » 100—120 » » 10.—

Dankbar blühende Sorte mit grossen, 12 cm langen Blumen von dunkelroter Farbe, später blühend als die Art.

speciosa *Hort*.....Pyramiden 80—100 cm hoch 8.—
 » 100—120 » » 10.—

Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.

triumphans.....Pyramiden 60—80 cm hoch 6.—
 » 80—100 » » 8.—
 » 100—120 » » 10.—

Hybride mit rötlich gefärbten Blumen.

Mahonia *Nutt.* (Berberidaceae.)

Aquifolium *Nutt.* **B**.....starke Büsche ca. 40—60 » » —80 7.—

Harter Strauch mit grossen, gelben Blüentrauben, blauen Früchten und immergrünen, glänzenden, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben.

» **juglandifolia** *Jovin*.....mit Topfbällen 30—40 cm hoch 1.—
 Bis 2 m und mehr hoch werdender, hübscher Strauch mit leuchtend roten Blattrippen, Blättchen kleiner und dicker als beim Typ.

» **undulata** *Hort*.....mit Topfbällen 30—40 cm hoch 1.—
 Schöne Form mit gewellten Blättern. Der Austrieb ist schön rot.

japonica *De Cand*.....30—40 cm hoch 2.50
 1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen, gefiederten, lederartigen, hellgrünen, gezähnten Blättern. 24.—

Wagneri *Hort*.....mit Topfbällen 30—40 cm hoch 1.—
 Eine hübsche Form mit zierlich gefiederten Blättern, deren Blättchen langdornig gezähnt und lebhaft glänzend hellgrün sind.

Malus *Jussieu*. Apfelbaum (Rosaceae).

baccata und andere Kirschäpfel für wirtschaftliche Zwecke siehe Seite 17.

Malus Eleyi, *Neu*... 1jähr. Veredelungen 100—130 cm hoch 3.—
 2 » Büsche 100—120 » » 3.50

Eine neue Wildapfel-Hybride; Kreuzung zwischen *M. Niedzwetzkyana* und *M. spectabilis*. Der junge Austrieb ist rot-purpurn, aber viel lebhafter als bei der Mutterart. Die Farbe der auffallend grossen Blätter hält sich in günstigen Jahren bis zum Blattfall. Die Blüten gemahnen an Apfelblüten und prangen in einem reichen, lebhaften Weinrot. Zur Fruchtzeit ist die Pflanze besonders schön, da sie sich über und über mit lebhaft purpurroten Äpfeln bedeckt, die in dichten Büscheln von der Zweigunterseite herabhängen. Sehr zu empfehlen.

Malus

Exzellenz Thiel, siehe Trauerbäume.

floribunda *Siebold*.....Pyramiden 100—150 cm hoch 2.—
 Reichblühender Kirschäpfel mit zartrosafarbenen Blüten, von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen; Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe. 18.—

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Malus (Fortsetzung):				
floribunda Arnoldiana Rehder.	Pyramiden 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	Höhe bis zur Krone 160—180 »	3.—	—	—
Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden Strauch mit schlanken Zweigen. Im Mai bedeckt sich der Strauch vollständig mit grossen, blässerrosafarbenen, einfachen Blüten. Knospen karminrot. Früchte gelblich.				
» purpurea Hort.	Pyramiden 100—150 cm hoch	2.—	18.—	150.—
	Höhe bis zur Krone 100—120 »	2.—	18.—	—
	» » » » 120—140 »	2.50	22.—	200.—
	» » » » 140—160 »	3.—	28.—	—
Belaubung im Austrieb purpurrot, später in bronziert-dunkelgrün übergehend. Blumen zahlreich, breit, karmesin- oder kirschrot; Knospen blutrot. Früchte in Büscheln von 2—5, dunkelblutrot, im Herbst in scharlachrot übergehend.				
Frau Luise Dittmann Hort.	Pyramiden 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
Japanische, halbgefüllt blühende Form. Blüte sehr grosse, weiss mit rosa. Treibgehölz.				
micromalus Makino	Pyramiden 100—150 cm hoch	2.—	18.—	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 »	2.50	—	—
Chinesische Kulturform, strauchartig, mit eilanzettlicher bis länglicher, derber, sattgrüner Belaubung. Die in 3—7zähligen Büscheln stehenden Blüten sind lebhaft rosa. Frucht flachkugelig, etwa 1½ cm Durchmesser, in voller Reife gelb.				
Niedzwetzkyana Dieck.	Pyramiden 100—120 cm hoch	2.50	—	—
Prachtvoller Zierapfel mit braunroter Rinde und leuchtend braunroter Belaubung. Blüten dunkelrosa; Früchte dunkelrot.				
Sargentii Rehder	Pyramiden 60—80 cm hoch	2.—	18.—	—
Ein niedriger, etwa 1—1½ m hoch werdender, dicht verzweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai in fünf- bis sechsblütigen Doldentrauben.				
Scheidekeri Zabel.	Höhe bis zur Krone 160—180 cm	3.50	—	—
Wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, gefüllter Blüten hervorbringt.				
Sieboldi calocarpa	Sträucher 120—150 cm hoch	2.50	20.—	—
Reizender, kleiner Zierapfel, dessen reicher Behang mit kleinen, dunkelroten Äpfelchen oft die Blätter fast verdeckt.				
Menispermum , siehe Schlingpflanzen.				
Menziesia , siehe Dabeocia.				
Microglossa D. C. , Amphirapis (Kompositae).				
abscens Clarke.	mit Topfballen	2.50	—	—
Bis 1 m hoher, aufrechter Halbstrauch mit breitlanzettlichen, gelbgrünen Blättern. Blüte klein, lila, zu bis 15 cm breiten, endständigen Rispidolden vereinigt.				
Morus L. Maulbeerbaum (Moraceae).				
alba L.	Weissfrüchtige Maulbeere.	1.—	—	—
Ein bis 12 m hoher Baum mit lebhaft grünen Blättern. Futter für Seidenraupen.				
Nuchlenbeckia Meissner. (Polygonaceae.)				
nana	mit Topfballen	2.—	18.—	—
Von kriechendem Wuchs mit dunkelgrünen, immergrünen Blättern, bedeckt in wenigen Jahren grosse Flächen.				
Myrica L. Wachsmyrte (Myricaceae).				
cerifera L.		1.—	8.—	—
Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glänzend dunkelgrünen Blättern. Kätzchenblüte im März—April.				
Neillia D. Don. Neillie (Rosaceae).				
thysiflora Hook.		1.50	—	—
Schöne, weissblühende Spiraea.				
Torreyi , siehe Physocarpus.				
Neviusia A. Gr. Schneelocke (Rosaceae).				
alabamensis A. Gr.	mit Topfballen	2.50	—	—
Ein zierliches, meterhohes Sträuchlein, im Juni geschmückt mit hellgrünen, durch die zahlreichen, schneeweissen Staubfäden auffallenden Blüten.				

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Nothofagus Blume. Falsche Buche (Fagaceae).			
<i>antarctica</i> Oerst. mit Topfballen	3.—	—	—
Kleiner, zierlicher Strauch mit wechselständigen, kleinen Blättern			
1—2 cm gross, stark gewellt und leicht gezähnt, sommergrün.			
Nuttallia Torr & Gr. Nuttallie (Rosaceae).			
<i>cerasiformis</i> Torrey & Gray	1.50	—	—
Strauch mit bläulich dunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm			
breiten Blättern. Blüten weiss, mit oder bald nach Entfaltung der			
Blätter, in einfachen Trauben.			
Olearia Moench. Olearie (Compositae).			
<i>Haasti</i> Hook. f. mit Topfballen, 30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
Immergrüner, ziemlich gedungen wachsender Strauch mit weiss-			
lich behaarten Zweigen. Blatt bis 3,5:1,5 cm gross, tiefmattgrün.			
Die hübschen, weissen Strahlenblüten erscheinen im Sommer sehr			
zahlreich in doldigen Ständen. Liebt warme, sonnige Lage; Winter-			
schutz.			
Orixa Thunberg. Orixa, Evodia (Rutaceae).			
<i>japonica</i> Thunberg	2.—	—	—
Bis 2 m hoher, japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und			
kurzgestielten, länglichen, lebhaft grünen Blättern. Die grünlichen			
Blüten erscheinen im Mai.			
Osmanthus Loureiro. Osmanthus (Oleaceae).			
<i>Aquifolium</i> S. & Z. Stechpalmenblättriger Osmanthus			
mit Topfballen 30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
Buschiger, immergrüner Strauch von 50—100 cm Höhe. Die leder-			
artigen, 6—8 cm langen Blätter sind buchtigdornig gezähnt, oberseits			
glänzend dunkelgrün, unterseits heller.			
» <i>albo marginatus</i> Hort. mit Topfballen	2.—	—	—
Schöne Form mit weissgerandeten Blättern.			
» <i>ilicifolius purpureus</i> Hort. mit Topfballen	2.—	—	—
Schöne Form, im Austrieb purpur in schwärzlichgrün übergehend.			
<i>armatus</i> mit Topfballen	2.50	—	—
Ein schöner, immergrüner, niedrigbleibender Strauch, mit läng-			
lichen, lanzettlichen, sehr grob gezähnten Blättern von 10—15 cm			
Länge und bis 3½ cm Breite. Blüten im Herbst, rahmweiss, wohl-			
riechend.			
Oxylobus A. Gray (Compositae).			
<i>arbutifolius</i> A. Gray mit Topfballen	2.—	—	—
Kleiner aufrechtwachsender Strauch mit gegenständiger, ovaler			
Belaubung von dunkelgrüner Farbe.			
Pachysandra, siehe Stauden.			
Paeonia, siehe Stauden.			
Parrotia C. A. Meyer. Parrotie (Hamamelidaceae).			
<i>Jacquemontiana</i> Decne.	2.50	—	—
Ein etwa 3 m hoher Strauch mit in der Jugend dichtbehaarten			
Zweigen. Blatt breitrundlich, bis 6:7 cm gross.			
Pavia, siehe Aesculus.			
Pernettya Gaudichaud. Torfmyrte (Ericaceae).			
<i>mucronata</i> major 20—30 cm hoch	1.—	8.—	—
30—40 » »	1.50	12.—	—
Bis 50 cm hoch werdender, aufrechter, verästelter Strauch mit			
kleinen, immergrünen Blättern. Blüten im Mai weiss, rötlich an-			
gehaucht.			
<i>nigra</i> 20—30 cm hoch	1.—	8.—	—
30—40 » »	1.50	12.—	—
Strauch mit glänzend immergrünen, lederartigen Blättern.			
Blumen weiss, im Mai.			
<i>purpurea</i> 20—30 cm hoch	1.—	8.—	—
30—40 » »	1.50	12.—	—
Ist der vorhergehenden nahestehend, zeigt jedoch einen flatteren			
Wuchs.			

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Phellodendron Ruprecht. Korkbaum (Rutaceae).			
amurensis Ruprecht. Mandschurischer Korkbaum			
120—150 cm hoch	1.50	12.—	—
Ein bis 12 m hoch werdender Baum mit korkartiger, grauer Rinde und 25—40 cm langen, gefiederten Blättern.			
sachalinense Sarg.	1.50	12.—	—
120—150 cm hoch			
Ist dem vorigen ähnlich, jedoch härter.			
Philadelphus L. Pfeifenstrauch (Saxifragaceae).			
acuminatus Lange	—60	5.—	—
Ein bis 2 m hoher, reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus 2½ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind. Blütezeit Juni.			
Billardi Koehne	—60	5.—	40.—
Starkwachsende Art, eine der besten, grossblumigsten Sorten. Blüht überreich Mitte Juni.			
brachybotris Koehne	—60	5.—	40.—
Eine in China entdeckte Art mit sehr grossen, weissen, wohlriechenden Blumen. Soll die beste der ganzen Familie sein. Anfang Juni blühend.			
californicus Beuth	—80	—	—
Etwas 3 m hoher Strauch. Triebe stark, tiefrot, mit breitovaler, glänzend sattgrüner Belaubung und weissen, geruchlosen, bis 2½ cm breiten Blüten.			
caucasicus Koehne	—80	7.—	—
Blätter 5—8 cm lang, schmal eiförmig bis länglich, unterseits graugrün.			
columbianus Koehne. Kolumbianischer Pfeifenstrauch.....	—50	4.—	35.—
Starkwachsende und grossblumige Art. Mitte Juni überreich blühend. Bis 3 m hoch.			
cordifolius Lge.	—50	4.—	35.—
Starkwachsende, grossblumige Sorte, Juni—Juli.			
coronarius L. Wohlriechender Pfeifenstrauch.....	—60	5.—	—
Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.			
» aureus	—60	5.—	—
Mit schöner, goldgelber Belaubung.			
» deutziflorus	—60	5.—	—
Bildet niedrigen, kompakten Busch.			
» plenus Hort.	—60	5.—	45.—
Mit rahmweiss gefüllten Blüten.			
» dianthiflorus	—60	5.—	45.—
Schöne, niedrigbleibende Sorte.			
» plenus Hort.	—60	5.—	45.—
Bringt schöngefüllte Blüten.			
» flore pleno	—80	7.—	—
Gefülltblühende Varietät des wohlriechenden Pfeifenstrauchs.			
» multiflorus plenus Hort.	—80	7.—	—
Dunkelgrüne Belaubung. Die Blattränder sind nach unten gebogen und daher die Blätter gewölbt.			
» nanus Dipp.	—60	5.—	—
Zwergform.			
» primulaeflorus	—80	—	—
Niedrigbleibende Form mit dunkelgrüner Belaubung.			
» rosaeiflorus plenus Hort.	—80	7.—	—
Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.			
» salicifolius Dippel	—60	5.—	—
Von eigentümlicher Tracht mit ganzrandigen, 7—12 cm langen und 1—2 cm breiten Blättern.			
Delavayi Henry	1.—	—	—
Art mit hellbraunen Zweigen und derben, unterseits behaarten Blättern. Blütenstände vielblumig, Blüte 3—4 cm breit, sehr wohlriechend und frühblühend.			
Falconeri Sarg.	—60	5.—	40.—
Ein 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilanzettlichen Blättern und wohlriechenden Blüten.			
globosus Hort.	—60	5.—	40.—
Starkwachsende Art mit grossen, grobgezähnten Blättern, grossblumig, wohlriechend, Mitte Juni blühend.			

Philadelphus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
gloriosus <i>Bead.</i>	1.—	—	—
Eine sehr starkwachsende Varietät mit grossen Blättern und grossen, weissen Blumen.			
Gordonianus <i>Ldl.</i>	—50	4.—	35.—
Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eirunden Blättern, reinweissen, kugelig-glockigen Blumen, Anfang Juni.			
grandiflorus <i>W.</i> Grossblütiger Pfeifenstrauch	—60	5.—	40.—
Mit sehr grossen, einfachen, reinweissen Blüten, intensiv duftend. Sehr reichblühend. Mitte Juni.			
» speciosissimus <i>Hort.</i>	—60	5.—	40.—
Grosse, dunkelgrüne, runde bis eirunde Blätter und sehr grosse, reinweisse Blumen. Mitte Juni blühend.			
inodorus <i>L.</i>	—50	4.—	35.—
1—2 m hoch werdender Strauch mit breiteiförmigen Blättern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden, reinweissen, schwach duftenden Blüten. Reichblühend. Anfang Juni.			
Keteleeri	—60	5.—	—
Feinzweigige Form mit hellgrüner Belaubung.			
latifolius <i>Schrad.</i> Breitblättriger Pfeifenstrauch	—50	4.—	35.—
Die am stärksten wachsende Art mit grossen, weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten. Mitte Juni.			
» pendulifolius <i>Hort.</i> (<i>Ph. pendulifolius</i> <i>Carr.</i>)	—60	5.—	—
Mit dunkelgrünen, hängenden Blättern.			
laxus <i>Schrad.</i>	1.—	—	—
Grossblumige Art von überhängendem Wuchs. 1½ m hoch.			
Lemoinei <i>Conquête</i>	1.—	—	—
Blumen gross, locker gefüllt, unregelmässig, sehr duftend, mit schmalen Blumenblättern, reichblühend.			
» densiflorus (<i>Ph. Avalanche</i> <i>Lem.</i>)	1.—	—	—
Die grossen, weissen, wohlriechenden Blüten bedecken, dicht gedrängt stehend, die bis 2 m langen Zweige.			
» Dresden	1.—	—	—
Strauch von niedrigem Wuchs, ausserordentlich dankbar blühend. Blüte sehr gross, schneeweiss.			
» erectus <i>Lem.</i>	—50	4.—	35.—
Aufrechtwachsender Strauch, der sich mit wohlriechenden Blütensträussen vollständig bedeckt. Mitte Juni blühend.			
» erectus grandiflorus (<i>Ph. Montblanc</i> <i>Lem.</i>)	—70	6.—	50.—
Bis 150 cm hoher, aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät.			
» flore pleno (<i>Ph. Boule d'argent</i> <i>Lem.</i>)	1.—	—	—
Form mit grossen, dicht gefüllten Blüten von reinweisser Färbung.			
» multiflorus (<i>Ph. Gerbe de Neige</i> <i>Lem.</i>)	1.—	—	—
Die Zweige bedecken sich über und über mit wohlriechenden reinweissen Blumen. Ende Juni.			
» Virginal	1.—	8.—	70.—
Starkwachsende Form mit hübscher Belaubung. Die grossen Blütentrauben stehen dicht entlang des Zweiges und tragen je 5—7 grosse, gefüllte Blüten von petunienartiger Form und reinweisser Färbung. Ausserst reichblühend.			
Lewisi <i>Pursh.</i>	—60	5.—	—
Niedriger, bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20 blütigen, dichten Trauben zu Ende Juni. Sehr wohlriechend.			
Magdalenae <i>Koehne</i>	1.—	—	—
Sehr reichblühender, buschiger Strauch mit eilanzettlichen, behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und mit 2,5 cm breiten, kreisrunden, weissen Blumen.			
navalis <i>Hort.</i>	—60	5.—	40.—
Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5—11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss, wohlriechend, Mitte Juni.			
» spectabilis plenus	1.—	8.—	—
Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.			
» subplenus	1.—	8.—	—
Strauch von dichtbuschigem, niedrigem Wuchs. Blüte milchweiss, 3—4 cm Durchmesser, halb gefüllt, sehr wohlriechend, in wenigblütigen, beblätterten Trauben. Belaubung eiförmig, 7—8 : 4 bis 4½ cm, oberseits dunkelgrün mit gezähntem Rand.			

Philadelphus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
pubescens Loisl.	— 50	4.—	35.—
Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden, glockigen Blüten. Sehr reichblühend.			
sanguineus Hort.	— 60	5.—	40.—
Starkwachsend, mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern. Blütentrauben vielblumig, duftend. Mitte Juni.			
Satsumi Sieb.	— 80	7.—	—
Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6—9 cm langen, breiteiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.			
» Yokohamae Hort.	— 60	5.—	40.—
Schöner, japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blütentrauben. Blumen bis 3½ cm im Durchmesser, geruchlos. Mitte Juni blühend.			
Schrenkii Rupr.	— 60	5.—	40.—
Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.			
tenuifolius Rupr.	— 60	5.—	40.—
Steifaufrecht wachsende Art mit rotbraunen Zweigen und dunkler Belaubung. Blütezeit Juni—Juli.			
tomentosus Wall. Filzigblättriger Pfeifenstrauch	— 60	5.—	40.—
Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beiderseits dicht filzig behaart. Blüte duftend. Juni—Juli.			
undulatus. Wellenblättriger Pfeifenstrauch	— 60	5.—	40.—
Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser, duftend. Die enorm zahlreichen Blüten erscheinen von Mitte Juni an.			
verrucosus Schrad. mit Topfballen	2.—	—	—
Blätter ziemlich schmal, an Blütenzweigen kaum über 7 cm, Blüten zu 5—7, etwa 3 cm breit. Mitte bis Ende Juni.			
Zeyheri Schr.	— 50	4.—	35.—
Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art. Mitte Juni blühend. Sehr reichblühende, duftende Art.			
Philadelphus, in besten Sorten meiner Wahl			
100 St. M. 35.—, 1000 St. M. 300.—.			
Phillyrea Linné. Steinlinde (Oleaceae).			
angustifolia L. mit Topfballen 20—30 cm hoch	2.50	—	—
Strauch bis 2 m hoch, langtriebzig, mit schmäler, langer Belaubung.			
myrtifolia Hort. mit Topfballen 20—30 cm hoch	2.50	24.—	—
Kleinblättrige Art. Die schönen, dunkelgrünen Blätter sind im Durchschnitt nur 3½ cm lang und etwa 1½ cm breit.			
Vilmoriniana Boissier & Ball. (Ph. laurifolia u. Ph. decora)			
30—40 cm hoch	1.50	12.—	100.—
40—50 » »	2.—	18.—	150.—
Bis 3 m hoher Strauch. Die empfehlenswerteste Art.			
Phlomis L. Flammenlippe (Labiateae).			
fruticosa L. mit Topfballen	1.50	—	—
½—1 m hoher, verästelter Strauch mit flockig-filzigen Ästen. Blumen gross, dunkelgelb in vielblütigen Scheinquirlen. Blütezeit Juni—Juli. Sonnige Lage.			
Photinia, siehe Sorbus.			
Phylloceae Salisb. Moosheide, Bryanthus (Ericaceae).			
taxifolia Salisb. Taxusblättrige Moosheide, mit Topfballen	2.—	—	—
Bis 20 cm hoher, heideähnlicher Zwergstrauch. Die hellbläulich purpurfarbenen Blumen erscheinen im Juli und August am Ende der Zweige. Kultur wie Erica.			
Physocarpus Cambessedes. Blasenpiere (Rosaceae).			
amurensis Maxim. starke Sträucher	— 50	4.—	30.—
Blüten weiss, im Juni in halbkugeligen, mehrblütigen Doldentrauben. Strauch wird bis 3 m hoch.			
capitatus O. Kuntze	— 60	—	—
Hübscher, harter Zierstrauch mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten. Blüte weiss, Juni.			

Physocarpus (Fortsetzung):

opulifolius Maxim. Schneeballblättrige Blasenspiere
 Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit aufstrebenden, gelb-
 grauen Ästen und weissen, halbkugeligen Doldentrauben, die in
 grosser Anzahl Anfang Juni erscheinen.

» **inebrians Hort.**
 Diese Form gleicht in allen Teilen sehr der Art, nur sind die
 Blütenknospen, sowie auch die eben erschlossenen Blüten leicht
 rosafarbig.

» **luteus Kirch.**
 Form mit goldgelber Belaubung.

Torreyi Maxim. (Neillia Torreyi Wats.)
 Wuchs überhängend, etwa $\frac{1}{2}$ m hoch. Belaubung sehr klein.
 Blütendolden klein. Für Felspartien.

Plagianthus Forst. (Malvaceae).

Lyalli Hook. fil. 120—150 cm hoch
 Triebe dunkel, kahl. Blatt herzförmig, etwa 5 cm lang gestielt,
 bis 8:6 cm gross, mit tief rundlich gekerbtem Rand, der leicht bräun-
 lich gefärbt ist. Oberseite matt hellgrün, Unterseite heller.

Plagiospermum Oliv. (Prinsepia) (Rosaceae),

Schiefkern-Pflaume.

sinense Oliv. mit Topfballen
 Bis $1\frac{1}{2}$ m hoher, dichter, überhängender, breiter Strauch mit
 sehr spitz-eilanzettlichen Blättern. Blüten achselständig, klein, leb-
 haft gelb, stark duftend.

Polycodium Greene (Ericaceae).

neglectum melanocarpum Small (Vaccinium melanocarpum
Mohr) mit Topfballen
 Jüngere Triebe feinfälzig behaart, glänzend dunkelpflaumen-
 farbene Früchte, essbar, mit tiefpurpurnem Saft.

Polygala L. Kreuzblume (Polygalaceae).

Chamaebuxus L. Buchsbaum-Kreuzblume ... mit Topfballen
 Sehr zierliches, immergrünes Sträuchlein mit buchsbaumähnlichen
 Blättern. Blüten im Mai und Juni. Kelch weiss, mit grossen, die
 gelbe oder bräunrote Blumenkrone mit vierspaltigem Kamm über-
 ragenden Flügeln. Winterschutz.

Polygonum, siehe Schlingpflanzen.**Populus** L. Pappel (Salicaceae).

angulata cordata robusta Sim.-L. Hochstämme 6—8 cm Umfang
 Ausserordentlich starkwachsend, mit grosser, hellgrüner Belau-
 bung.

canadensis Moench. Kanadische Pappel.
 Hochstämme 6—8 cm Umfang

» 8—10 » »

» 10—12 » »

» 12—14 » »

Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassenbepflan-
 zung zu empfehlen. Anspruchslos an Standort.

» **betulifolia Koehne** 150—200 cm hoch

» **laevigata Aiton.** Hochstämme 6—8 cm Umfang
 Scheinbar eine verbesserte „P. canadensis“, von aussergewöhnlich
 starkem, schlank aufstrebendem Wuchs.

candicans Aiton Hochstämme 6—8 cm Umfang
 » 8—10 » »

Mit grosser, unterseits silberglänzender Belaubung.

caudina Ten. Pyramiden 200—250 cm hoch
 Süditalienische Form der Schwarzpappel mit behaarten Trieben.

hybrida M. B. Hochstämme 6—8 cm Umfang
 Hybride zwischen P. tremula und P. alba, der P. canescens sehr
 ähnlich, bildet sehr schöne Kronen, Blattform sehr variabel.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—50	4.—	30.—
—60	5.—	—
—60	5.—	40.—
—60	—	—
5.—	—	—
3.—	—	—
3.—	—	—
3.—	25.—	—
2.—	—	—
2.—	18.—	150.—
2.50	22.—	200.—
3.—	28.—	250.—
4.—	38.—	—
1.—	—	—
2.—	18.—	—
2.—	18.—	150.—
2.50	22.—	200.—
2.—	18.—	—
2.—	—	—

Populus (Fortsetzung):**lasiocarpa Oliv.** 80—100 cm hoch

Die eiförmigen, hersförmigen Blätter dieser noch neuen Pappel sind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend graugrüner Farbe, während die Blattstiele, Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss.

nigra fastigiata Desf. Italienische Pyramidenpappel. **B.**
Volle Pyramiden 200—250 cm hoch

» » 250—300 » »

» » 300—350 » »

Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.

rosea Dode. Hochstämme 6—8 cm Umfang
Starkwachsende Pappel mit herzförmigen, etwa 10 cm im Durchmesser haltenden Blättern.**Wilsonii Schneider** 80—100 cm hoch
Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 7—9 cm

Nach langjähriger, sorgfältiger Beobachtung in bezug auf Wüchsigkeit, Festigkeit gegen Krankheit und Winterhärte gebe ich mit **Populus Wilsonii Schneider** eine durchaus wertvolle, prächtig breit-pyramidale Pappel in den Handel, die von weitem schon durch die schönen, grossen Blätter und den gut geschlossenen Bau auffällt und eine wertvolle Bereicherung unserer Gartenbäume darstellt. Die dicken Zweige, einjährige purpurrötlich oder olivbraun, oft etwas blaugrün bereift, unbehaart, ältere aschgraubraun, sind glatt und lebhaft glänzend, wodurch der Baum auch im winterlichen, entlaubten Zustand sehrzierend wirkt. Die Blätter, 8—20 cm lang und 7—16 cm breit, sind papierartig, anfänglich rötlich, später oberseits dunkelblaugrün, immer unbehaart, unterseits verschiedenfarbig aschgraugrün, matt, anfangs flockig-filzig, später etwas glatter und nur an den Rändern und Adern leicht behaart. Die Form der Blätter ist breit eiförmig oder fast rund, teilweise an der Basis mehr oder weniger herzförmig oder rundlich abgestutzt, der Rand kerbzählig. Die Blätter werden getragen von sehr zierenden, rötlichen, oberseits leicht geriefeten Blattstielen von 4—10 cm Länge. Diese wertvolle Neuheit erinnert stark an **Populus lasiocarpa Oliv.**, doch ist sie infolge der glatten und nicht so riesenhaften Blätter eine durchaus angenehmere Erscheinung im Park. Sie wurde von dem bekannten botanischen Reisenden des Arnold Arboretums, Herrn E. Wilson, in den chinesischen Bergen, wo der sehr seltene Baum heimisch ist, als Pflanze bis zu 25 m Höhe vorgefunden. Die hier angebotenen Pflanzen stammen ursprünglich von den Originalpflätzen des Arnold Arboretums ab.

Wislizenii Sarg. Hochstämme 6—8 cm Umfang
» 8—10 » »

Ein grosser, breitkroniger Baum der südwestlichen Vereinigten Staaten. Blätter dreieckig, kurz gespitzt, hellgrün, an rötlich überlaufenen Trieben.

Potentilla L. Fünffingerstrauch (Rosaceae).**arbuscula Don.** 1.50 — —

Mittelhoher Strauch mit lebhaft gelben Blüten, braunrötlichen Zweigen und hellgrünen, wenig behaarten Blättern.

Friedrichsenii Späth (*P. dahurica* × *P. fruticosa Koehne*) —.60 5.— 40.—

Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Florlichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteilhaft auf. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten Boden.

fruticosa L. Gemeiner Fünffingerstrauch —.60 5.— —

Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten.

» **floribunda Pursh.** 1.— 8.— —

Ungemein reichblühende Form der vorigen.

» **humilis Rgl.** 1.— 8.— —

Asiatische, niedrige, alpine Form.

» **mandschurica Maxim.** —.80 7.— —

Sehr niedrig, langgestielte, kleine Blättchen graugrün, Blüten reinweiss, Zweige braunrot, Felsenstrauch.

» **parvifolia Wats.** —.80 7.— —

Zierlicher, ziemlich hoher, schlankästiger Baum, Blätter meist nur halb so gross als *P. fruticosa*.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
lasiocarpa Oliv. 80—100 cm hoch	2.—	18.—	150.—
nigra fastigiata Desf. Italienische Pyramidenpappel. B. Volle Pyramiden 200—250 cm hoch	2.—	15.—	125.—
» » 250—300 » »	2.50	20.—	175.—
» » 300—350 » »	4.—	35.—	300.—
Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.			
rosea Dode. Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Starkwachsende Pappel mit herzförmigen, etwa 10 cm im Durchmesser haltenden Blättern.			
Wilsonii Schneider 80—100 cm hoch	3.—	25.—	200.—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 7—9 cm	5.—	45.—	400.—
Nach langjähriger, sorgfältiger Beobachtung in bezug auf Wüchsigkeit, Festigkeit gegen Krankheit und Winterhärte gebe ich mit Populus Wilsonii Schneider eine durchaus wertvolle, prächtig breit-pyramidale Pappel in den Handel, die von weitem schon durch die schönen, grossen Blätter und den gut geschlossenen Bau auffällt und eine wertvolle Bereicherung unserer Gartenbäume darstellt. Die dicken Zweige, einjährige purpurrötlich oder olivbraun, oft etwas blaugrün bereift, unbehaart, ältere aschgraubraun, sind glatt und lebhaft glänzend, wodurch der Baum auch im winterlichen, entlaubten Zustand sehrzierend wirkt. Die Blätter, 8—20 cm lang und 7—16 cm breit, sind papierartig, anfänglich rötlich, später oberseits dunkelblaugrün, immer unbehaart, unterseits verschiedenfarbig aschgraugrün, matt, anfangs flockig-filzig, später etwas glatter und nur an den Rändern und Adern leicht behaart. Die Form der Blätter ist breit eiförmig oder fast rund, teilweise an der Basis mehr oder weniger herzförmig oder rundlich abgestutzt, der Rand kerbzählig. Die Blätter werden getragen von sehr zierenden, rötlichen, oberseits leicht geriefeten Blattstielen von 4—10 cm Länge. Diese wertvolle Neuheit erinnert stark an Populus lasiocarpa Oliv. , doch ist sie infolge der glatten und nicht so riesenhaften Blätter eine durchaus angenehmere Erscheinung im Park. Sie wurde von dem bekannten botanischen Reisenden des Arnold Arboretums, Herrn E. Wilson, in den chinesischen Bergen, wo der sehr seltene Baum heimisch ist, als Pflanze bis zu 25 m Höhe vorgefunden. Die hier angebotenen Pflanzen stammen ursprünglich von den Originalpflätzen des Arnold Arboretums ab.			
Wislizenii Sarg. Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» 8—10 » »	2.50	—	—
Ein grosser, breitkroniger Baum der südwestlichen Vereinigten Staaten. Blätter dreieckig, kurz gespitzt, hellgrün, an rötlich überlaufenen Trieben.			
Potentilla L. Fünffingerstrauch (Rosaceae).			
arbuscula Don. 1.50 — —	1.50	—	—
Mittelhoher Strauch mit lebhaft gelben Blüten, braunrötlichen Zweigen und hellgrünen, wenig behaarten Blättern.			
Friedrichsenii Späth (<i>P. dahurica</i> × <i>P. fruticosa Koehne</i>) —.60 5.— 40.—	—.60	5.—	40.—
Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Florlichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteilhaft auf. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten Boden.			
fruticosa L. Gemeiner Fünffingerstrauch —.60 5.— —	—.60	5.—	—
Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten.			
» floribunda Pursh. 1.— 8.— —	1.—	8.—	—
Ungemein reichblühende Form der vorigen.			
» humilis Rgl. 1.— 8.— —	1.—	8.—	—
Asiatische, niedrige, alpine Form.			
» mandschurica Maxim. —.80 7.— —	—.80	7.—	—
Sehr niedrig, langgestielte, kleine Blättchen graugrün, Blüten reinweiss, Zweige braunrot, Felsenstrauch.			
» parvifolia Wats. —.80 7.— —	—.80	7.—	—
Zierlicher, ziemlich hoher, schlankästiger Baum, Blätter meist nur halb so gross als <i>P. fruticosa</i> .			

Prunus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Laurocerasus schipkaënsis Mischeana Späth. 20—30 cm hoch	1.50	12.—	—
40—60 » »	2.—	18.—	—
Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.			
» schipkaënsis Zabeliana Späth 20—30 cm hoch	1.50	12.—	—
Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglich-lanzett- lichen Blättern, die an schlanken, schrägaufstrebenden Zweigen sitzen. Vollständig hart.			
» serbica Pančić 30—40 cm hoch	1.50	12.—	—
40—60 » »	2.—	18.—	—
Niedrig bleibende Form aus Serbien mit breiten, dunkelgrünen Blättern.			
» Triumph de Bordeaux 40—60 cm hoch	2.—	18.—	—
Robuste, schlanke, straff aufrechtwachsende Form mit grosser Belaubung.			
» versaiiliensis Hort. 40—60 cm hoch	2.—	—	—
Mit glänzenden, sehr grossen Blättern. Sonst der vorigen ähnlich.			
lusitanica L. 40—55 cm hoch	2.—	18.—	—
60—80 » »	2.50	—	—
Mit schwärzlichgrünen, lorbeerähnlichen Blättern. Ist ganz hart.			
» pyramidalis L. Portugiesischer Kirschlorbeer,			
40—60 cm hoch	1.50	12.—	100.—
Mit schwärzlichgrünen Blättern, schön breit pyramidal wachsend. Die weissen, bis 20 cm langen Blütentrauben erscheinen bei alten Pflanzen zahlreich Anfang Juni. Ganz hart.			
Mariana Sträucher	—60	5.—	—
Die bekannte Marianenpflaume, als Unterlage geschätzt.			
microcarpa C. A. Meyer Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	—	—
Mittelhoher, verschieden gestalteter Strauch mit eilänglicher, kleiner, hellgrüner Belaubung und weisslichen Blüten vor Blatt- ausbruch.			
monticola K. Koch Büsche 80—120 cm hoch	1.50	12.—	—
Bis 3 m hoch werdender Strauch mit lebhaft grüner Belaubung. Die weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter zu Ende April.			
Myrobalana variegata Sträucher 100—120 cm hoch	1.50	—	—
Schöne Form mit weissgezeichneten Blättern.			
orthosepala Koehne. Texanische Scheinpflaume.			
Sträucher 70—100 cm hoch	1.50	—	—
Das schmale, graugrüne Laub wird getragen von glänzend rot- braunen Zweigen. Blume weiss, Frucht kugelig, blauschwarz.			
Padus L. Gemeine Traubenkirsche.			
Pyramiden 100—150 cm hoch	—90	8.—	70.—
» 150—180 » »	1.—	9.—	80.—
Beliebter, baumartiger Strauch bis Baum, der sich Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blütentrauben bedeckt.			
Pissardi Carrière Veredelungen 100—150 cm hoch	—80	7.—	60.—
Büsche 100—150 » »	1.—	9.—	80.—
Wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen, weissen Blütenflor, später durch die dunkelrote Be- laubung wirkt.			
» Hessei Hesse Veredelungen 60—80 cm hoch	1.20	10.—	—
Sträucher 80—100 » »	1.50	12.—	—
Die Blätter sind schmal und unregelmässig eingeschnitten und ge- sägt. Die rote Grundfärbung derselben ist von grünlichgelbem, goldigem oder hellrötlichem Rand umgeben.			
» Moseri flore pleno Veredelungen 100—150 cm hoch	1.50	12.—	—
Sträucher 100—130 » »	2.—	18.—	150.—
Varietät mit grossen, gefüllten Blumen von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurrot, grösser als die der Stammform.			
» nigra Büsche 80—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Veredelungen 100—150 » »	—80	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 5—7 cm Belaubung viel dunkler und grösser als die der Art; sie hält ihre glänzend schwarzpurpurrote Farbe bis zum Eintritt des Frostes. Blumen violett.			
	2.—	18.—	150.—

Prunus (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Pissardi Purpusi Hesse. Veredelungen 100—150 cm hoch	1.20	10.—	—
Pyramiden 80—120 » »	1.50	12.—	—
Die dunkelroten Blätter sind mit gelben und leuchtend rosa Farbtönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend.			
Pseudocerasus Lindley. Rosenblütige Kirsche Sträucher	— .70	6.—	50.—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm	1.—	9.—	80.—
Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit rosafarbenen Blüten bedeckt.			
» flore albo pleno Veredelungen 40—60 cm hoch	2.—	—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 »	2.50	—	—
Grosse, gefüllte, weisse Blumen			
» Naden (Sieboldi) Veredelungen 40—60 cm hoch	2.—	18.—	—
Büsche 60—80 » »	2.50	22.—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 »	2.50	—	—
» » » » 160—180 »	4.—	—	—
Grosse, weisse, leicht rosa überhauchte Blumen.			
pumila L. Sträucher	— .70	6.—	—
Der graugrün belaubte, weissblühende Strauch erreicht etwa 2 m Höhe. Blütezeit April—Mai. Für Felspartien.			
Sargenti Rehd. Veredelungen 60—80 cm hoch	1.50	—	—
Ziemlich hoher Baum mit langelliptischer, sattgrüner Belaubung. Blüten vor Blattaussbruch, rosa, 3—4 cm breit.			
serotina Ehrhart. Deutscher Lorbeer. B.			
Sträucher 120—150 cm hoch	— .60	5.—	40.—
» 150—170 » »	— .70	6.—	50.—
» 200—250 » »	1.—	9.—	80.—
Spätblühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Bis 30 m hoher Baum. Die grossen, weissen Blüthen Trauben erblühen Mai—Juni.			
serrulata Lindley Büsche	1.50	—	—
In der Tracht <i>Prunus Pseudocerasus</i> ähnlich, mit grossen, weissgefüllten Blüten.			
» Benifugen Pyramiden 80—100 cm hoch	2.50	—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 »	3.—	—	—
Rosablühend.			
» Hisakura Koehne Büsche	2.—	18.—	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.50	—	—
» » » » 100—120 »	3.—	25.—	—
» » » » 120—140 »	3.50	32.—	—
» » » » 140—160 »	4.—	38.—	—
Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden, gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich.			
» Mount Fuji Hort. 40—60 cm hoch	3.—	—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 »	4.—	—	—
» » » » 140—160 »	5.—	—	—
Kräftigwachsend mit grossen, halbgefüllten, reinweissen Blüten. Eine der allerschönsten Sorten.			
» Shidare Sakura Koehne (<i>P. subhirtella pendula</i>) Büsche	2.50	24.—	—
Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	4.—	38.—	—
» 120—140 » » »	5.—	—	—
Herrlicher Trauerbaum mit grossen, gefüllten, rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.			
» Ukon Hort. Büsche	2.50	24.—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	4.—	—	—
Halbgefüllte, ca. 4 cm grosse, grünlichweisse Blumen.			
» Yoshino Koehne. Büsche	2.50	24.—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	4.—	—	—
Von kräftigem Wuchs mit grossen, einfachen, rosafärbten Blumen.			
Simonii Carr. 80—120 cm hoch	1.50	12.—	—
Strauch bis 3 m hoch, Triebe schlank, aufrecht. Blatt wie das eines Pärsich, sattgrün. Blüte weiss, kurz vor oder mit dem Blatt kommend.			

Prunus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
sinensis flore albo und roseo pleno , siehe <i>P. japonica</i> .			
spinosa flore pleno Hort. Sträucher	1.20	—	—
Schöne, gefülltblühende Form der gewöhnlichen Schlehe.			
» purpurea Hort. Sträucher	1.—	9.—	80.—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	2.—	18.—	150.—
Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens denselben			
Zierwert hat wie <i>Prunus Pissardi</i> . Von dichtem Bau, nicht so dornig			
als die Stammart. Blumen rosa.			
triflora Roxb. Sträucher 80—100 cm hoch	—70	—	—
Von kräftigem, ausgebreitetem Wuchs. Triebe dunkelbraun,			
Blatt verkehrt eiförmig gespitzt, hellgrün, runzlig, beim Austrieb			
hellbraun.			
triloba flore pleno Sträucher 1000 St. M. 450.—	—70	6.—	50.—
Höhe bis zur Krone 40—60 cm	1.—	9.—	—
» » » » 60—80 »	1.50	12.—	100.—
» » » » 80—100 »	2.—	18.—	150.—
» » » » 100—120 »	2.50	22.—	200.—
» » » » 120—140 »	3.—	—	—
Kleiner, hübscher Strauch mit gefüllten, rosafarbenen, kleinen,			
rosenähnlichen Blüten im April—Mai.			
» atrovirens flore pleno Hesse Sträucher	—80	7.—	60.—
Von straffem, aufrechtem Wuchs mit lackartiger, glänzend tief-			
grüner Belaubung und flachgebauten, gut gefüllten Blumen.			
virginiana L. Virginische Traubenkirsche.			
Pyramiden 150—200 cm hoch	1.—	9.—	80.—
» 200—250 » »	1.25	12.—	100.—
Bis 4 m hoher Strauch, in der Belaubung ähnlich <i>P. Padus</i> , mit			
weißen Blüten im Mai—Juni.			
Prunus , siehe auch Wildlinge.			
Ptelea L. Lederblume (Rutaceae).			
trifoliata L. Gemeine Lederblume. Sträucher	—70	6.—	50.—
Dichtbuschiger Strauch mit dreizähligen, dunkelgrünen Blättern.			
Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben,			
vorzügliches Vogelfuttergehölz.			
Pterocarya Kunth. Flügelnuss (Juglandaceae).			
laevigata Hort. Sträucher	1.50	12.—	—
Von flottem, aufrechtem Wuchs, mit kräftigem, rotbraunem Holze.			
Blatt bis 50 cm lang, 10—12 paarig.			
sorbifolia Sieb. & Zucc. (<i>P. rhoifolia Sieb. & Zucc.</i>)			
Sträucher 200—250 cm hoch	2.50	22.—	—
Mit schöngesiederter Belaubung, erreicht etwa 30 m Höhe. Liebt			
wie obige Art feuchten Niederungsboden. Hart.			
Pyracantha , siehe <i>Crataegus</i> .			
Quercus Linné. Eiche (Fagaceae).			
ambigua Michx. 80—100 cm hoch	5.—	—	—
Grosses, spitzlappiges Blatt.			
austriaca sempervirens Hort. (<i>Qu. Pseudo-Turneri Schneider.</i>)			
40—60 cm hoch	4.—	—	—
Wertvolle, schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen			
Winter behält. Wächst schön pyramidal.			
coccinea Wangenheim Pyramiden 150—200 cm hoch	2.50	—	—
Die tiefgelappten, schönen Blätter färben sich im Herbst pracht-			
voll scharlachrot und fallen spät. Der bis 30 m hohe Baum wächst			
noch sehr gut auf ziemlich trocknen Böden.			
imbricaria Michx. Schindeleiche 60—80 cm hoch	5.—	—	—
Längliche, etwas lederartige, aber sommergrüne Blätter. Der			
bis 20 m hoch werdende Baum liebt kräftigen, feuchten Boden.			
Libani Oliv. 60—80 cm hoch	5.—	—	—
Ganz harte und sehr seltene, halbimmergrüne Art.			
macranthera Fischer & Meyer 40—60 cm hoch	4.—	—	—
Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm langen und			
9 cm breiten, kerbzahnartig gelappten Blättern.			

Quercus (Fortsetzung):**macrophylla** *Alberti Hort.* 60—80 cm hoch

Pyramiden 100—120 » »

Die dunkelgrünen, oberseits glänzenden Blätter erreichen eine Länge von 40 cm und eine Breite von 20 cm.

mongolica *Fischer.* Mongolische Eiche 40—60 cm hoch

60—80 » »

Mit hellgraugrüner Belaubung. Erwächst zu kleinem Baum.

palustris *Münchh.* Sumpf-Scharlacheiche.

Hochstämme 10—12 cm Umfang

» 12—14 » »

Mit kleinen, tief fiederspaltigen Blättern, die sich im Herbst lebhaft rot färben.

pedunculata *Ehrhard* (*Q. Robur Smith*). Stieleiche. **B.**

Hochstämme 6—8 cm Umfang

» 8—10 » »

» 10—12 » »

» 12—14 » »

» 14—16 » »

Beliebter Alleebaum, bis 50 m hoch, ziemlich rasch wachsend.

Liebt tiefgründigen, feuchten Lehmboden.

» **argenteo-marginata** 60—80 cm hoch

Hübsch weiss gerandete Blätter.

» **Concordia Kirchn.** 40—60 cm hoch

Eine der schönsten Eichen mit vollständig goldgelben Blättern.

» **fastigiata Lamarck** (*Q. pyramidalis Gmel.*), Pyramiden-
eiche. Pyramiden 60—80 cm hoch

» 80—100 » »

» 100—120 » »

Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der Pyramidenpappel ähnlichem Wuchs.

» **fastigiata cupressoides Hort.** 80—100 cm hochDichtzweigige Pyramiden bildend, Blätter etwas schmaler als *Q. fastigiata*.» **fastigiata purpurea Klenert** 60—80 cm hoch

80—100 » »

Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 8—10 cm

Die jüngsten Triebe sind beim Austreiben braunrot und hält sich die Farbe längere Zeit hindurch, bis die Blätter nach und nach in ein dunkleres Grün übergehen.

» **grandifolia cucullata** 60—80 cm hoch

100—150 » »

Herrliche Form mit sehr grossen, glänzend dunkelgrünen, kappenförmigen Blättern.

» **heterophylla cucullata** 40—60 cm hoch

60—80 » »

Die feinzerteilten, schmalen Blätter sind am Rande nach unten gekrümmt.

» **maculata** 60—80 cm hoch

Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.

» **marmorata** Pyramiden 60—80 cm hoch

Belaubung schön gelb und weiss marmoriert.

» **nigricans Hort.** 60—80 cm hoch

Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.

» **pectinata Kirchn.** 60—80 cm hoch

Die hellgrünen Blätter sind kammartig eingeschnitten.

» **picta** 60—80 cm hoch

Die schönste bunte Eichenform. Die Färbung tritt namentlich im zweiten Triebe besonders hervor.

» **pyramidalis**, siehe *Q. fastigiata*.**Phellos latifolia Hort.** 100—120 cm hoch

120—150 » »

Breitblättrige Weideneiche, 10—20 m hoch werdend.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 1 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
5.—	—	—
6.—	—	—
4.—	—	—
5.—	—	—
8.—	—	—
10.—	—	—
4.—	35.—	—
5.—	45.—	400.—
6.—	55.—	500.—
7.—	65.—	—
8.—	—	—
5.—	—	—
4.—	—	—
4.—	38.—	350.—
5.—	48.—	450.—
6.—	58.—	—
5.—	48.—	—
4.—	—	—
5.—	48.—	—
8.—	—	—
5.—	48.—	—
7.—	65.—	—
4.—	38.—	—
5.—	48.—	—
5.—	—	—
5.—	—	—
5.—	48.—	—
5.—	48.—	—
8.—	75.—	—
10.—	—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Quercus (Fortsetzung):			
rubra L. Roteiche Hochstämme 8—10 cm Umfang Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben.	5.—	45.—	—
» aurea Hort. 80—100 cm hoch 150—200 » »	6.— 10.—	— —	— —
Eine Form der Roteiche mit schön gelbfarbigem Laub; üppig wachsend.			
» magnifica 60—80 cm hoch 80—100 » »	5.— 6.—	— —	— —
Sehr starkwachsende Form mit grosser, prächtig rotbraun aus- treibender Belaubung, die eine schöne Herbstfärbung annimmt.			
» Schrefeldi 80—100 cm hoch Belaubung sehr gross, ungleich und tief eingeschnitten.	6.—	—	—
Raphiolepis Lindley. Traubenapfel (Rosaceae).			
japonica Sieb & Zucc. mit Topfballen Immergrüner Strauch. Blatt ledrig, dunkelgrün. Blüte weiss, rispig oder einfach traubig, im Mai—Juni, stark orangenduftend. Frucht kugelig. Liebt guten, durchlässigen Boden in geschützter, warmer Lage. Leichter Winterschutz.	2.—	15.—	—
Rhamnus Miller. Faulbaum, Wegdorn (Rhamnaceae).			
cathartica L. Gemeiner Wegdorn. B. Strauch mit ovalen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Mai und Juni; Beeren erbsengross, schwarz.	—70	6.—	50.—
crenata Sieb & Zucc. Gekerbblättriger Faulbaum, bis 2 m hoch werdend.	1.50	—	—
dahurica Pall. mit Topfballen Bis 3 m hoch werdender Strauch mit hübschen, hellgrünen, bis 15 cm langen, lanzettlichen Blättern. Recht zierend.	2.—	—	—
Frangula L. Gemeiner Faulbaum. Sträucher 80—100 cm hoch. B. Hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren	—50	4.—	35.—
» asplenifolia Dipp. mit Topfballen Schöne Form mit feingeschlitzter Belaubung.	2.—	—	—
infectoria Linné Färberwegdorn. Sparriger Strauch mit elliptischen oder breit- elliptischen Blättern, der etwa 3 m Höhe erreicht.	1.—	—	—
Rhododendron Linné, Alpenrose (Ericaceae).			
Allbekannte und beliebte, immergrüne Ziersträucher, deren überreicher Blütenfior in die Frühjahrsmonate fällt und in allen Nuancen vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Purpurrot oder bis zum sattesten Violettblau variiert. Die nur mässig hoch werdenden Sträucher lieben einen frischen, sandigen Moorboden, Heide- oder Lauberde mit gutem Gartenboden und Kuddung vermisch, sonnige bis halbschattige Lage. Während des Triebes sind kräftige Dung- güsse von Vorteil. Verblühte Dolden sind sofort auszubrechen.			
arboresum- und Catawbiense-Hybriden, aus nachfolgenden, winterharten Sorten ausge- wählt, nach meiner Wahl:			
Pflanzen zum Treiben, mit Knospen	{ 30—40 cm hoch 40—50 » » 30—40 » » 40—50 » » 50—60 » » 30—40 » » 40—50 » » 50—60 » » 60—80 » »	4.— 5.— 3.50 4.50 5.50 3.— 4.— 5.— 6.—	35.— 45.— 30.— 40.— 50.— 25.— 35.— 45.— 55.—
Freilandpflanzen, mit Knospen			300.— 400.— 250.— 350.— 450.— 200.— 300.— 400.— 500.—
Cunninghami, mit Knospen			
Catawbiense grandiflorum, Solitärpflanzen, voll Knospen	140—160 cm hoch 160—180 » »	30.— 40.—	— —

Rhododendron arboreum - Hybriden.

Sorten zum Treiben und für das freie Land.

- Alexander Adie.**
Hellkirschrot mit schwarzen Punkten.
- Ascot brillant.**
Grossdoldig, leuchtend blutrot.
- atrococcineum.**
Dunkelscharlach.
- atrosanguineum.**
Dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt.
- Auguste van Geert.**
Hellviolettrosa, braun gefleckt, extra grosse, Treibsorte.
- Blandianum.**
Prächtig karminrosa Blüten.
- Boule de Neige.**
Reinweiss, ausgezeichnet zum Treiben, früh.
- Bride of Apios.**
Lilarosa.
- Bylsianum.**
Blüten lebhaft rosa mit weissem Zentrum
- Charles Noble.**
Rosenrot mit gelber Zeichnung.
- Comte de Gomer.**
Weiss, karmin bordiert.
- Cunninghami.**
Beste, frühblühende weisse.
- Cynthia.**
Grossblumig, rosakarmin.
- Francis Dickson.**
Scharlach, spätblühend.
- Gabriele Liebig.**
Rosaweiss.
- Illuminata.**
Lebhaft rosalila, grosse Dolden.
- Jewess.**
Zart bläulichlila, rosa getönt mit gelblichroter Zeichnung.
- John Walter.**
Fein kirschrot, schönes Bukett.
- Käte Waterer.**
Prächtig frischrosa, spät.

- Lady Eleonore Cathcart.**
Lebhaft rosa, lange, schmale, schwarze Flecke.
- limbatum.**
Hellrosa, karmin eingefasst.
- Lord Clyde.**
Dunkelblutrot.
- Mad. Carvalho.**
Weiss, grünlichbraun gefleckt, spät.
- Michaël Waterer.**
Lackrot, schwarz punktiert, spät.
- Minnie.**
Gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat.
- Mrs. Holford.**
Rot, in Lachsrot übergehend.
- Mrs. John Waterer.**
Karminrosa, Zentrum heller, spät.
- Nero.**
Gross, dunkelpurpur.
- Nirens.**
Helllila.
- Pink Pearl (Rote Perle).**
Grosse, fleischfarbige Blumen, Dolden v. 30–35 cm Durchmesser.
- Prince Camille de Rohan.**
Weiss inkarnat, rosa gerandet.
- Rubens.**
Helllila mit gelben Flecken.
- rubescens.**
Leuchtend weinrot, im Zentrum dunkelrot, mit Zeichnung, niedrig.
- Sir Charles Buttler.**
Rosaweiss, Knospe leicht lila, sehr grossblumig und wohlriechend.
- The Queen.**
Inkarnat, in Reinweiss übergehend.
- The Warrior.**
Rosakarmin.
- William Austin.**
Purpur, feuerrot erhellt.

Rhododendron.

- Catawbiense.**
Lila, spät.
- » **album.**
Weissblühende Form der vorigen.
- » **album elegans.**
Weiss, zartlila angehaucht.
- » **Everestianum.**
Hellviolettrosa, spät.

- Catawbiense fastuosum flore pleno.**
Gefüllt lila.
- » **grandiflorum.**
Sehr grossblumig, lila.
- » **purpureum grandiflorum.**
Purpurn, grossblumig.

Catawbiense-Hybriden.

- Adalbert.**
Leuchtend rot mit Zeichnung.
- Adam.**
Fleischfarbig mit Zeichnung.
- Adolf.**
Helllilarosa.
- Agnes.**
Karminlilarot mit dunklem Fleck, grosse Blume.
- Alarich.**
Karmesin mit dunkler Zeichnung.

- Albert.**
Zartlila mit kirschroter Zeichnung.
- Albin.**
Frisch karminrosa, gekräuselt.
- Alfred.**
Violett, gekräuselt, sehr schön.
- Allah.**
Karminrosa mit weisslichem Anflug.
- Alma.**
Lilarosa.

Rhododendron Catawbiense-Hybriden (Fortsetzung).

- Anita.** Lilarosa.
- Anna.** Hellviolett, gekräuselt, reichblühend.
- Annedore.** Rot mit weissem Schlund, sehr schön.
- Anton.** Violett mit dunklem Rande.
- Arnim.** Purpurrot.
- Arno.** Blasslila mit roter Zeichnung.
- Aster.** Blasslilarosa.
- Attila.** Violettrosa.
- August.** Dunkelrosa mit roter Zeichnung.
- Bast.** Blasslila.
- Blanka.** Rosa.
- Bibber.** Leuchtend karminrot.
- Botha.** Lilarosa, gekräuselt.
- Caesar.** Zartrosa, fast weiss, mit rötlicher Zeichnung.
- Camilla.** Rosa, gekräuselt.
- Caractacus.** Lebhaft purpurkarmin.
- Carmen.** Karminrosa mit orange Zeichnung.
- Carola.** Karminrosa mit ocker Zeichnung.
- Catilina.** Lilarosa, mit dunklem Rand und Zeichnung.
- Cato.** Weiss mit zartrosa.
- Charles Dickens.** Dunkelrot.
- Christian.** Blassrosa mit rötlicher Zeichnung.
- Cicero.** Leuchtend dunkelrosa mit feuriger Zeichnung.
- Cosel.** Hellrosalila, Rand dunkler.
- Cosima.** Rosa, gekräuselt mit gelber Zeichnung.
- Dämon.** Pfirsichblütenfarbig mit ockergelber Zeichnung.
- Daisy.** Hellkarminrot mit gelber Zeichnung, gekräuselt.
- Daniel.** Dunkelkarminrot mit grünlicher Zeichnung, gekräuselt.
- Daphne.** Weiss mit gelbem Spiegel.
- Darius.** Dunkelrosa mit gelber Zeichnung.
- Delphi.** Karminrot, dunkle Zeichnung auf hellem Grunde.
- Der Sieger.**
- Desiderius.** Leuchtend karminrot mit hellem Schlunde.
- Dollar.** Hellviolett mit brauner Zeichnung auf hellem Grunde.
- Dolly.** Hellkarminrot mit brauner Zeichnung.
- Donar.** Hellkarmesinrot mit dunkelroter Zeichnung.
- Doria.** Lachsfarbig rosa mit gelber Zeichnung.
- Drache.** Blassrosa, pfirsichblütenähnlich mit gelber Zeichnung.
- Drusus.** Leuchtend karminrot mit hellem Schlund.
- Dürer.** Purpurrot.
- Echse.** Dunkelrosa mit rotbrauner Zeichnung.
- Edde.** Zartrosa mit gelbem Spiegel.
- Effner.** Dunkelviolet mit grüner Zeichnung.
- Eidam.** Weiss mit grünlicher Zeichnung.
- Ella.** Karminrot.
- Emil.** Weisslich rosa mit gelber Zeichnung.
- Emma.** Leuchtend karmesinrot mit dunkler Zeichnung auf hellem Grunde.
- Etzel.** Zartrosa mit hellgrüner Zeichnung.
- Eva.** Lebhaft hellrosa, mit dunklem Rande und grünlicher Zeichnung.
- Farnese.** Weiss mit schwach lila Anflug.
- Fichte.** Leuchtend dunkelrosa, stark gekräuselt.
- Figaro.** Lebhaft rot.
- Franz.** Lebhaft rot.
- Frau von Wolfersdorff.** Karminrosa mit lila Anflug und ockergelber Zeichnung.
- Genoveva.** Weiss mit zartlila Anflug und grüner Zeichnung.
- Gertrud.** Leuchtend karminrot mit starker, dunkler Zeichnung.
- Gloria gandavensis.** Blassrosa.
- Goethe.** Hellkarmesinrosa, von grosser Dauer.
- Granat.** Leuchtend karminrot, etwas gekräuselt.
- Gudehus.** Hellrosa, rötliche Zeichnung auf weissem Grunde, gekräuselt.

Rhododendron-Catawbiense-Hybriden (Fortsetzung).

Gudrun.	Reinweiss mit brauner Zeichnung.
Helmholz.	Schönes Dunkelrosa, fast ohne Zeichnung.
Hermann.	Hellkarminrot, sehr schön.
Herme.	Zartblassrosa mit lila Rand.
Hero.	Weiss mit gelber Zeichnung, sehr schön.
Holbein.	Dunkelkarminrosa, sehr schön.
Holger.	Blassviolett mit starker, dunkler Zeichnung.
Holtei.	Karmesinrot mit weissem Schlund und hellen Strahlen.
Holten.	Karminrosa, gekräuselt.
Homer.	Lebhaft reinrosa, grosser Stutz.
Humboldt.	Blassrosa mit brauner Zeichnung.

Hymen.	Hellviolett mit weissem Schlund.
Ibing.	Lebhaft karminrot, heller Schlund.
Kettledrum.	Rötlichpurpurn.
Kleist.	Leuchtend karminrosa mit gelber Zeichnung.
Kunz.	Feurig hellkarminrot mit wenig Zeichnung.
Lady Armstrong.	Hellrosa getupfelt.
Liddy.	Rosarot mit dunkler Zeichnung.
Mirabella.	Rot.
Moses.	Violett.
Oldewig.	Rot.
Viola.	Weiss mit Zeichnung, mittelfrüh.

Rhododendron caucasicum hybridum.**Ganz winterharte, niedrigbleibende Hybriden.**

Pflanzen 30—40 cm hoch pro St. M. 5.—, 10 St. M. 45.—.

Calliope.	Rosa, in Weiss übergehend.	Melpomene.	Glänzend zartrosa, breit karmesin gefleckt.
Diane.	Weiss.	Mnemosyne.	Sehr gross, karminrosa, alle Petalen gefleckt.
Euterpe.	Stark gefleckt, kirschrot.	Terpsichore.	Zart hellatlasrosa, karmesin gefleckt.

Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:

Siehe auch „Azalea“.

ambiguum Hems. 40—50 cm hoch
 Wilsonsche Einführung. Strauch dicht verzweigt. Belaubung langelliptisch, bis 8:2½ cm gross, oberseits sattgrün, unterseits grau mit gelben bis braunen Schilfern. Blüte breitglockig, bis 5 cm breit, von schöner, gelber Färbung.

Aucklandii Hook. 30—40 cm hoch
 Strauch mit dicken, braunroten Zweigen. Blatt sehr derb, etwa 20:8 cm lang, oberseits sattgrün, unterseits gelbgrau. Blüte weiss, in wenigblütigen Dolden im Mai—Juni.

barbatum carneum 15—20 cm hoch
 Herrliche, grosse, fleischfarbige Blume. Erreicht etwa 30—35 cm Höhe. Blätter sind am Grunde behaart und daselbst stark klebrig.

californicum Hooker 40—50 cm hoch
 Vielblumige Dolden im Mai, locker gebaut, Blüte lebhaft rosarot, am Rande tiefer mit braungelber Zeichnung am oberen Abschnitt, Blütenstiele 3—4 cm, rot, Kelch kaum entwickelt. Blumenkrone breittrichtig, fast flach ausgebreitet, 3:5½ cm gross, bis zur Mitte eingeschnitten, Abschnitte oval, schön gewellt. Heimat Kalifornien.

campanulatum G. Don., Glockenblütige Alpenrose
 mit Topfballen
 Gedrungen wachsender Strauch mit dunkelgrünen, dicklederartigen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslilafarbenen Blüten im Juni.

Davidi Franch mit Topfballen
 Blätter derb lederig, oblong-lanzettlich, Blüten lila mit purpurnen Punkten, 4—5 cm lang. April-Mai. Eigenartige und wertvolle Art.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 10 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
5.—	—	—
4.—	—	—
3.—	—	—
6.—	—	—
3.—	—	—
3.—	—	—

Rhododendron (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Fortunei Ldl. mit Topfballen Erwächst zu einem hohen Strauch vom Aussehen des <i>R. Aucklandi</i> , Blüte hellviolett.	3.—	—	—
Govenianum Sweet. 30—40 cm hoch Kreuzung zwischen <i>Rh. catawbiense</i> und <i>nudiflorum</i> . Stutz dicht- blütig, Blumenkrone trichterig, 3:4 cm, bis über die Mitte tief ein- geschnitten. Abschnitte lang oval, mässig ausgebreitet. Färbung lebhafte violettrosa, innen heller. Staubfäden blütenfarbig.	5.—	—	—
imbricatum Hort. (wahrscheinlich <i>R. ponticum imbricatum</i>) mit Topfballen Die glänzend dunkelgrünen Blätter liegen dachziegelförmig über- einander. Die verhältnismässig grossen Dolden sind aus schönen, dunkelblauen Blumen zusammengesetzt.	3.—	—	—
insigne Hemsl. & Wils. mit Topfballen Busch etwa 1,5 m hoch, Zweige dick, gerade, Blätter stark lederig, länglich-lanzettlich, 9—13 cm lang auf 3—5 cm Breite. Blüten zu 8 oder mehr, glockig, breit 5lappig, hell- bis dunkelrosenrot.	3.—	—	—
Königin Carola Hort. mit Topfballen Hybride von <i>R. argenteum</i> . Blatt gross, dichtstehend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten in dichten Dolden, lila bis violett, Mai—Juni.	3.—	—	—
Luscombei Watson 40—50 cm hoch Grosse, rosa Blumen mit herrlichem Duft. Rand und Rückseite dunkler. Mit dunklen Adern und blutroter Zeichnung.	6.—	—	—
maximum L. 30—40 cm hoch 40—50 „ „ Sie ist die härteste aller Alpenrosen, wird bis 4 m hoch und ist Ende Juli bis Mitte August mit grossen, weissen, in verschiedene Rosenschattierungen übergehende Blumen überladen.	3.50 4.50	30.— 40.—	— 350.—
Metternichi pentamerum Max. Mit langen, schmalen, nach unten zurückgerollten Blättern. Blü- ten rosefärbig, 5lappig. Erblühen Mai—Juni.	5.—	—	—
Mrs. Gill 20—30 cm hoch Schöne, grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	3.—	—	—
Nobleanum Ldl. 30—40 cm hoch Die feinen, dunkelrosafarbenen Blüten erblühen sehr früh. Be- laubung gross, oberseits mattgrün, unterseits fast glänzend gelb- lichbraun. Triebe rötlich. Wuchs breit.	4.—	—	—
oreodoxum Franchet Solitärpflanzen 100—120 cm hoch „ 120—140 „ „ „ 140—160 „ „ Strauch kräftig aufrechtwachsend, mit jugendlich borstig behaa- ren Trieben. Blatt mittelgross, langelliptisch, oberseits sattgrün, unterseits weisslichgrün. Blüte rosafarbig.	25.— 30.— 35.—	— — —	— — —
ponticum album Hort. 40—50 cm hoch Weiss mit gelbem Fleck.	4.—	35.—	—
praecox Carr. (Early Gem) 20—30 „ „ 30—40 „ „ Bildet gedrängene Büsche, dicht mit ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, bläulichkarminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch.	3.50 4.50	30.— 40.—	— —
punctatum Andrews. Punktierblättrige Alpenrose 20 30 cm hoch Erreicht ca. 1 m Höhe. Blätter elliptisch, 4—6 cm lang, hell- grün an braunroten Trieben. Blumen trichterförmig, rosa, 3—4 cm breit. Blütezeit: Mai—Juni.	3.50	—	—
Rosamundi Hort. 30—40 cm hoch Niedrig bleibende, sehr früh blühende Form. Blumen rosa, in weiss übergehend.	4.—	—	—
Searsiae, Rehd. et Wils. 30—40 cm hoch Gut wachsender Strauch mit roten, gelblich beschilferten Trieben. Blätter lanzettlich, oberseits glänzend sattgrün, unterseits silbrig- weiss. Blüte mittelgross, in lockeren Ständen im Mai, von schöner, hell lilavioletter Färbung.	4.—	—	—
Smirnowii Trautvetter mit Topfballen Schöne, winterharte Art, die bis 3 m hoch wird. Blätter keil- förmig-länglich, graugrün, unterseits filzig. Die grossen, zart rosa- farbenen Blüten erscheinen im Mai—Juni.	3.—	—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Rhododendron (Fortsetzung):			
Wallichii 20—30 cm hoch Blumen schön dunkellila mit hellem Auge.	3.—	—	—
White Gem 30—40 » » Schöne Varietät mit dunkelgrünen Blättern und grossen Dolden weisser Blüten.	4.—	—	—
Rhodora L. (Ericaceae).			
canadensis L. (Rhododendron canadense Zbl.) Kanadische Felsenrose 30—40 cm hoch 40—50 » »	5.— 6.—	45.— 55.—	— —
½ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schön violettrosa gefärbte Blüten hervorbringt, die bis zu 5—6 gebüschelt stehen.			
Rhodotypus Sieb. & Zucc. (Rosaceae).			
kerrioides Sieb & Zucc. Scheinkerrie Schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung und grossen, schneeweissen Blüten, die im Mai erscheinen. Wächst in jedem guten Gartenboden.	1.—	8.—	—
Rhus Linné. Sumach (Anacardiaceae).			
Toxicodendron radicans L. Giftsumach Ein auf dem Boden kriechender oder an Mauern und Bäumen hochkletternder Strauch mit kleinen, in den Blattachseln stehenden Blütenbüscheln, die im Mai oder Juni erscheinen. Die dreigeteilten Blätter sind je 12—13 cm lang und bis 9 cm breit, länglich oval, ganzrandig.	1.50	—	—
typhina L. Hirschkolbensumach, Straucher 100—150 cm hoch » 150—180 » »	1.50 2.—	— —	— —
Baum mit bis 50 cm langen, 10—13jochigen, glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen, karmesinroten Fruchtstände.			
Ribes L. Stachelbeere, Johannisbeere (Saxifragaceae).			
alpinum L. Alpenjohannisbeere Straucher 50— 70 cm hoch, 1000 St. M. 300.— » 70—100 » » 1000 » » 350.—	—50 —60	4.— 5.—	35.— 40.—
Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlich- weissen Blüten im April. Schattenstrauch.			
bracteosum var. fuscescens Jancz. Fünflappige Form von R. bracteosum, mit leicht gebogenen Blüten- trauben brauner Blüten.	—80	—	—
Culverwelli Macfarlane Eine Art die durch Kreuzung mit Ribes nigrum und R. grossularia entstanden ist.	—80	—	—
cuneatum Kar. & Kir. Niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	—80	—	—
floridum L'Herit (R. americanum Mill.) Blüht reich in gelblichweissen Trauben im April—Mai.	—60	5.—	45.—
glaciale Wallich Ziemlich frühliebender Strauch, im Habitus an R. alpinum erinnernd. Junge Triebe rot, Blätter ziemlich klein, Blüten rötlich- kastanienbraun.	—80	—	—
Gordonianum Lem. (R. aureum × sanguineum) Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen, orange Trauben blüht. Sehr hübscher Zierstrauch.	—80	7.—	—
Grossularia L., B. Meterhoher Strauch, 3—5lappige, ziemlich kleine Blätter, kleine, verwachsen rote Blüten, meist zu zweien. Für undurchdringliche Hecken geeignet.	—50	4.—	30.—
intermedium Tausch (R. floridum × nigrum) Blüht weisslich im Mai in 8—10blütigen Trauben.	—50	4.—	—
laurifolium Jancz. mit Topfballen Prächtige, niedrige, immergrüne Art mit ovaler, derber, dunkel- grüner, rötlich getönter Belaubung, Blüten hell grünlichgelb in viel- blumigen, langen, hängenden Trauben. Winterschutz.	1.50	—	—
nevadense Kell. Bis 2 m hoher Strauch mit mittelgrossen Blättern, 3—5lappig. Blüten Trauben 12—20blütig, meist leicht aufwärtsgerichtet, rosenrote Glöckchen tragend.	1.—	—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
Ribes (Fortsetzung):			
<i>nigrum aconitifolium</i> Kirchner. Eisenhutblättrige Johannisbeere	— .80	—	—
<i>oxyacanthoides</i> L. Weissdornähnliche Stachelbeere.....	— .60	5.—	—
Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, 5lappig, mit kerb- zahnigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren blaurot.			
<i>sanguineum</i> Pursh. Rotblühende Johannisbeere	— .50	4.—	35.—
Blüthenrauben blutrot, reichblühend von Anfang April an.			
» <i>carneum</i> Benth. (R. glutinosum Benth.)	— .50	4.—	35.—
Die langen, fleischfarbigen bis rosaroten Blüthenrauben erblühen im April.			
» <i>grandiflorum</i> Hort.	— .60	5.—	45.—
Grossblumige, blutrote Form, in Farbe R. sanguineum ähnlich, jedoch Blumen bedeutend grösser.			
» <i>plenum</i> Hort.	— .60	5.—	40.—
Gefülltblühende Spielart mit dunkelroten Blüten.			
<i>saxatile</i> Pall.	— .80	—	—
Belaubung ähnlich R. alpinum, auch von ähnlichem Wuchs. Blüht im April in grünlichgelben Trauben.			
<i>Schlechtendahlia</i> Lange	— .80	—	—
Blüht in 3—4 cm langen, 10—12blütigen, aufrechten, bis über- hängenden Trauben, 3 mm gestielt, 4 mm Durchmesser von bräunlicher Färbung auf gelblichgrünem Grunde.			
<i>subvestitum</i> Hk.	— .80	7.—	—
Ähnlich R. Menziesi, doch Blütenblätter weiss statt rosa. Blume viel kürzer, Kelch und Stiel glatt.			
<i>Valdivianum</i> Philippi	— .80	—	—
Gut 3 m hoch werdender Strauch, 6×5 1/2 cm grosse Blätter, bis 7 cm lange, hängende Blüthenrauben, bis 40 Blüten tragend, gelblich, glockig.			
Robinia L. Robinie, Akazie (Leguminosae).			
<i>hispida</i> L. Borstige Robinie. Büsche 60— 80 cm hoch	1.50	12.—	100.—
» 80—100 » »	1.75	15.—	120.—
Höhe bis zur Krone 120—140 »	2.50	—	—
» » » 140—160 »	3.—	—	—
Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot, steifborstig- behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten stehen in lockeren Trauben. Blütezeit von Mai bis Sommer.			
Holdtii Britzensis Späth (R. neomexicana × Pseudacacia).			
Pyramiden 150—180 cm hoch	2.—	18.—	—
Die Blüthenrauben sind lockerer und länger als die der Robinia neomexicana, auch ist die Blütenfarbe heller.			
<i>neomexicana</i> Asa Gray, B. ... Pyramiden 120—150 cm hoch	1.50	12.—	—
» 150—200 » »	2.—	18.—	150.—
Prächtige, rotblühende Art mit lilrosafarbenen, in aufrechten, gedrungenen Trauben stehenden Blüten. Dieselben erscheinen von Mitte Juni bis Mitte September.			
Pseudacacia Decaisneana Carr. B.			
Pyramiden 150—200 cm hoch	2.—	18.—	150.—
Starkwachsend, mit blassrosa oder fleischroten Blüten.			
Rosa , siehe Abteilung „Rosen“.			
Rosmarinus Linné (Labiatae).			
<i>officinalis</i> L. Gemeiner Rosmarin mit Topfballen	2.—	—	—
Immergrün, dicht verzweigter und beblätterter Strauch, der in rauhen Gegenden während des Winters der Bedeckung bedarf. Liebt sonnige, trockne Lage. Blüht April—Mai.			
Rubus L. Himbeere, Brombeere (Rosaceae).			
<i>chroosepalus</i> Focke. mit Topfballen	2.—	—	—
Starkwachsend, mit rötlichen, hakenstacheligen, borstigen Trieben. Das tiefgrohe Blatt sieht einem Lindenblatt täuschend ähnlich; Stiel bewehrt. Blütenstand sehr gross, grünlich; Frucht schwarz.			
<i>deliciosus</i> Torr.	1.50	—	—
Grosse, dreilappige, hellgrüne Blätter an lebhaft roten Trieben. Die bis 5 cm breiten, reinweissen Blumen erscheinen im Mai sehr reichlich. Sehr wertvoller, bis 1 1/2 m hoch werdender Zierstrauch.			

Rubus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Dreyeri Hort.	1.50	—	—
Ziemlich stark wachsender, dem <i>R. fruticosus</i> im Aussehen sehr ähnlicher Kletter.			
fruticosus albus plenus 100—150 cm hoch	1.—	—	—
Sehr starkwachsend. Bringt von Ende Juni bis in den August hinein einen reichen Flor schneeweisser, gefüllter Blumen.			
» roseus plenus 100—150 cm hoch	1.—	8.—	—
150—200 » »			
Blumen gefüllt, rosa.			
» ruber plenus 100—120 » »	1.—	—	—
Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.			
Giraldianus Focke mit Topfballen	2.50	—	—
Kräftiger Strauch mit weissen Ästen und überhängendem Wuchs. Blüten in endständigen Trauben, Einzelblüten klein, rötlich. Frucht schwarz.			
Henryi Hemsl. mit Topfballen	2.50	—	—
Eine ganz harte, immergrüne Art von hübsch rankendem Wuchs. Blätter an manchen Zweigen lanzettlich, nach oben zugespitzt, bis 12 cm lang und bis 2½ cm breit, oftmals dreilappig, jedoch nicht bis zum Grunde geteilt, oberseits matt gelblichgrün, unterseits gelbfilzig. Zweige ganz glatt, unbewehrt, von hellgrüner Farbe. Von <i>Rubus bambusarum</i> ganz verschieden.			
illecebrosus (R. fraxinifolius)	1.—	8.—	—
Hübsch belaubter Strauch, sehr zierend durch die grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, korallenroten Beeren.			
lasiostylus Focke 60—80 cm hoch	2.—	—	—
Sehr empfehlenswerter, weissbereifter Zierstrauch, der ziemlich grosse Früchte von grauroter Farbe bringt. Wuchs aufrecht.			
leucodermis Dougl. mit Topfballen	2.—	—	—
Weissästige Himbeere. Zweige reich bestachelt, Blätter glänzend. Weissblühend. Früchte halbkugelig, bereift, schwarz und süss.			
<i>nepalensis</i> , siehe <i>R. spectabilis</i> .			
odoratus L. Wohlriechender Himbeerstrauch	— 60	5.—	40.—
Grosse, 3—5lappige, lebhaft grüne, unterseits dicht weichbehaarte Blätter. Blüten hellpurpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst.			
<i>phoenicolasius</i> , siehe Brombeeren.			
polytrichus Franch. mit Topfballen	2.—	—	—
Strauch klein, niederliegend, stachelborstig, mit oberseits sattgrüner Belaubung, unterseits weissfilzig. Zweige rötlich behaart. Blüte weiss, Frucht hellrot, wohlgeschmeckend.			
spectabilis Pursh. (R. nepalensis Hort.)	1.—	—	—
Eine schöne, amerikanische Art mit frischgrüner Belaubung, die Ende April schöne, karminfarbene, bis 2½ cm breite Blumen bringt.			
thyrsiger Banning et Focke 100—150 cm hoch	2.—	—	—
Salix Linné. Weide. (Siehe auch Trauerbäume.) (Salicaceae.)			
alba L. var. Casteriana, Casterianer Silberweide, B.	— 50	4.—	—
Coopers rote Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.			
» splendens (S. regalis) And., Königsweide, B.	— 50	4.—	35.—
Mit silberfarbener, seidenartig glänzender Belaubung.			
» vitellina aurea, Hort., B.	— 50	4.—	—
Mit lebhaft gelbrotem Holz.			
» vitellina Britzensis Spaeth, B.	— 50	4.—	35.—
Das einjährige Holz ist im Winter leuchtend rot gefärbt.			
amygdaloides Dode. Pfirsichweide	— 50	4.—	—
Baum bis über 15 m hoch. Blätter lang zugespitzt, eiförmlich, unten schön blaugrau, Kätzchen locker an beblätterten Trieben.			
Braune Weide von Fergana	— 50	4.—	—
Neue Weide aus Zentralasien.			
candida Flügge. Weissblättrige Weide, B.	— 50	4.—	—
Die schmallanzettlichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Wird 1—2 m hoch.			
caprea L.	— 50	4.—	—
Frühe, dicke, runde, graue Kätzchen, voll aufgeblüht goldgelb im zeitigen Frühjahr. Wird baumartig.			

Salix (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
<i>caroliniana Michaux</i> (S. nigra Marsh.)	— 50	4.—	—
Schwarzweide. Blätter beiderseits grün, fein gesägt.			
<i>cinerea L.</i> Aschweide, B.	— 50	4.—	35.—
» <i>tricolor C. Koch</i> (S. caprea tricolor Hort.)	— 60	5.—	—
Schöne, buntblättrige Varietät.			
<i>coccinea</i> (S. kermesina). Feuerrote Silberweide, B.	— 50	4.—	35.—
Für Gärten sehrzierender Strauch.			
<i>cotinifolia Horst.</i>	— 50	4.—	—
Perückenbaumbblättrige Negerweide. Eine der interessantesten			
Weiden. Blätter kreisrund wie die des <i>Rhus Cotinus</i> .			
<i>elegantissima K. Koch, B.</i>	— 50	4.—	—
Eine sehr schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.			
<i>Hankensoni Dode.</i>	— 50	4.—	—
Aus dem nördlichen Amerika vermutlich eine Hybride zwischen			
S. babylonica und nigra. Blätter sehr lang geschwänzt, bis 13 cm			
lang und 2 cm breit, tief drüsig gesägt, kahl, unterseits blaugrau.			
<i>hippophaefolia Thuill.</i> (S. amygdalina × viminalis)	— 50	4.—	—
<i>lispoclados Dode.</i>	— 50	4.—	35.—
Kleiner, aufrecht verzweigter Strauch mit glänzenden, geröteten			
Zweigen. Blätter oberseits glänzend grün, unterseits weissblau.			
<i>Lou cheou</i>	— 50	4.—	—
Chinesischer Name einer Weide der Mandschurei.			
<i>magnifica Hemsl, B.</i>	1.50	12.—	—
Hervorragend schöne und seltene Weide von starkem Wuchs			
mit aussergewöhnlich grossen Blättern und Kätzchen.			
<i>Medemii Boiss.</i>	— 50	4.—	—
Orientalische Salweide, schöner als S. caprea, aber für wärmere			
Lagen.			
<i>Muscina, B.</i>	— 50	4.—	35.—
Holz sehr dunkelgrün. Sehr schöne Kätzchenbildung. Dicht			
zusammenstehend und mittelgross, silbergrau, mit leicht gelblichem			
Schein.			
<i>phylicifolia</i>	— 50	4.—	—
Gebirgsweide aus Zentralfrankreich.			
<i>pischpekensis</i>	— 50	4.—	—
Längliche, schmalzylindrische, grünlichgraue Kätzchen, oben			
abgestumpft, Holz frisch grün.			
<i>pontederana, männlich, B.</i>	— 50	4.—	—
Bisher nur weiblich bekannt. Botanische Neuheit. Schöne			
Kätzchenweide.			
<i>pulchra W. & K.</i> Kaspische Blutweide, B. (S. daphnoides.)	— 50	4.—	—
Wegen ihrer Schönheit und Üppigkeit sehr zu empfehlen.			
» <i>ruberrima, B.</i>	— 60	5.—	40.—
Noch schöner und wertvoller als die Art. Sehr grosse Kätzchen,			
prächtig glänzendrotes Holz.			
<i>Rehderana Schneider.</i>	— 50	4.—	—
Neue chinesische Weide.			
<i>rosmarinifolia L.</i> Rosmarinweide. Sträucher, B.	1.—	8.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	—	—
» » » 140—160 »	2.50	24.—	—
Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.			
<i>rotundifolia Trautvetter.</i> Rundblättrige Weide, B. (S. Schrader-			
iana Willd. = S. bicolor × repens.)	— 50	4.—	—
<i>tenuifolia</i>	— 50	—	—
(Blaue Weide des Flusses Ili.			
Salix in Sorten 100 St. M. 35.—, 1000 St. M. 300.—.			
Sambucus L. Holunder (Caprifoliaceae).			
<i>canadensis acutiloba Rehder</i>	— 70	6.—	—
Schöne Abart mit geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe.			
» <i>fructu viride</i>	— 60	5.—	45.—
Starkwachsende Form. Früchte grünlich bleibend.			
» <i>lutea</i>	— 60	5.—	45.—
Mit lebhaft goldgelber Belaubung.			
» <i>maxima Hesse</i>	— 70	6.—	50.—
Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis 1/2 m im			
Durchmesser haltende Blütendolden bringt. Starkwachsend.			

Sambucus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ebulus L. Zwergholunder	—50	4.—	30.—
Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot im Juli—August.			
melanocarpa Asa Gray (S. <i>californica Hort.</i>)	—60	5.—	45.—
2—4 m hoher Strauch, der im Juli und August blüht. Beeren glänzend schwarz.			
nigra L. Gemeiner Holunder	—50	4.—	35.—
Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpfanzung zu empfehlen.			
» argenteo-marginata	—70	6.—	—
Blätter schön weiss gerandet.			
» fructu albo	—60	5.—	—
Weissfrüchtig.			
» » albo pellucido	—60	—	—
» » luteo	—60	5.—	45.—
Gelbfrüchtig.			
» laciniata L.	—60	5.—	45.—
Feingeschlitzte Belaubung, sehrzierend.			
» latisecta Hesse	—60	5.—	45.—
Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern.			
» leucocarpa Hayne	—60	5.—	—
Schon sehr lange bekannte Form mit hellgrünen Trieben und Blättern. Früchte hellgrün mit weisslichen Längsstreifen, bei voller Reife durchscheinend.			
» lutea , siehe <i>S. canadensis lutea</i> .			
» nana bicolor Hesse	1.—	—	—
Zwergstrauch mit weissbestäubten Blättern.			
» pyramidalis Lavallée	1.—	—	—
Schmal pyramidal wachsende Form.			
» rosea plena	—60	5.—	45.—
Blüten rossagefüllt.			
racemosa arborescens Torr. & Gray	—60	5.—	—
Hochwachsende Form mit scharfgesägten Blättchen.			
» aurea Hort.	—80	7.—	—
Schöne, gelbblättrige Form.			

Sambucus racemosa Hessei Hesse. Neu.

Diese neue Form ist bereits in den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 1921 S. 328 erwähnt, jedoch irrtümlich unter der falschen Bezeichnung „S. nigra Hessei“. Es handelt sich jedoch um eine Form von *S. racemosa*, die von allen Holunderformen abweicht. Die etwas blasig aufgetriebenen Blätter sind oberseits lackgrün, nicht gelappt und gezähnt, sondern an den Rändern nur leicht gewellt. Teilweise sind die Blättchen rein bandförmig bis 12 cm lang und 1 cm breit, während andere bis 2 cm breit sind und in eine lange Spitze auslaufen. Eine wertvolle und interessante Bereicherung der *Sambucus*-formen, die besonders durch die verschieden gestaltete Blattbildung ins Auge fällt.

2.50 — —

Sarcococca Ldl. (Buxaceae).

humilis Stapf	30—40 cm hoch mit Topfballen	2.—	18.—	—
Kleiner, immergrüner Strauch. Belaubung ledrig, länglich, glänzend gelblichgrün. Für Felsenanlagen. Warmer Standort.				
pruniformis Ldl.	mit Topfballen	2.—	18.—	—
Kleiner, aufrechtwachsender, immergrüner Strauch mit hell- grünen Trieben und lanzettlichen, dicken, glänzend sattgrünen Blät- tern. Blüten in ährigen Köpfchen, achselständig. Warmer Standort.				
ruscifolia Stapf	30—40 cm hoch mit Topfballen	2.—	18.—	—
Kleiner, immergrüner Schattenstrauch mit ruscusähnlicher Be- laubung.				

Schizandra, siehe Schlingpflanzen.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Securinega Jussieu. Hartholz (Euphorbiaceae).			
<i>ramiflora J. Müll.</i>	1.50	14.—	—
Feinzweigiger und hellgrün belaubter Strauch, der im August zahlreiche Büschel kleiner, weisslicher Blüten bringt.			
Skimmia Thunb. Skimmie.			
<i>Foremani Mast.</i> mit Topfballen	2.—	15.—	—
Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Den zahlreichen, weissen Blüten folgen rote Früchte.			
<i>japonica Veitchi Rehd.</i> mit Topfballen 20—30 cm hoch	2.—	15.—	—
Eine hübsche Form mit länglicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüten im Mai, weiss.			
<i>Rodgersi Mast.</i> mit Topfballen	1.50	12.—	—
Mit breiten Blättern und roten Früchten.			
<i>rubella Carr.</i> mit Topfballen 20—30 cm hoch	2.—	15.—	—
Art mit rosa angehauchten Blumen, niedrig bleibend.			
Sorbaria (Seringe) A. Braun, Fieder-Spierstrauch (Rosaceae).			
<i>assurgens Rehder.</i>	—70	6.—	—
Sehr wertvolle Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum im Sommer. Weissblühend.			
<i>sorbifolia A. Br., B.</i>	—70	6.—	—
Ebereschenblättrige Spiraea. Hübsch gefiedertes, lichtgrünes Laub und grosse, aufrechte, rispige Blütenstände. Juli.			
» <i>stellipila C. S., B.</i>	—70	6.—	50.—
Seltener Strauch mit sehr grossen, weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes, hellgrünes Laub. Blütezeit Juni—Juli.			
Sorbus L. Vogelbeere, Mehlbeere (Rosaceae).			
<i>americana Marsh.</i> Amerikanische Eberesche.			
Hochstämme 8—10 cm Umfang	4.—	35.—	—
Kleiner Baum, dessen dunkelscharlachrote Beeren nur 5—7 mm im Durchmesser halten. Sehr reichblühend.			
<i>Aria Crantz.</i> Gemeine Mehlbeere 120—150 cm hoch	1.—	9.—	80.—
150—200 » »	2.—	15.—	120.—
Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Blüte weiss, im Mai; Früchte orangerot.			
» <i>chrysophylla Hesse</i> Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	—	—
» 120—150 » »	2.—	—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	4.—	—	—
Kräftigwachsende Form mit oberseits leuchtend goldgelben, unterseits weisswolligen Blättern.			
» <i>lutescens Ht.</i> Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	100.—
» 120—150 » »	2.—	18.—	150.—
» 200—250 » »	3.—	28.—	—
» 250—300 » »	4.—	—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	4.—	38.—	350.—
» 8—10 » »	5.—	48.—	—
Schön pyramidal-wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen, silberweissen Blättern.			
» <i>magnifica Hesse</i> Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	100.—
» 120—150 » »	2.—	18.—	150.—
» 200—250 » »	3.—	28.—	—
» 250—300 » »	4.—	38.—	—
» 300—350 » »	5.—	—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	4.—	38.—	350.—
» 8—10 » »	5.—	48.—	—
Unterscheidet sich von der Art schon durch den kräftigen, straff aufrechten Wuchs und ist deswegen als Alleebaum sehr wertvoll. Der Hauptunterschied liegt jedoch in der Belaubung. Diese ist bedeutend grösser als bei der Art, dabei oberseits von glänzend schwärzlichgrüner Färbung, unterseits fast weiss. Die Belaubung behält diese prächtige Färbung bis tief in den Herbst hinein und haftet noch wochenlang vollzählig am Baume fest, wenn die Art schon direkt kahl steht.			
» <i>majestica Zabel.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch	2.50	24.—	—
Grosser, in der Tracht der Art ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.			

Sorbus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Aria vestita Pyramiden 100—120 cm hoch Schöne Varietät mit grossen, weissgepuderten Blättern.	1.50	12.—	—
aucuparia L. Gemeine Eberesche Heister 200—250 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50 2.—	12.— 18.—	100.— 150.—
Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehr zie- rend. Baum bis 15 m hoch, wächst überall.			
» Dirkensi aurea Ht. Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	38.—	—
» » » 180—200 » » 8—10 » Goldgelbe Belaubung.	5.—	48.—	—
» lanuginosa D. Koch (S. aucuparia × domestica) Pyramiden 120—150 cm hoch Solitär- » 300—350 » »	2.— 7.50	18.— —	— —
» moravica Zengerling. (S. aucup. fructu dulce.) Süsse mährische Eberesche. Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	3.50	30.—	280.—
» » » 180—200 » » 8—10 » Die grossen Früchte lassen sich wie die Preiselbeeren konser- vieren und geben ein sehr gesundes Kompott.	4.—	35.—	320.—
» moravica laciniata Beissner. Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	38.—	—
» » » 180—200 » » 8—10 » Varietät mit feingeschlitzter Belaubung.	5.—	—	—
» pendula Kirchn., siehe Trauerbäume.			
» rossica. Russische, essbare Eberesche. Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	38.—	—
» » » 180—200 » » 8—10 » Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eberesche, kugel- rund, korallenrot. Geschmack süss-säuerlich.	5.—	—	—
» rossica major. Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	38.—	—
» » » 180—200 » » 8—10 » Beeren etwas grösser als die der vorigen Form, kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit.	5.—	—	—
dentata Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr empfehlenswerter Baum von schlankem Wuchs, mit tief- gelappten Blättern.	2.50	24.—	—
discolor Hedl. Aus Nordchina stammend. Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	38.—	—
» » » 180—200 » » 8—10 » Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blassgrünen Blätter färben sich im Herbste schön rot.	5.—	—	—
foliolosa Decaisne (Cormus oder Pirus). Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	—	—
Wenig verbreiteter, baumartig wachsender Strauch mit schmalen Fiederblättchen und rötlichen Zweigen.			
gracilis Decaisne. Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	—	—
» » » 180—200 » » 8—10 » Kräftigwachsender Baum aus Japan. Blätter im Austrieb leb- haft rötlich, weisswollhaarig, später fast kahl, oberseits dann dunkel- grün, unterseits weisslichgrün. Blütenstand scheinoldig.	5.—	—	—
Hostii K. Koch. Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 6—8 cm	2.50	—	—
» » » 140—160 » » 6—8 » Eine Kreuzung zwischen „Sorbus Aria“ und „Chamaemespilus“. Belaubung schön tiefgrün, Früchte gross, von roter Farbe.	3.—	—	—
intermedia Pers. Pyramiden 120—150 cm hoch » 200—250 » »	1.50 3.—	— —	— —
latifolia Pers. (S. atrovirens Hort.) » 120—150 » » Solitär- » 300—350 » »	2.— 7.50	18.— —	— —
Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange.			

Sorbus (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
nepalensis Hort.Pyramiden 150—200 cm hoch Solitär- „ 300—350 „ „	2.50 7.50	24.— —	— —
Austrieb dicht weissfilzig. Blatt länglich elliptisch, 12—14:7 cm gross, 2 cm gestielt, schwach gesägt. Oberseits glänzend dunkelgrün, schwachfilzig, unterseits dicht silberweiss-filzig.			
pekinensis KoehneHochstämme 8—10 cm Umfang	5.—	—	—
Die Art zeichnet sich besonders aus durch die matt rötlichgelben, teilweise weisslich überlaufenen, bei der Reife etwas durchscheinenden Früchte.			
sambucifolia Roem.120—150 cm hoch	1.50	12.—	—
Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie „S. aucuparia“.			
tormalis Crantz. Elzbeere. Hochstämme 8—10 cm Umfang	4.—	38.—	—
Mittelhoher Baum mit gelappten, freudig grünen Blättern, in Doldentrauben stehenden, weissen Blüten Mai—Juni und mit grossen, ovalen, lederbraunen Früchten.			
vestita , siehe <i>S. Aria vestita</i> .			
Spiraea , Spierstrauch (Rosaceae).			
albiflora Miquel (Sp. callosa alba).....	—60	5.—	40.—
Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli—August zahlreich erscheinen.			
amurensis , siehe <i>Physocarpus</i> .			
arbuscula Greene	—60	5.—	—
Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen, gewölbten, weissen Doldenrispen im Mai—Juni.			
arcuata Hook. fil.	—80	7.—	—
Kleiner Strauch mit kurzen, starken Ästen. Blatt langelliptisch, tiefgrün, schwach gezähnt. Blütenstand doldentraubig, rötlich.			
arguta Zbl.	—60	5.—	45.—
Reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form. Die grossen, schneeweissen Blumen bedecken im ersten Frühjahr vollständig den Strauch.			
ariaefolia Sm. (<i>Holodiscus discolor Maxim.</i>), B.	—60	5.—	45.—
Bis 3 m hoher Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits graufilzigen Blättern. Blüht in weisslichen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli.			
assurgens Ht. , siehe <i>Sorbaria</i> .			
brumalis Lange	—80	—	—
Mittelhoher Strauch mit länglichen, nach beiden Enden zugespitzten Blättern. Blütenstand doldenartig bis locker, 30 cm im Durchmesser. Blumen weiss mit schwach fleischfarbigem Anflug.			
bullata Maxim. (Sp. crispifolia).....	—80	7.—	—
Strauch, bis $\frac{1}{2}$ m hoch. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen, dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll.			
cantoniensis Lour. (Sp. <i>Reveesiana Lindl.</i>).....	—60	5.—	—
Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni.			
chamaedrifolia crataegifolia Zbl.	—60	5.—	—
Blätter breit, eiförmig, bis 8 cm lang und 4 $\frac{1}{2}$ cm breit, abnehmend fünflappig. Blüte ähnlich der Art.			
» flexuosa Fisch.	—60	—	—
Schöner Strauch mit schmalen, eiförmigen Blättern, der gegen Mitte Mai blüht.			
cinerea Zbl. (Sp. <i>cana</i> \times <i>hypericifolia</i>).....	—60	5.—	40.—
Mittelhoher Strauch mit graugrüner Belaubung und weissen Blüten, die in der zweiten Mithälfte erscheinen.			
» superhypericifolia	—60	—	—
Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern.			
conspicua Zbl. (Sp. <i>albiflora</i> \times <i>latifolia</i>).....	—60	5.—	—
Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober.			
difformis typica Zbl.	—60	—	—
Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen, weissen Rispen.			

Spiraea (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Douglasi Hook	— .60	5.—	—
Beliebte Art mit schmalkegelförmig gebauten, purpurrosa Rispen, von Juli bis September, Strauch 2 m hoch.			
expansa inciso serrata Zabel	— .60	5.—	—
Erreicht 1½ m Höhe. Doldenrispe weisslich mit rötlichem Anflug, im Mai—Juni. Blätter eingeschnitten gesägt.			
Fontenaysi Billiard (Sp. canescens × salicifolia)	— .60	5.—	—
Blätter unterseits hell bläulichgrün, rosablinhend, Juni—Juli, bis 1,5 m hoch.			
» alba Zabel	— .60	5.—	40.—
Reichblühende Form; Blüten weiss, im Juni—Juli.			
gemmata Zabel	— .60	5.—	—
Bildet sehr dichte, 1 m hohe Sträucher mit überhängenden, zier- lich belaubten Zweigen. Blüten im Mai, weiss.			
Henryi Hemsley	1.—	—	—
Hübsche, bis 2 m hohe Art mit ovaler bis ovalelliptischer Be- laubung, die oberseits sattgrün, unterseits graugrün ist. Blüte weiss, in etwa 8 cm breiten Ständen.			
inflexa K. Koch. (Sp. crenata × mollis)	— .80	—	—
Die recht langen Blüentriebe, in der zweiten Maihälfte, mit grossen, schön weissen Blüten dicht besetzt, biegen sich meist im zierlichen Bogen nach abwärts.			
intermedia polystachys Zabel	— .60	—	—
Blütenstand sämtlicher Triebe reich verzweigt, aus zahlreichen, kleinen, traubig angeordneten Rispen bestehend.			
japonica macrophylla Simon-Louis. (Sp. Fortunei macrophylla)	— .60	5.—	—
Grossblättrige, schön rot austreibende Form von 1,5 m Höhe Blüten rot, im Juni—Juli.			
» ovalifolia Franch.	— .60	5.—	—
Eine neuere, aus China eingeführte Form mit schönen, grossen, weissen Blütendolden. Laub eiförmig, hellgrün.			
Margaritae Zbl. (Sp. japonica × superba)	— .60	5.—	—
Strauch, der den Juli hindurch mit lebhaft rosafarbenen Blumen bedeckt ist. Prächtigt rote Herbstfärbung.			
media subintegerrima Zabel	— .60	5.—	—
Mit länglich-lanzettlichen Blättern, sonst wie die Art.			
Menziesii alba × Douglasii	— .50	4.—	30.—
Die grossen, kegelförmigen Rispen sind aus fleischfarbigen Blüten zusammengesetzt. Ziemlich hochwachsend.			
» angustifolia Zabel	— .50	4.—	—
Schöne Form mit lanzettlichen Blättern. Blüten lebhaft purpurrosa.			
» Billardi Zabel	— .50	4.—	—
Blütenrispen rosa. Hoher Strauch.			
» eximia Zabel	— .50	4.—	—
Strauch hoch und straff aufrechtwachsend mit elliptischer, stumpfgrüner Belaubung, Blüte lebhaft karminrosa, in grossen Ständen.			
» Lenneana Zabel	— .50	4.—	30.—
Ausgezeichnet schöne, hellrosa blühende Form			
» macrothyrsa Zabel	— .50	4.—	30.—
Stattliche, hochwachsende Form. Rispen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Juni—Juli blühend.			
» ovalifolia Zabel	— .50	4.—	30.—
Sämling von Sp. Douglasii mit grossen, ovalen Blättern und purpur- rosa Blüten.			
» Pseudo-Douglasii Zabel	— .50	4.—	—
Grosse, kräftige Form. Blätter schmal-länglich, 8—9 cm lang 27—35 mm breit. Blüten purpurrosa.			
» triumphans Zabel	— .50	4.—	30.—
Blumen im Aufblühen lebhaft purpurrosa, aber bald verbleichend. Blütezeit Juni—Juli.			
Miyabei var. glabrata Rehder	— .50	4.—	30.—
Diese chinesische Form hat viel Ähnlichkeit mit Sp. betulifolia, unterscheidet sich jedoch leicht durch die glatten, dünnen Zweige und die gedrängt zusammengesetzten Blütenstände.			

Spiraea (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
multiflora supertruncata	—60	5.—	—
Mittelhoher Strauch mit meist länglicher, gekerbt gezählter, graugrüner Belaubung. Blüten weiss, in Trugdolden, im Mai er- blühend.			
nivea subincisa Zabel	—60	—	—
Weissblühend. Blätter dicht eingeschnitten, gesägt.			
Nobleana Hook. (Sp. betulifolia × Douglasi)	—50	4.—	30.—
Ein schön blühender Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juni—Juli.			
» superbetulifolia Zabel	—50	4.—	30.—
Eine der allerschönsten, dunkelrot blühenden Pflanzen.			
notha typica Zabel	—50	4.—	—
Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig.			
nudiflora Zbl. (Sp. bella × ulmifolia)	—50	4.—	—
Mittelhoher Strauch, der im Juni reichlich blüht. Blüten weiss- lichrosa in aufrechtstehenden Doldentrauben.			
oxyodon Zbl. (Sp. flexuosa × media)	—50	4.—	—
Blüht Anfang Mai in vielblumigen Doldentrauben.			
pikoviensis Bess. (Sp. crenata × media)	—60	—	—
Kräftigwachsend und frühblühend. Blüten weiss.			
pruinosa Zbl. Muskau. (Sp. canescens × Douglasi)	—50	4.—	30.—
Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Juli.			
prunifolia plena	—80	7.—	—
Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten.			
pulchella Kze. (Sp. bella × expansa)	—60	—	—
Blüht in gewölbten Doldenrispen heller oder dunkler rosa.			
pumila atrosea Zabel	—60	5.—	40.—
Niedriger Strauch mit grossen, schön dunkelrosa Blüten im Juni—Juli; reichblühend.			
» Bumalda Hort.	—60	5.—	—
Rotblühende Form mit bunter Belaubung.			
» Bumalda Anthony Waterer	—70	6.—	50.—
Die beste, niedrigbleibende Form mit dunkelpurpurroten Blüten. Äusserst dankbar blühend.			
» Bumalda crispa Hesse	2.—	18.—	—
Neuheit. Blatt 5—10 cm gross, wunderbar schön onduziert, am Rande stark geschlitzt und zersägt. Schön roter Austrieb. Sonst alle guten Eigenschaften wie Anthony Waterer.			
» erubescens Zabel	—60	—	—
Zwergstrauch. Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Juni—Juli.			
» glabra Zabel	—60	5.—	40.—
Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige, rosa Blüten.			
» leucantha Zabel	—60	5.—	40.—
Weissblühend, grosse Dolden. Juni—Juli.			
» rosea Zabel	—60	5.—	40.—
Rosablühend.			
» superjaponica Zabel	—60	5.—	40.—
Mittelhoch, hellrosa blühend.			
reflexa	—80	—	—
revirescens grandiflora Zbl.	—60	5.—	—
Laub im Austreiben purpurbraun. Mittelhoher Strauch mit grossen, rosafarbigem Blütendolden im Juni—Juli.			
» pallida Zabel	—60	5.—	—
Hellrosablühend, sonst wie vorhergehende.			
Rosthornii Fritzel	—60	5.—	—
Chinesische Art, die mit der alten Sp. longigemmis in allen Teilen übereinstimmt, nur dass sie behaart ist, während Sp. longigemmis kahl bleibt.			
rubra Hort. (Sp. Douglasi × expansa)	—60	5.—	—
Sehr schön dunkelrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Blütezeit Juni—Juli, ziemlich hoch.			
salicifolia alba Du Roi, (Sp. aubifolia) B.	—50	4.—	30.—
Bringt grosse, lockere, kegelförmige, weisse Blumenrispen im Juni—Juli. Strauch ziemlich hoch.			

Spiraea (Fortsetzung):

salicifolia typica L., B.
Die typische Art mit länglich lanzettlichen Blättern, die 5—6 cm lang und etwa 10—17 cm breit sind. Blütenrispe etwa 10 cm lang. Blüten weiss bis fleischfarben.

sorbifolia und sorbifolia stellipila, siehe Sorbaria.

superba Froebel (Sp. callosa rosea superba)
Niedrig bleibende Form mit grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen im Sommer.

syringifolia Lem. (Sp. albiflora × salicifolia)
Schöne, niedrige Form mit rosa Blumen im Juli.

Thunbergi Sieb.
Am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich vollständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung.

tomentosa L. Rostfilzige Spiraea
Mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und rosenroten Blütenrispen, im Juli—August. Reichblühend.

Vanhouttei Briot (Sp. cantoniensis × trilobata).
1000 Stück M. 300.—
Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt.

Veitchi Hemsl.
Eine besonders schöne Art, bildet einen kompakten Strauch von leichtem Wuchs, 1—2½ m hoch. Blüht sehr reich in grossen Dolden. Blumen rein weiss. Ist die schönste der chinesischen Spiraeen.

Spiraea in besten Sorten meiner Wahl, aus vorstehendem Sortiment:

100 Stück M. 35.—, 1000 St. M. 280.—

Staphylea L. Pimpernuss (Staphyleaceae).

Bolanderi Asa Gray mit Topfballen
Seltener Strauch aus Kalifornien mit rotbraunen Ästen, rund-ovalen, bis 6 cm langen und 4½ cm breiten, graugrünlchen Blättern und grünlchen Blüten. Liebt warme Lage.

Bumalda De Cand. Japanische Pimpernuss
Blätter lebhaft grün an rötlichgrünen oder purpurfarbigen Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm langen Trauben im Juni. Strauch bleibt niedrig.

colchica Stev. (St. Regeliana)
In den Kaukasusprovinzen heimischer Strauch von gedrunenem Wuchs mit fünfteiligen Blättern und reinweissen, wohlriechenden Blüten. Treibstrauch.

» **Coulombieri grandiflora Hesse**
Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen.

» » **macrocarpa Hesse**
Mit enorm grossen Fruchtkapseln.

Emodi Wallich. Himalaja-Pimpernuss mit Topfballen
Zweige bereift. Blättchen rundlich eiförmig oder lanzettlich zugespitzt, scharf gesägt. Kelchbecher kurzglockig, der St. trifoliata ähnlich. Blüte weiss. Für warme Lage.

pinnata L. Gemeine Pimpernuss
Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss.

pyramidalis Chenault mit Topfballen
Von aufrechtem Wuchs. Die Zweige sind der ganzen Länge nach mit Blumen von rahmweisser Farbe bedeckt.

trifoliata pauciflora Zabel
1.— — —

Stephanandra Sieb. & Zucc. Kranzspiere (Rosaceae).

incisa Zabel (St. flexuosa Sieb. & Zucc.)
Strauch von etwa 1½ m Höhe. Die sehr feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht im Bogen über. Blüten im Juni in 5—12blütigen, einseitigen Trauben, weiss.

Tanakae Franch. & Savat.
Strauch kräftiger wachsend als voriger. Blätter und Blütenrispen grösser als die von „St. incisa“. Herbstfärbung.

pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
—50	4.—	30.—
—50	4.—	30.—
—80	—	—
—80	7.—	—
—50	4.—	30.—
—50	4.—	35.—
1.—	9.—	80.—
2.—	—	—
1.—	—	—
1.—	9.—	—
2.—	18.—	—
1.—	9.—	—
2.—	—	—
2.—	—	—
1.—	—	—
—80	7.—	—
—80	7.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Stranvaesia Ldl. (Rosaceae).			
<i>Davidiana Decne</i> mit Topfballen Gutwachsender, buschiger, immergrüner Strauch. Triebe filzig behaart, ebenso Stiel und unterseits Hauptnerv des schönen, glän- zend sattgrünen, länglichen Blattes. Blüte weiss, in doldigen Ständen.	1.—	8.—	70.—
<i>undulata Decne</i> mit Topfballen Ziemlich hochwachsender Strauch mit angedrückt rauher Be- haarung und lanzettlicher, bis 10:3½ cm grosser, immergrüner Be- laubung von dunkelgrüner Färbung. Blütenstand weiss, locker, Frucht orangefarben.	2.—	—	—
Styrax, L. Storaxbaum (Styracaceae).			
<i>dasyantha Perkins</i> mit Topfballen Neue, chinesische Einführung. Triebe dünn aber fest, gelblich- grün; Blatt sitzend, zugespitzt elliptisch, gesägt, schwach glänzend gelblichgrün.	2.—	—	—
<i>japonica Sieb. & Zucc.</i> Japanischer Storaxbaum. 40—60 cm hoch Schöner, bis 6 m hoch werdender, harter Strauch oder Baum mit sehr wohlriechenden Blumen im Mai—Juni.	2.—	18.—	—
Suaeda Forskal Kelchmelde (Chenopodiaceae).			
<i>fruticosa Forskal</i> (Salsola fruticosa Linné) ... mit Topfballen Immergrüner Salzstrauch, der 50—100 cm hoch wird, mit auf- rechtem, glattem, weissrindigem Stengel. Belaubung blau oder grau- grün. Die Blüten erscheinen im Juni, zu Ähren vereinigt, einzeln oder zu drei geknaut in den Blattachseln.	2.50	20.—	—
Symphoricarpus Jussieu. Schneebeere (Caprifoliaceae), B.			
Die Schneebeere kann als Bienenfutter nicht oft genug empfohlen werden. Die unendlich vielen, kleinen Blüten geben den Bienen auch dann noch Nahrung, wenn die andere Tracht längst vorüber ist.			
<i>acutus Dippel.</i> Spitzblättrige Schneebeere Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitzgezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüten hell- rot. Weisse Beeren äusserst zahlreich.	—50	4.—	35.—
<i>Giraldi Hesse</i> Eine aus China stammende Art, die wahrscheinlich als Form zu S. orbiculatus anzusprechen ist. Laub und Früchte stimmen hier- mit überein, doch ist der Wuchs bedeutend kräftiger.	—50	4.—	35.—
<i>Heyeri Dippel</i> 1 m hoher Strauch mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht im Juli und August lebhaft rosa. Beeren mittelgross.	—50	4.—	35.—
<i>orbiculatus Moench</i> (S. parviflorus Desf.). Rundblättrige Schnee- beere Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner, unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blassrötlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.	—50	4.—	35.—
<i>racemosus Mchx.</i> Gemeine Schneebeere Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen, weissen, zierenden Früchten.	—50	4.—	30.—
<i>pauciflorus Robbins</i> Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulich- graugrüner, kleinblättriger Belaubung.	—50	4.—	35.—
Symplocos L. Rechenblume (Symplocaceae).			
<i>crataegoides Hamilton</i> (S. paniculata Wallich), Weissdorn- ähnliche Rechenblume Ein noch wenig verbreiteter, hübscher Strauch mit oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren, 3 cm breiten und 6 cm langen, stark gesägten, sich rau und hart anführenden, wechselstän- digen Blättern. Zweige silbrig bis braungrau. Zeichnet sich durch schöne, blaue, metallisch glänzende, ovale Beeren, die an 3 cm langen Stengeln sitzen, aus. Noch sehr selten.	2.50	—	—
Syringa L. Flieder (Oleaceae), einschliesslich Ligustrina.			
<i>Emodi Wallich</i> Gedungen wachsender Strauch. Grosse, lederartige, oberseits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lila- weiss im Juni. Strauch bis 3 m hoch.	1.50	14.—	—
<i>variegata Hort.</i> Sehr schön goldbunt belaubt.	1.50	—	—

Syringa (Fortsetzung):

japonica Decaisne Sträucher

Kronenbäumchen 80—100 cm hoch

Prächtiger, japanischer Flieder, mit sehr grossen, weissen Rispen
im Juni—Juli. Bis 10 m hoher, kleiner Baum.

Josikaea Jacquin fil. Ungarischer Flieder

Dichtbuschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkel-
grüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni.

» *eximia Hort.* 1.20 10.—

Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten
auszeichnet.

persica alba, weissblühend

reflexa Schneider. B. 1.50 12.— 100.

Strauch von dem Aussehen der *S. villosa*. Laub länglich-
elliptisch, 7—13 cm lang und $3\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$ cm breit, oberseits satt-
grün, unterseits hellgraugrün. Dieser chinesische Flieder wird
bis 3 m hoch und überrascht jeden Beschauer durch seinen
Blütenreichtum, mit dem die 20—25 cm langen, schmalen, leicht
hängenden Blüentrauben hervorgebracht werden. Die aufgeblüh-
ten Blumen mit ca. 11 mm langen Röhren und kaum ausgebrei-
teten Kronenlappen sind bedeutend heller rosa getönt als die
fast karminroten Knospen, wodurch der blühende Strauch auf-
fallend lebhaft wirkt. Durch die späte Blütezeit, wenn der
bekannte Gartenflieder längst verblüht ist, ist der Strauch noch
besonders wertvoll. Hinzu kommt sein Wert für den Imker,
denn die Bienen kommen in hellen Scharen, um die reichen
Gaben zu naschen, die *Syringa reflexa* für sie bereitgestellt hat.
Der Strauch ist vollständig winterhart und sollte weiteste
Berücksichtigung bei der Bepflanzung der Gärten finden als
Neueinführung von grösstem Wert.

Rothomagensis alba Hort. 1.50 12.— 100.

Zierliche Bezweigung und lockerstehende, weissliche Blüten-
rispen im Mai. Höhe 3 m.

Sargentiana Schneider 2.— —

Bis 4 m hoher Strauch. Junge Triebe kahl, bräunlich. Blatt
länglich elliptisch mit keilförmiger Basis, oben zugespitzt, 8—15:3—5 cm
gross. Oberseits lebhaft grün, schwach behaart, unterseits graugrün,
wollig behaart, Rand gewimpert. Blütenstand nickend, dichtblütig,
17:5—6 cm gross, locker wollhaarig. Blüte purpurrot mit 10—12 mm
langer Röhre, die 3 mm tief gelappt ist.

Sweginzowii Koehne et Lingelsh mit Topfballen 2.— —

Neue, wahrscheinlich aus Ostasien kommende, der *S. rosea* verwandte
Art. Strauch hoch und schlankzweigig, entwickelt zierliche Rispen,
ausser fleischfarbiger, innen weisser Blüten mit karminrotem Schlund.

tomentella Bur. et Franch. 2.— —

Strauch mit kahlen bis feinzottigen, jungen Trieben, ältere braun.
Blatt bärtig behaart, 3—9:1,3—3,8 cm, oberseits sattgrün, unterseits
graugrün, auf den Nerven dichtbärtig behaart. Blütenstand dicht,
bis etwa 18:7 cm gross, borstig behaart. Blüte lilarosa, mit etwa
9 mm langer Röhre.

villosa Decne (S. Bretschneideri Hort.) 2.— —

Chinesische Art mit schöner, dunkelgrüner Belaubung und dicht-
gedrängten, knäuelartigen Rispen von zartlila Farbe.

» ***Lutèce*** 2.— 18.—

Kreuzung zwischen *S. villosa* und *Josikaea*.

vulgaris L. Gemeiner Flieder —.60 5.—

Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen, im Mai blühend.

» ***alba Dietrich*** 1.50 14.—

Weissblühende Form.

vulgaris Hybriden: in besten, einfach- und gefülltblühenden
Sorten meiner Wahl starke Freilandsträucher 3.50 32.—

Wilsoni Schneider 2.— 18.—

Strauch bis 2 m und mehr hoch, gehört zur *villosa*-Klasse.
Holz schwarzbraun mit weissen Borkenwarzen. Blätter feinhäutig,
gefaltet, elliptisch-lanzettlich, mit endständigem Blütenstand von
15 cm Länge und 10 cm Breite. Blumen mit langer Röhre, nach
oben weit geöffnet und Blattränder zurückgebogen, sehr zart malven-
artig lila. Frucht lang, fast zylindrisch (walzenförmig), stachel-
spitzig. West-Schtschwan, Wilson 1273.

pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1.20	10.—	—
2.—	—	—
1.—	9.—	80.—
1.20	10.—	—
2.—	—	—
1.50	12.—	100.—
1.50	12.—	100.—
2.—	—	—
2.—	—	—
2.—	—	—
2.—	—	—
2.—	18.—	—
—.60	5.—	—
1.50	14.—	—
3.50	32.—	—
2.—	18.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Syringa (Fortsetzung):			
Wolff C. Schneider	2.—	18.—	—
Blütenstände 14 cm lang, lockerrispig. Blumen duftend, lila. Sehr schöne Art, noch wenig in Kultur.			
Tamarix L. Tamariske. (Tamaricaceae.)			
caspiaca Hort.	—80	7.—	60.—
Zierliche, hellgraugrüne Belaubung und lebhaft rosafarbene Blütenähren im Juni.			
gallica indica Willd.	—80	7.—	60.—
Indische Tamariske.			
germanica L.	—80	—	—
Bis 2 m hoher Strauch mit blaugrüner Belaubung und blassrosa Blumen. Sehr empfehlenswerte Art.			
Lambertiana Stev.	—80	7.—	—
odessana Stev.	—80	7.—	—
Mit dichter, blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten im Juli—August. Unstreitig eine der schönsten Arten.			
tetrandra Pallas. (T. africana Hort.) Viermännige Tamariske. Ein bis 5 m hoher Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und hellrosa Blütenähren im Mai.	—80	7.—	60.—
» parviflora De Cand.	—80	7.—	60.—
Kleinblumige, rosablühende Varietät.			
» purpurea Hort	—80	7.—	—
Mit dunkelroten Blütenähren.			
Teucrium L. Gamander (Labiatae).			
Chamaedrys , siehe Stauden.			
maritimum Hort. (T. marum L.) mit Topfballen	2.—	—	—
Hübscher, breitwachsener Halbstrauch für warme Lagen. Triebe und Blattunterseite dicht silberweiss, fälzig. Die Oberseite des kleinen, ovalen Blattes ist glänzend dunkelgrün. Blüten bläulich lilafarbig.			
Tilia Linne. Linde (Tiliaceae), B.			
americana nova	6.—	55.—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang			
» 10—12 » »	7.—	65.—	600.—
Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum, der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.			
argentea Desfont. (T. tomentosa Moench). Echte Silberlinde.			
Pyramiden 300—350 cm hoch	6.—	—	—
Hochstämme 10—12 cm Umfang	8.—	—	—
» 12—14 » »	10.—	—	—
Von allen Linden ist diese silberblättrige Art besonders hervor- zuheben.			
grandifolia aurea Kirchner (T. Handsworthi aurea).			
Goldlinde	3.—	28.—	—
Pyramiden 100—150 cm hoch			
» 150—180 » »	3.50	30.—	—
Schöne, goldzweigige Form.			
» corallina C. Koch (T. Handsworthi rubra).			
Pyramiden 150—180 cm hoch	3.50	—	—
Schöne Form mit schon im Sommer, namentlich aber im Winter hervortretender, dunkelkorallen- oder karminroter Färbung der Zweige.			
intermedia De Cand. (Tilia hollandica, T. vulgaris Hayne.)			
Hochstämme 8—10 cm Umfang	6.—	55.—	—
» 10—12 » »	7.—	65.—	—
Echte, holländische Linde von lebhaftem Wuchse und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Blüht sehr reich- lich und ist die beste Bienenlinde.			
parvifolia Ehrhard (T. ulmifolia Scop.). Kleinblättrige oder Steinlinde ... Pyramiden für Lauben 100—120 cm hoch	2.—	18.—	150.—
» » 120—150 » »	2.50	22.—	200.—
Mittelstark wachsender Baum mit glänzend grünen, kreisrunden Blättern und sehr reichem Blütenfior zu Anfang Juli. Wird nicht von Krankheiten befallen. Alte Dorflinde.			
Ulex L. Stechginster, Hecksame (Leguminosae)			
europaeus	2.—	—	—
Sehr dorniger Strauch, Blüten achselständig, tiefgelb, April—Juni.			

Ulmus L. Ulme, Rüster (Ulmaceae).*alba* W. & K. Weisse Rüster . . . Pyramiden 80—100 cm hoch*campestris betulifolia* Hort. Birkenblättrige Rüster, **B.**

Pyramiden 60—80 cm hoch

» 150—180 » »

» *cornubiense* Hort. Steife Feldrüster.

Pyramiden 80—100 cm hoch

» 180—200 » »

» *Escaillardi* Hort. Hochstämme, 5—7 cm Umfang» *glabra fastigiata* Arb. *Muskau*.

Pyramiden 250—300 cm hoch

» *Louis van Houtte Deegen*. » 80—100 » »

Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 8—10 cm

» » » 180—200 » » 10—12 »

Mit goldbronzeener Belaubung. Blattmitte oft grün.

» *minor argenteo-marginata* Hort.

Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 8—10 cm

» » » 180—200 » » 8—10 »

Form, deren tiefgrünes Blatt silberweiss gerandet ist.

» *myrtifolia purpurea* Hort. Pyramiden 80—100 cm hoch

» 150—180 » »

Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 8—10 cm

» » » 200—220 » » 10—12 »

Mit feinen Ästen und kleinen, purpurroten Blättern.

» *parvifolia*. Pyramiden 80—100 cm hoch

» 150—180 » »

» 180—200 » »

Starkwachsend, mit schöner, leicht glänzender, sattgrüner, mässig grosser Belaubung.

» *purpurea* Hort. Pyramiden 100—150 cm hoch

Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 8—10 cm

» » » 180—200 » » 10—12 »

Beim Austreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkelbraunen Blättern.

» *Rueppelii* Pyramiden 60—80 cm hochÄhnlich *U. umbraculifera*, Triebe etwas behaart, später leicht korkig, Blätter ziemlich klein, etwas rauh.» *sarniense* L. Yersey-Rüster. Pyramiden 100—120 cm hoch

» 150—180 » »

» 180—200 » »

» 200—250 » »

Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 8—10 cm

» » » 200—220 » » 10—12 »

Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.

» *suberosa alata* Hort. Pyramiden 150—200 cm hoch

» 200—250 » »

Rinde stark korkig.

» » *tortuosa* Hort. 80—100 cm hoch» *umbraculifera* Hort. Kugelrüster.

1jährige Kronen:

Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 8—10 cm

» » » 200—220 » » 8—10 »

» » » 200—220 » » 10—12 »

2jährige Kronen:

Höhe bis zur Krone 200—220 » » 8—10 »

Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen.

» *umbraculifera gracilis*

Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 10—12 cm

» » » 200—220 » » 12—14 »

Kugelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<i>alba</i> W. & K. Weisse Rüster . . . Pyramiden 80—100 cm hoch	2.—	—	—
<i>campestris betulifolia</i> Hort. Birkenblättrige Rüster, B.			
Pyramiden 60—80 cm hoch	1.50	—	—
» 150—180 » »	2.50	—	—
» <i>cornubiense</i> Hort. Steife Feldrüster.			
Pyramiden 80—100 cm hoch	1.50	14.—	—
» 180—200 » »	2.50	—	—
» <i>Escaillardi</i> Hort. Hochstämme, 5—7 cm Umfang	4.—	—	—
» <i>glabra fastigiata</i> Arb. <i>Muskau</i> .			
Pyramiden 250—300 cm hoch	4.—	35.—	—
» <i>Louis van Houtte Deegen</i> . » 80—100 » »	3.—	25.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 8—10 cm	6.—	55.—	—
» » » 180—200 » » 10—12 »	8.—	75.—	—
Mit goldbronzeener Belaubung. Blattmitte oft grün.			
» <i>minor argenteo-marginata</i> Hort.			
Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 8—10 cm	3.—	—	—
» » » 180—200 » » 8—10 »	6.—	—	—
Form, deren tiefgrünes Blatt silberweiss gerandet ist.			
» <i>myrtifolia purpurea</i> Hort. Pyramiden 80—100 cm hoch	2.—	—	—
» 150—180 » »	4.—	—	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 8—10 cm	6.—	—	—
» » » 200—220 » » 10—12 »	8.—	—	—
Mit feinen Ästen und kleinen, purpurroten Blättern.			
» <i>parvifolia</i> Pyramiden 80—100 cm hoch	2.—	—	—
» 150—180 » »	4.—	—	—
» 180—200 » »	5.—	—	—
Starkwachsend, mit schöner, leicht glänzender, sattgrüner, mässig grosser Belaubung.			
» <i>purpurea</i> Hort. Pyramiden 100—150 cm hoch	3.—	25.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 8—10 cm	6.—	55.—	—
» » » 180—200 » » 10—12 »	8.—	75.—	—
Beim Austreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkelbraunen Blättern.			
» <i>Rueppelii</i> Pyramiden 60—80 cm hoch	2.—	—	—
Ähnlich <i>U. umbraculifera</i> , Triebe etwas behaart, später leicht korkig, Blätter ziemlich klein, etwas rauh.			
» <i>sarniense</i> L. Yersey-Rüster. Pyramiden 100—120 cm hoch	2.50	20.—	—
» 150—180 » »	3.—	25.—	—
» 180—200 » »	3.50	30.—	—
» 200—250 » »	4.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 8—10 cm	6.—	55.—	—
» » » 200—220 » » 10—12 »	8.—	—	—
Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.			
» <i>suberosa alata</i> Hort. Pyramiden 150—200 cm hoch	3.—	—	—
» 200—250 » »	4.—	—	—
Rinde stark korkig.			
» » <i>tortuosa</i> Hort. 80—100 cm hoch	2.—	—	—
» <i>umbraculifera</i> Hort. Kugelrüster.			
1jährige Kronen:			
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 8—10 cm	6.—	55.—	—
» » » 200—220 » » 8—10 »	7.—	65.—	—
» » » 200—220 » » 10—12 »	8.—	75.—	—
2jährige Kronen:			
Höhe bis zur Krone 200—220 » » 8—10 »	8.—	75.—	—
Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen.			
» <i>umbraculifera gracilis</i>			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 10—12 cm	8.—	—	—
» » » 200—220 » » 12—14 »	10.—	—	—
Kugelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.			

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Ulmus (Fortsetzung):				
<i>campestris urticifolia</i> . Nesselblättrige Ulme.	100—120 cm hoch	2.—	—	—
» <i>Webbiana Hort.</i>	Pyramiden 80—100 » »	2.—	—	—
	» 150—180 » »	4.—	—	—
Mit etwas gerollten Blättern. Bildet breite, dichte, kugelige Kronen.				
<i>corylifolia purpurea Hort.</i>	Pyramiden 100—120 cm hoch	2.—	18.—	—
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 10—12 cm	8.—	75.—	—
Sehr schöne, dunkelrot belaubte Form von starkem Wuchs.				
<i>latifolia Hort.</i> (U. <i>hollandica</i> , U. <i>Pitteursi</i>).	Hybride zwischen	2.—	18.—	150.—
U. <i>campestris</i> × <i>montana</i> ...	Heister 150—200 cm hoch	3.—	25.—	200.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.50	30.—	250.—
	» 8—10 » »	4.—	35.—	300.—
	» 10—12 » »			
Bekannter, allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse, breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.				
<i>montana atropurpurea Hort.</i> , B.	Pyramiden 100—120 cm hoch	2.—	18.—	—
	» 150—200 » »	4.—	38.—	—
	Solitär- 200—250 » »	5.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 8—10 cm	6.—	55.—	—
	» » » » 180—200 » » 10—12 »	8.—	75.—	—
	» » » » 180 200 » » 12—14 »	10.—	—	—
Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.				
» <i>aurea Hort.</i>	Pyramiden 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	» 150—180 » »	3.—	—	—
	» 200—250 » »	5.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 10—12 cm	8.—	75.—	—
Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.				
» <i>Dampieri Hort.</i>	Pyramiden 60—80 cm hoch	1.50	—	—
	» 80—100 » »	2.—	18.—	—
	» 120—150 » »	3.—	28.—	—
	» 150—180 » »	4.—	35.—	—
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 8—10 cm	6.—	55.—	—
Von schlankem, pyramidalem Wuchs, Säulen bildend.				
» <i>Dampieri Wredei Hort.</i> (U. <i>mont. Dampieri aurea Hort.</i>)	Pyramiden 60—80 cm hoch	2.—	18.—	150.—
	» 80—100 » »	3.—	25.—	200.—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 6—8 cm	4.—	38.—	—
	» » » » 140—160 » » 6—8 »	5.—	45.—	400.—
	» » » » 160—180 » » 6—8 »	6.—	55.—	—
	» » » » 160—180 » » 8—10 »	8.—	75.—	—
Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.				
» <i>fastigiata Loud.</i> (U. <i>mont. exoniensis</i> , U. <i>mont. plumosa</i>).	Pyramiden 150—200 cm hoch	4.—	38.—	—
	» 200—250 » »	5.—	48.—	—
	» 250—300 » »	6.—	58.—	—
Niedrig veredelt 7—9 cm Umfang,				
	ganze Höhe 300—350 cm	6.—	55.—	—
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 8—10 »	7.—	65.—	—
	» » » » 180—200 » » 10—12 »	8.—	75.—	—
	» » » » 200—220 » » 12—14 »	10.—	95.—	—
Schöne, dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekräuselten, tiefdunkelgrünen Blättern.				
» <i>fulva Muskau</i>	150—200 cm hoch	2.50	—	—
» <i>gigantea Hort.</i>	Pyramiden 150—180 » »	3.—	28.—	—
	» 200—250 » »	4.—	—	—
Ungemein starkwachsend mit sehr grosser, hellgrüner Belaubung.				

Ulmus (Fortsetzung):

montana latifolia Hort. Hochstämme 5—7 cm Umfang
Breitblättrige Form.

» *macrophylla* Hort. » 6—8 » »
» 8—10 » »

Grossblättrig und starkwüchsig.

» *pendula*, siehe Trauerbäume.

» *plumosa*, siehe *U. montana fastigiata*.

» *rugosa* Loud. Rauhe Hängeulme.

Pyramiden 60—80 cm hoch

» 150—180 » »

» *Scamptoniensis* Hort. » 60—80 » »

» *superba* (*U. praestans*) .. Hochstämme 6—8 cm Umfang

» 10—12 » »

Sehr empfehlenswerter Strassenbaum von kräftigem, aufstrebendem Wuchs. Die grossblättrige Belaubung erhält sich bis spät in den Herbst hinein auf dem Baume.

» *tomentosa* Pyramiden 100—120 cm hoch

pinnato-ramosa Dieck » 80—100 » »

Zeichnet sich aus durch fächerförmig geordnete, mit sehr kleinen Blättern besetzte Bezweigung, die dem Baume ein sehr zierliches Ansehen gibt.

pumila L. Pyramiden 100—120 cm hoch

Hübsch belaubte Art mit zierlich überhängenden Zweigen.

vegeta Loud. Pyramiden 150—180 cm hoch

» 250—300 » »

Hochstämme 5—7 cm Umfang

Bildet schöne, pyramidale Kronen. Grossblättrig und ausserordentlich starkwüchsig.

Vaccinium Linné. Heidelbeere (*Ericaceae*).

macrocarpum Ait. Grossfrüchtige Moosbeere, **B.** ... mit Ballen

Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandböden in jeder Lage.

Veronica Linné. Ehrenpreis (*Scrophulariaceae*).

coerulea glauca mit Topfbällen 10—20 cm hoch

Blaugrüne Belaubung. Hellblaue, blattwinkelständige Blütensträubchen. Juni—Juli.

cupressinoides Hk. mit Topfbällen 30—40 cm hoch

Niedriger, dichtverzweigter, 10—30 cm hoher Strauch. Blumen in Büscheln sitzend, hellblau. Schöner Felsenstrauch.

loganioides Hort. mit Topfbällen 10—20 cm hoch

Eine Art mit eigenartig schuppig beblätterten Trieben.

pinguifolia Hk. mit Topfbällen 10—20 cm hoch

Steifer, aufrechter, oder mehr oder weniger niedergestreckter Strauch, der ein Meter Höhe erreicht. Blätter bis 12 mm lang, derblederig, blaugrün. Blüten weiss.

Weitere Sorten siehe auch Stauden.

Viburnum Linné. Schneeball (*Caprifoliaceae*).

affine Bush. mit Topfbällen

Im Aussehen *V. pubescens* ähnlich mit bräunlichen bis grauen Trieben. Belaubung rundlichoval, scharf grobgesägt, glänzend grün. Beeren glänzend schwarz.

alnifolium Marsh. (*V. lantanoides Michx.*). Erlenblättriger

Schneeball

2—3 m hoher Strauch. Blätter breitoval, 10—20 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Im Mai erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblüten.

betulifolium Batalin. mit Topfbällen

Blätter oval bis rhombisch oval, von 3—6 cm Länge und 2—4 cm Breite, oberseits glatt und dunkelgrün, unterseits heller. Blüht in Scheindolden, die bis 10 cm im Durchmesser halten. Beeren rot.

pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4.—	—	—
5.—	48.—	—
6.—	58.—	—
1.50	—	—
3.—	—	—
1.50	—	—
4.—	35.—	300.—
6.—	55.—	—
2.50	—	—
2.—	—	—
2.50	—	—
3.—	—	—
4.—	—	—
5.—	—	—
—70	5.—	50.—
1.50	12.—	—
2.50	—	—
1.50	12.—	—
1.50	12.—	—
3.—	—	—
1.50	12.—	—
3.—	—	—

Viburnum (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
cassinoides <i>L.</i> Birnblättriger Schneeball	1.—	8.—	—
Die dicken, eilänglichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen Blüten- dolden. Beere schwarz.			
cotinifolium <i>D. Don.</i>	3.—	—	—
Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa 1½ m Höhe erreicht. Blütezeit Mai.			
dasyanthum <i>Rehd.</i>	3.—	28.—	—
mit Topfballen Chinesische Einführung mit ovaler bis elliptischer, dunkelgrüner Belaubung. Blüte weisslich, in endständigen, behaarten, doldigen Ständen. Frucht rot.			
Davidii <i>Franch.</i>	3.—	—	—
mit Topfballen Ein kleiner, bis 50 cm hoher, immergrüner, dünntriebiger Strauch. Blätter lederig, 10—15 : 5—7 cm gross, elliptisch, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten weiss, in dichten endständigen, 6—8 cm breiten Büscheln.			
dentatum <i>L.</i>	—80	7.—	—
Hoher Strauch mit hellgrünem, gezähntem Laub und weissen Blütendolden, im Juni—Juli. Beere schwarzblau.			
» longifolium <i>Dippel</i> (<i>V. longifolium</i> <i>Lodd.</i>)	—80	7.—	—
Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weissfilzig behaarten Blättern.			
foetidum <i>rectangulum</i> <i>Rehder</i>	3.—	28.—	—
mit Topfballen Strauch 1½—4 m hoch mit langen Zweigen; Blätter elliptisch bis länglich, 4—6 cm lang, fast kahl oder mit wenigen, groben Zähnen nahe der Spitze. Früchte rot.			
Henryi <i>Hemsl.</i>	3.—	28.—	—
mit Topfballen Ein wertvoller, immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzend grünen, gesägten Blättern von 7½—12½ cm Länge und 2½—3½ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Blüte weiss, rispenartig, im Mai. Korallenrote Früchte.			
ichangense <i>Rehd.</i>	3.—	—	—
mit Topfballen Strauch mit schlanken Zweigen, die im ersten Jahr behaart sind. Blatt dünn, oval bis ovallanzettlich, bis 6 : 3 cm gross; oberseits gelb- lichgrün, leicht behaart, unterseits stärker behaart. Blütendolden gelb- lichweiss, 2—4 cm breit.			
lantanoides , siehe <i>anifolium</i> .			
Lentago <i>L.</i> (<i>V. prunifolium</i> <i>Hort.</i>)	1.—	—	—
Herrlicher Strauch mit glänzendgrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten, weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.			
nashii	3.—	—	—
mit Topfballen Niedriger, breitwachsender und immergrüner Strauch. Bela- bung klein, verkehrt langoval, weitgesägt; oberseits glänzend tief- grün, unterseits heller.			
obovatum <i>Walt.</i>	3.—	—	—
mit Topfballen Scharf riechender, kahler Strauch oder kleiner Baum, der 2 bis 3 m Höhe erreicht, mit aufstrebender Verästelung und dunkler, rauher Borke. Blätter 1½—6 cm lang, oberseits glänzend sattgrün, unter- seits heller, Früchte glänzend schwarz.			
Opulus <i>L.</i> Gemeiner Schneeball	—60	5.—	40.—
Starkwachsender Strauch, zierend durch die gelblichweissen Blütendolden und korallenroten Früchte.			
» edule	—70	6.—	—
Mit essbaren Früchten.			
» fructu luteo <i>Hort.</i>	—80	7.—	60.—
Wenig verbreitete Form mit goldgelb gefärbten Früchten.			
» sterile <i>Schmidt</i> (<i>V. Opulus roseum</i>). Bekannter Schnee- ball	—80	7.—	60.—
Sträucher			
Kronenbäumchen 40—60 cm bis zur Krone	1.20	10.—	90.—
» 60—80 » » » »	1.75	15.—	130.—
» 80—100 » » » »	2.50	22.—	200.—
» 100—120 » » » »	3.—	28.—	250.—
» 120—140 » » » »	3.50	32.—	300.—
Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen, kugligen Blütendolden im Mai—Juni.			

Empfehlenswerte Gehölze für Felsenpflanzung.

<i>Abelia rupestris hybrida.</i>	<i>Evonymus alata.</i>	<i>Mahonia Aquifolium.</i>
<i>Amelanchier levis pumila.</i>	» <i>nana Koopmanni.</i>	<i>Muehlenbeckia nana.</i>
» <i>rotundifolia.</i>	» <i>radicans.</i>	<i>Myrica asplenifolia.</i>
<i>Amorpha microphylla.</i>	» <i>vegeta.</i>	<i>Olearia Haastii.</i>
<i>Amygdalus nana.</i>	<i>Forestiera neomexicana.</i>	<i>Osmanthus Aquifolium.</i>
<i>Berberis actinacantha.</i>	<i>Genista praecox.</i>	» <i>Aquif. albo-marg.</i>
» <i>buxifolia.</i>	» <i>» alba.</i>	» <i>Delavayi.</i>
» <i>» nana.</i>	» <i>sagittalis.</i>	<i>Pachysandra terminalis.</i>
» <i>Darwini.</i>	» <i>tinctoria.</i>	» <i>term. variegata.</i>
» <i>empestrifolia major.</i>	» <i>» flore pleno.</i>	<i>Perowskia atriplicifolia.</i>
» <i>stenophylla.</i>	<i>Helianthemum.</i>	<i>Potentilla Friedrichseni.</i>
» <i>» latifolia.</i>	<i>Helwingia ruscifolia.</i>	» <i>fruticosa.</i>
» <i>Wilsonae.</i>	<i>Hymenanthera crassifolia.</i>	» <i>micrandra.</i>
<i>Calluna-Arten u. -Formen.</i>	<i>Hypericum inodorum.</i>	» <i>ochroleuca.</i>
<i>Corokia Cotoneaster.</i>	» <i>Moserianum.</i>	» <i>Veitchi.</i>
<i>Coronilla Emerus.</i>	» <i>patulum var. Henryi.</i>	<i>Prunus jap. alba pl.</i>
<i>Cotoneaster adpressa.</i>	<i>Ilex crenata.</i>	» <i>» rosea »</i>
» <i>buxifolia.</i>	» <i>» aureo-varieg.</i>	» <i>pumila.</i>
» <i>divaricata.</i>	<i>Jasminum Beesianum.</i>	<i>Ribes alpinum pumilum.</i>
» <i>Henryana.</i>	» <i>floridum.</i>	<i>Rubus illecebrosus.</i>
» <i>horizontalis.</i>	» <i>nudiflorum.</i>	<i>Ruscus aculeatus.</i>
» <i>humifusa.</i>	» <i>officinale.</i>	<i>Sarcococca humilis.</i>
» <i>praecox Nan Shan.</i>	<i>Kalmia glauca.</i>	» <i>pruniformis.</i>
<i>Crataegus pyrac. Lalandi.</i>	<i>Lespedeza bicolor.</i>	» <i>ruscifolia.</i>
<i>Cydonia Maulei.</i>	<i>Ligustrum ciliatum.</i>	<i>Spiraea alpina.</i>
» <i>» alpina.</i>	» <i>Delavayanum.</i>	» <i>bullata.</i>
<i>Cytisus kewensis.</i>	» <i>strongylophyllum.</i>	<i>Stephanandra incisa.</i>
» <i>purpureus.</i>	<i>Lithospermum fruticosum.</i>	» <i>Tanakae.</i>
<i>Dabeocia polifolia.</i>	<i>Lonicera Alberti.</i>	<i>Teucrium Chamaedrys.</i>
» <i>» alba.</i>	» <i>depressa.</i>	<i>Veronica coerulea glauca.</i>
<i>Decumaria barbara.</i>	» <i>myrtilloides.</i>	» <i>cupressinoides.</i>
<i>Desmodium penduliflorum.</i>	» <i>nitida.</i>	» <i>Hectori.</i>
<i>Empetrum nigrum.</i>	» <i>parvifolia.</i>	» <i>loganoides.</i>
» <i>scoticum.</i>	» <i>pileata.</i>	» <i>pinguifolia.</i>
<i>Erica-Arten u. -Formen.</i>	» <i>rupicola.</i>	<i>Viburnum utile.</i>

Sämtliche Zwergformen der Koniferen sind für Felsenpflanzung sehr geeignet. Siehe unter Koniferen.

Gehölze mit zierenden Früchten.

<i>Acer Ginnala.</i>	<i>Coriaria myrtifolia.</i>	<i>Elaeagnus edulis.</i>
» <i>tataricum aidzuense.</i>	<i>Cornus alba.</i>	<i>Eleutherococcus Simoni.</i>
<i>Akebia quinata.</i>	» <i>Baileyi.</i>	<i>Empetrum nigrum.</i>
<i>Amelanchier, Arten und Formen.</i>	» <i>mas.</i>	» <i>scoticum.</i>
<i>Aronia arbutifolia.</i>	<i>Corylus Colurna.</i>	<i>Evonymus, alle Arten.</i>
» <i>nigra.</i>	<i>Cotoneaster, viele Arten.</i>	<i>Gaultheria procumbens.</i>
<i>Aukuba japonica.</i>	<i>Crataegus Carrieri.</i>	» <i>Shallon.</i>
<i>Berberis, viele Arten.</i>	» <i>coccinea.</i>	<i>Gleditschia triacanthos.</i>
<i>Callicarpa-Arten.</i>	» <i>crusgalli.</i>	<i>Hippophaë rhamnoides.</i>
<i>Celastrus orbiculatus.</i>	» <i>glandulosa.</i>	» <i>salicifolia.</i>
<i>Colutea arborescens.</i>	» <i>pyracantha Lalandi.</i>	<i>Hymenanthera crassifolia.</i>
» <i>media.</i>	<i>Cydonia jap., in Formen.</i>	<i>Ilex Aquifolium.</i>
» <i>orientalis.</i>	» <i>lagenaria Wilsoni.</i>	» <i>Sieboldi.</i>
	<i>Decaisnea Fargesii.</i>	» <i>verticillata.</i>

Gehölze mit zierenden Früchten (Fortsetzung):

Ligustrum macrocarpum.» *ovalifolium*.» *Regelianum*.» *Stauntoni*.» *vulgare*.**Lonicera, alle Arten.****Lycium, » »****Magnolia acuminata.**» *hypoleuca*.**Mahonia Aquifolium.****Malus-Sorten.****Morus alba.****Pernettya mucronata.**» *nigra*.**Pernettya purpurea.****Prunus Laurocerasus.**» *lusitan. pyramidalis*.» *Padus*.» *spinosa*.**Rhamnus Frangula.****Rhus Cotinus.**» *typhina*.**Ribes aureum.****Rubus illecebrosus.**» *phoenicolasius*.» *polytrichus*.**Sambucus canadensis.**» *melanocarpa*.**Sambucus nigra.**» *racemosa*.» » *arborescens*.**Skimmia-Arten.****Sorbus-Arten u. -Formen.****Staphylea colchica.**» *pinnata*.**Symphoricarpus acutus.**» *orbiculatus*.» *racemosus*.**Symplocos crataegoides.****Vaccinium macrocarpum.****Viburnum, fast alle Arten**

Gehölze, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnen

Acer circinatum.» *Ginnala*.» *laetum rubrum*.» *nikoense*.» *palmatum*.» *platanoides*.» » *Reitenbachi*.» *tataricum*.**Amelanchier-Formen.****Ampelopsis-Sorten.****Aronia arbutifolia.****Azalea mollis-Hybriden.**» *pontica*-Hybriden.**Berberis Bretschneideri.**» *circumserrata*.» *dictiophylla*.» *Gagnepainii*.» *japonica*.» *Thunbergi*.» *umbilicata*.» *virescens*.» *Wilsonae*.**Betula alba.****Callicarpa Giraladiana.****Cercidiphyllum japonicum.****Cornus alba.**» *Baileyi*.» *florida*.» *Kesselringi*.» *pubescens*.» *sanguinea*.» *tatarica*.**Cotoneaster applanata.**» *bullata*.» *foveolata*.» *Henryana*.» *horizontalis*.» *moupinensis*.» *Simonsi*.**Crataegus Carrieri.**» *prunifolia*.**Deutzia crenata Pride of****Rochester.**» *gracilis eximia*.» » *campanulata*.**Diervillea splendens.****Evonymus alata.**» *americana angustifol.*» *europaea*.» *latifolia*.» *nana Koopmanni*.**Fagus sylv. purp. macroph.**» » *Zlatia*.**Forsythia suspensa Sieboldi.**» *viridissima*.**Fraxinus excelsior aurea.**» *Ornus*.**Hamamelis virginica.****Itea virginica.****Leucothoe axillaris.**» *Catesbaei*.**Liriodendron tulipifera.****Mahonia Aquifolium.****Malus florib. purpurea.****Myrica cerifera.****Parrotia persica.****Physocarpus opulifolius.****Prunus pumila.****Quercus coccinea.**» *imbricaria*.» *palustris*.» *pedunculata***Concordia.****Rhodora canadensis.****Rhus Cotinus.**» *typhina*.**Ribes floridum.**» *sanguineum*.» » *plenum*.**Sorbus discolor.**» *foliolosa*.» *pekinensis*.**Spiraea bullata.**» *jap. macrophylla*.» *Margaritae*.» *pumila glabra*.» *Vanhouttei*.**Stephanandra incisa.**» *Tanakae*.**Viburnum alnifolium.**» *Hessei*.» *Lentago*.» *prunifolium*.» *tomentosum sterile*.» *Wrighti*.

Immergrüne Gehölze.

„Immergrüne Laubgehölze“ von J. Mišák siehe vorletzte Umschlagseite.

Andromeda floribunda.» *japonica*.» *Rollinsoni*.**Aukuba japonica.****Azalea amoena Caldwelli.**» *Hinodegiri*.» *Omurasaki*.» *Tebotan*.**Berberis actinacantha.**» *buxifolia*.» » *nana*.» *Darwini*.

Immergrüne Gehölze (Fortsetzung):

Berberis empetrifolia major.	Gaultheria procumbens.	Phillyrea myrtifolia.
» Gagnepainii.	» Shallon.	» Vilmoriniana.
» Hookeri typica.	Hedera Helix-Formen.	Phyllodoce taxifolium.
» Neuberti.	Hymenanthera crassifolia.	Pittosporum heterophyllum.
» pruinosa.	Ilex Aquifolium u. Formen.	Prunus Laurocerasus und
» stenophylla.	» crenata u. Formen.	Formen.
» » latifolia.	» Pernyi.	» lus. pyramidalis.
» Veitchi.	Kalmia angustifolia.	Pyracantha Lalandi.
» Wilsonae.	» glauca.	Quercus austr. semp.
Bruckenthalia spiculiflora.	» latifolia.	Raphiolepis japonica.
Bryanthus taxifolius.	Laurus tinus fol. var.	Rhododendron, viele Arten
Buxus japonica.	Ledum latifolium.	und Formen.
» sempervirens.	Leucothoe axillaris.	Rubus Henryi.
» suffruticosa.	» Catesbaei.	Ruscus aculeatus.
Calluna-Arten.	Ligustrum Delavayanum.	Sarcococca humilis.
Choisya ternata.	» japonicum.	» pruniformis.
Corokia Cotoneaster.	» lucidum.	» ruscifolia.
Cotoneaster applanata.	» ovalifolium.	Skimmia japonica.
» buxifolia.	» stronglyphyllum.	» Rodgersi.
» Francheti.	Lithospermum prostratum.	» rubella.
» horizontalis.	Lonicera nitida.	Stranvaesia Davidiana.
» humifusa.	» pileata.	» undulata.
» salicifolia floccosa.	Lyonia calyculata.	Suaeda fruticosa.
» Simonsi.	Mahonia Aquifolium.	Teucrium Chamaedrys.
Crataegus pyrac. Lalandi.	Muehlenbeckia nana.	Vaccinium macrocarpum.
Dabeocia polifolia.	Olearia Haastii.	Veronica coerulea glauca.
» polifolia alba.	Osmanthus Aquifolium.	» cupressinoides.
Dryas octopetala.	» armatus.	» Hectori.
Elaeagnus macrophylla.	» Delavayi.	» loganioides.
» maculata aurea.	Pachysandra terminalis.	» pinguifolia.
» pungens albo marg.	» terminalis variegata.	Viburnum Davidi.
Empetrum nigrum.	Pachystigma myrsinites.	» foetidum rectangul.
» scoticum.	Pernetia mucronata.	» Harryanum.
Erica-Arten.	» nigra.	» Henryi.
Evonymus radicans.	» purpurea.	» nashii.
» radicans vegeta.	Phillyrea angustifolia.	» rhytidophyllum.
Garrya Fadyeni.	» latifolia.	» utile.
		Vinca minor.

Gehölze, die sich für schattige Lagen und für Unterholzpflanzung eignen.

Acer campestre.	Corylopsis pauciflora.	Ilex Aquifolium.
» tataricum.	» spicata.	Kalmia angustifolia.
Akebia quinata.	Crataegus monogyna.	Kerria japonica.
Alnus incana.	Decumaria barbara.	Laburnum-Sorten.
Amelanchier-Sorten.	Evonymus americana.	Ligustrum insulare.
Aristolochia-Arten.	» europaea.	» lucidum.
Ankuba japonica.	» radicans.	» ovalifolium.
Berberis, immergrüne Sor-	» » vegeta.	» Regelianum.
ten.	» verrucosa.	» vulgare.
Buxus sempervirens.	Fontanesia phillyreoïdes.	Lonicera gracilipes.
Carpinus Betulus.	Forsythia viridissima.	» Standishi.
Clethra alnifolia.	Garrya Fadyenii.	» tatarica.
Cornus alba.	Gaultheria procumbens.	» Xylosteum.
» mas.	» Shallon.	Lyonia calyculata.
» sanguinea.	Hedera Helix.	» » minor.

Gehölze für Unterholzpflanzung (Fortsetzung):

<i>Lyonia calyculata</i> nana.	<i>Rhamnus cathartica</i> .	<i>Sambucus nigra</i> .
<i>Mahonia Aquifolium</i> .	» <i>Frangula</i> .	» <i>racemosa</i> .
» <i>repens</i> .	» <i>imeretina</i> .	<i>Sarcococca</i> -Arten.
<i>Nuttallia cerasiformis</i> .	<i>Rhododendron</i> -Arten und	<i>Sorbaria sorbifolia</i> .
<i>Osmanthus Aquifolium</i> .	-Formen.	<i>Sorbus aucuparia</i> .
<i>Pachysandra terminalis</i> .	<i>Rhodotypus kerrioides</i> .	» <i>discolor</i> .
» <i>termin. variegata</i> .	<i>Ribes alpinum</i> .	<i>Spiraea chamaedrifolia</i> .
<i>Philadelphus coronarius</i> .	» » <i>pumilum</i> .	Formen.
» <i>Gordonianus</i> .	» <i>Grossularia</i> .	» <i>difformis</i> -Formen.
» <i>grandiflorus</i> .	» <i>sanguineum</i> .	<i>Staphylea pinnata</i> .
» <i>latifolius</i> .	» » <i>carneum</i> .	<i>Symphoricarpus acutus</i> .
» <i>pubescens</i> .	<i>Rubus fruticosus</i> -Formen.	» <i>orbiculatus</i> .
» <i>undulatus</i> .	» <i>illecebrosus</i> .	» <i>racemosus</i> .
<i>Physocarpus opulifolius</i> .	» <i>spectabilis</i> .	» » <i>pauciflorus</i> .
<i>Prunus Laurocerasus</i> .	<i>Ruscus aculeatus</i> .	<i>Tilia parvifolia</i> .
» <i>Padus</i> .	<i>Sambucus canadensis</i> .	<i>Viburnum Lantana</i> .
» <i>serotina</i> .	» <i>melanocarpa</i> .	» <i>Opulus</i> .
» <i>virginiana</i> .		

Empfehlenswerte Gehölze für Vogelschutzpflanzungen
als Nist- und Futtergehölze.

Vergleiche auch „Hecken- und Randpflanzungen“ von H. Schmidt, vorletzte Umschlagseite.

<i>Acer campestre</i> .	<i>Fraxinus Ornus</i> .	<i>Ribes alpinum</i> .
» <i>carpinifolium</i> .	<i>Gleditschia triacanthos</i> .	» <i>aureum</i> .
» <i>Ginnala</i> .	<i>Hedera Helix</i> .	» <i>Gordonianum</i> .
» <i>platan. globosum</i> .	<i>Hippophaë rhamnoides</i> .	» <i>Grossularia</i> .
<i>Alnus glutinosa</i> .	<i>Ilex Aquifolium</i> .	<i>Robinia neomexicana</i> .
<i>Amelanchier</i> -Sorten.	<i>Ligustrum ovalifolium</i> .	» <i>Pseudacacia</i> .
<i>Aronia arbutifolia</i> .	» <i>Regelianum</i> .	<i>Rubus frutic. albus plenus</i> .
» <i>nigra</i> .	» <i>vulgare</i> .	» <i>phoenicolasius</i> .
<i>Berberis</i> , alle Arten und	<i>Lonicera</i> , alle Arten und	<i>Sambucus canadensis</i> .
Formen.	Formen.	» <i>nigra</i> .
<i>Betula papyracea</i> .	<i>Mahonia Aquifolium</i> .	» <i>racemosa</i> .
<i>Buxus sempervirens</i> .	<i>Malus Niedzwetzkyana</i> .	<i>Sorbus</i> , alle Arten und
<i>Caragana arborescens</i> .	» <i>Sargenti</i> .	Formen.
<i>Carpinus Betulus</i> .	<i>Morus alba</i> .	<i>Spiraea</i> , alle Arten und
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> .	<i>Philadelphus coronarius</i> .	Formen.
<i>Clematis Vitalba</i> .	» <i>grandiflorus</i> .	<i>Staphylea colchica</i> .
<i>Colutea arborescens</i> .	» <i>latifolius</i> .	<i>Symphoricarpus</i>
<i>Cornus alba</i> .	<i>Physocarpus amurensis</i> .	» <i>orbiculatus</i> .
» <i>mas</i> .	» <i>opulifolius</i> .	» <i>racemosus</i> .
» <i>sanguinea</i> .	<i>Populus nigra fastigiata</i> .	<i>Syringa japonica</i> .
<i>Corylus Colurna</i> .	<i>Prunus Mahaleb</i> .	» <i>reflexa</i> .
<i>Cotoneaster</i> , alle Arten und	» <i>Padus</i> .	» <i>Rothomagensis</i> .
Formen.	» <i>serotina</i> .	» <i>vulgaria</i> .
<i>Crataegus</i> , alle Arten und	» <i>spinosa</i> .	<i>Tilia argentea</i> .
Formen.	<i>Ptelea trifoliata</i> .	<i>Ulmus campestris</i> .
<i>Cydonia japonica</i> .	<i>Quercus palustris</i> .	» <i>camp. umbraculifera</i> .
<i>Elaeagnus edulis</i> .	» <i>pedunculata</i> .	» <i>mont. Dampieri</i> .
<i>Evonymus europaea</i> .	<i>Rhamnus cathartica</i> .	<i>Viburnum alnifolium</i> .
» <i>latifolia</i> .	» <i>Frangula</i> .	» <i>Lantana</i> .
<i>Fagus sylvatica</i> .	<i>Rhus typhina</i> .	» <i>Opulus</i> .

Koniferen aller Art sind wertvolle Futterträger und ausgezeichnete Nistgehölze.
Siehe unter **Koniferen**.

Bienenfutter-Gehölze.

Wichtige Bienen-Nährpflanzen sind bei „Laubhölzer“ mit „B.“ bezeichnet.

<i>Acer dasycarpum.</i>	<i>Castanea vesca.</i>	<i>Quercus pedunculata.</i>
» <i>platanoides.</i>	<i>Colutea arborescens.</i>	<i>Rhamnus cathartica.</i>
» <i>Pseudoplatanus.</i>	<i>Cornus mas.</i>	» <i>Frangula.</i>
<i>Aesculus Hippocastanum.</i>	<i>Corylus</i> in Sorten.	<i>Rhododendron ferrugineum</i>
» <i>lutea.</i>	<i>Cotoneaster</i> in Sorten.	<i>Ribes Grossularia.</i>
» <i>Lyoni</i>	<i>Cydonia Maulei.</i>	<i>Robinia</i> in Sorten.
» <i>neglecta.</i>	<i>Erica</i> in Sorten.	<i>Salix</i> in Sorten.
» <i>Pavia arguta.</i>	<i>Fagus sylvatica.</i>	<i>Sorbaria.</i>
» » <i>atrosanguinea.</i>	<i>Forsythia</i> in Sorten.	<i>Spiraea ariaefolia.</i>
» <i>rubicunda.</i>	<i>Fraxinus Ornus.</i>	» <i>salicifolia</i> -Sorten.
<i>Ailanthus glandulosa</i>	<i>Genista scoparia.</i>	<i>Symphoricarpus.</i>
<i>Alnus</i> -Arten.	<i>Koelreuteria paniculata.</i>	<i>Syringa reflexa.</i>
<i>Amelanchier</i> -Arten.	<i>Lonicera Xylosteum.</i>	<i>Tilia</i> in Sorten.
<i>Amorpha fruticosa.</i>	<i>Mahonia Aquifolium.</i>	<i>Ulmus campestris.</i>
<i>Amygdalus nana.</i>	<i>Populus</i> in Sorten.	» <i>montana.</i>
<i>Berberis</i> in Sorten.	<i>Prunus serotina.</i>	<i>Vaccinium macrocarpum.</i>
<i>Calluna</i> in Sorten.		

Besonders rauchharte Gehölze für Industriegegenden.

<i>Acer campestre</i> mit Zuchtformen.	<i>Cephalanthus occidentalis.</i>	<i>Hydrangea hortensis.</i>
» <i>Ginnala.</i>	<i>Clematis</i> -Abarten von <i>Vitella und Vitalba.</i>	<i>Ilex.</i>
» <i>monspessulanum.</i>	<i>Clethra alnifolia.</i>	<i>Kalmia angustifolia.</i>
» <i>tataricum.</i>	<i>Colutea arborescens.</i>	» <i>latifolia.</i>
<i>Ailanthus glandulosa.</i>	<i>Cornus alba.</i>	<i>Laburnum vulgare.</i>
<i>Amelanchier alnifolia.</i>	» <i>mas.</i>	<i>Ligustrum.</i>
» <i>asiatica.</i>	» <i>pumila.</i>	<i>Liriodendron.</i>
» <i>canadensis.</i>	» <i>sanguinea.</i>	<i>Lonicera.</i>
» <i>vulgaris.</i>	» <i>sibirica.</i>	<i>Lycium barbarum.</i>
<i>Ampelopsis quinquefolia.</i>	<i>Corylus Avellana.</i>	» <i>europaeum.</i>
» <i>Veitchi.</i>	» <i>Colurna.</i>	» <i>chinense.</i>
<i>Amygdalus communis.</i>	» <i>americana.</i>	<i>Magnolia.</i>
» <i>Davidiana.</i>	<i>Cotoneaster acutifolia.</i>	<i>Mespilus germanica.</i>
» <i>nana.</i>	» <i>angustifolia.</i>	<i>Myrica.</i>
» <i>persica.</i>	» <i>horizontalis.</i>	<i>Philadelphus.</i>
<i>Andromeda japonica.</i>	» <i>microphylla.</i>	<i>Pirus (birnartige).</i>
» <i>glauc.</i>	<i>Crataegus altaica.</i>	<i>Platanus.</i>
<i>Berberis amurensis.</i>	» <i>hiemalis.</i>	<i>Populus.</i>
» <i>canadensis.</i>	» <i>dahurica.</i>	<i>Prunus acida.</i>
» <i>crataegina.</i>	» <i>monogyna.</i>	» <i>cerasus.</i>
» <i>densiflora.</i>	» <i>nigra.</i>	» <i>Laurocerasus.</i>
» <i>Regeliana.</i>	» <i>prunifolia.</i>	» <i>Mahaleb.</i>
» <i>vulgaris.</i>	<i>Cydonia japonica.</i>	» <i>spinosa.</i>
» <i>(Mahonia) Aquifolium.</i>	» <i>Maulei.</i>	<i>Ptelea trifoliata.</i>
» » <i>japonicum.</i>	<i>Daphne Mezereum.</i>	» <i>angustifolia.</i>
<i>Betula verrucosa atropurpurea.</i>	» <i>Cneorum.</i>	<i>Quercus rubra.</i>
<i>Buxus.</i>	<i>Elaeagnus angustifolia.</i>	» <i>pedunculata.</i>
<i>Calycanthus floridus.</i>	» <i>argentea.</i>	» <i>sessiliflora.</i>
<i>Carpinus Betulus.</i>	» <i>longipes.</i>	<i>Rhamnus.</i>
<i>Castanea vesca.</i>	<i>Evonymus atropurpurea.</i>	<i>Rhododendron.</i>
» <i>americana.</i>	» <i>europaea.</i>	<i>Rhus typhina.</i>
<i>Catalpa speciosa.</i>	» <i>japonica.</i>	<i>Ribes.</i>
» <i>atropurpurea.</i>	» <i>nana.</i>	<i>Robinia.</i>
	<i>Fagus sylvatica.</i>	<i>Rubus.</i>
		<i>Salix purpurea.</i>

Besonders rauchharte Gehölze für Industriegegenden (Fortsetzung):

<i>Salix caprea.</i>	<i>Spiraea Blumei.</i>	<i>Tilia tomentosa.</i>
» <i>fruticosa.</i>	» <i>bullata.</i>	» <i>euchlora.</i>
» <i>rosmarinifolia.</i>	» <i>Billardi.</i>	<i>Ulex europaeus.</i>
<i>Sambucus racemosa.</i>	» <i>Van Houttei.</i>	<i>Ulmus.</i>
<i>Spiraea opulifolia.</i>	» <i>pruinosa.</i>	<i>Viburnum Lantana.</i>
» <i>Thunbergi.</i>	<i>Symphoricarpus.</i>	<i>Vinca minor.</i>
» <i>Bumalda.</i>	<i>Syringa chinensis.</i>	<i>Yucca.</i>

Trauerbäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zenti- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Betula alba elegans pendula Pyramiden	200—250	—	3.50	30.—	—
Junge Bäumchen zeigen einen aufrechten Wuchs, erst ältere Exemplare erhalten den typischen Charakter. Die reich und fein verzweigten Äste hängen dann an den starken, seitlichen Ästen und Zweigen, mehrere Meter lang senkrecht abwärts.					
alba pendula Youngi. Trauerbirke.					
verpfl. mit { Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	6.—	55.—	—
3jähr. { » » » »	140—160	6—8	10.—	90.—	—
Kronen { » » » »	160—180	6—8	14.—	120.—	—
» » » »	180—200	6—8	18.—	160.—	—
Solitär- { verpfl. mit { » » » »	180—200	6—8	22.—	200.—	—
bäume { 4jähr. Kronen { » » » »	180—200	8—10	25.—	220.—	—
Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen.					
Caragana arborescens pendula <i>Dipp.</i>					
Hängender Erbsenbaum.					
Pyramiden	80—100	—	2.50	20.—	—
Höhe bis zur Krone	160—180	5—7	5.—	45.—	—
» » » »	180—200	5—7	6.—	55.—	—
Von langsamem Wuchs mit senkrecht hängenden Zweigen. Für kleine Gärten und als Einzelpflanzen.					
Fagus sylvatica pendula <i>Lodd.</i> Trauerbuche.					
Pyramiden	100—120	—	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone	80—100	8—10	8.—	—	—
» » » »	100—120	8—10	10.—	—	—
» » » »	200—220	8—10	22.—	—	—
sylvatica purpurea pendula nova. Trauerblutbuche Pyramiden	100—120	—	8.—	—	—
Höhe bis zur Krone	100—120	6—8	12.—	—	—
» » » »	200—220	8—10	25.—	—	—
Fraxinus excelsior pendula. Traueresche.					
Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	8.—	70.—	—
» » » »	200—220	12—14	10.—	90.—	—
» » » »	200—220	14—16	12.—	—	—
excelsior pendula variegata.					
Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	8.—	—	—
Schöne, buntblättrige Hängeform.					
parvifolia pendula <i>Hort.</i> (Fr. <i>lentiscifolia</i> <i>pendula Hort.</i>). Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	12.—	—	—
Sehr fein belaubte und stark hängende Traueresche.					

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zenti- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Laburnum alpinum pendulum Koch Hängender Goldregen.	180—200	5—7	6.—	—	—
Malus Exzellenz Thiel Späth Pyramiden Höhe bis zur Krone	100—120 120—140	— —	2.50 3.50	20.— 30.—	— —
Schöner Hänge- und Blütenbaum, der sich im Mai mit prächtigen, zart rosafarbenen Blüten bedeckt; Knospen lebhaft rot. Im Herbst zieren die zahlreichen, wachsgelben, rotbackigen Äpfelchen.					
pendula Elise Rathke. Höhe bis zur Krone	180—200	7—8	6.—	55.—	—
Stark hängender Trauerapfel, der grosse, prächtig gefärbte Früchte bringt.					
Pirus salicifolia pendula Hort. Höhe bis zur Krone	180—200	7—8	6.—	55.—	—
Schön hängende Trauerbirne mit weiden- artigen, silberweissen, filzigen Blättern* und reichem, weissem Blütenfior.					
Prunus japonica pendula flore roseo. Büsche Höhe bis zur Krone	60—80 100—120	— —	3.— 4.—	— —	— —
Die Triebe dieser kleinblättrigen Form sind anfangs horizontal ausgebreitet und hängen später elegant abwärts. Blüten einfach, rosa.					
serrulata Shidare Sakura Koehne ... Büsche Höhe bis zur Krone	40—60 100—120 120—140	— — —	2.50 4.— 5.—	24.— 38.— —	— — —
» » » » Mit schönen, langhängenden Blütenzweigen, Blumen gefüllt, rosa, prachtvoll.					
Quercus palustris pendula Pyramiden »	100—120 150—200	— —	5.— 10.—	— —	— —
Robur Dauvessei pendula. Trauerreiche. Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	12.—	—	—
Zierlich überhängende Form.					
rubra pendula Pyramiden	100—120	—	5.—	—	—
Salix atrovirens pendula (S. purpurea pendula) Höhe bis zur Krone	180—200 200—220 200—220	6—8 6—8 8—10	5.— 6.— 8.—	— 58.— 75.—	— 550.— —
» » » » Sehr feinzweigige Trauerweide.					
babylonica ramulis aurea pendula. Sträucher	80—100	—	—70	6.—	50.—
Hochstämme					
Sehr zierlich, hängend, mit goldgelben, dünnen Zweigen. Eine der schönsten Trauer- Goldweiden. Sehr hart.					
caprea pendula Hochstämme	180—200 200—220 200—220 200—220	6—8 6—8 8—10 10—12	6.— 7.— 8.— 10.—	— 65.— 75.— 95.—	— — — —
Schöne, breitblättrige Hängeweide mit pyra- midal gezogenen Kronen.					
Petzoldi pendula. Bastardtrauerweide. Sträucher	80—100	—	—70	6.—	—
Sacramentana. Sacramentaner Trauerweide. Sträucher	80—100	—	—70	6.—	50.—
Sieboldi Bl. Siebolds Trauerweide. Sträucher	80—100	—	—70	6.—	—
vitellina pendula nova. Trauerdotterweide. Sträucher	—	—	—70	6.—	—
Hochstämme					
»					
Wundervolle und dekorative Form mit langen, dünnen, gelb gefärbten Zweigen.					

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zenti- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Sorbus aucuparia pendula <i>Kirchner</i> .					
Trauererebesche, Höhe bis zur Krone	220—250	8—10	5.—	48.—	—
Ulmus montana horizontalis <i>Kirchner</i> .					
Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	8.—	70.—	—
» » » » »	200—220	12—14	10.—	90.—	—
Äste wagerecht abstehend.					
montana pendula . Trauerulme.					
2—3jähr. { Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	8.—	70.—	—
Kronen { » » » » »	200—220	12—14	10.—	90.—	—
Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen, dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert.					
parvifolia pendula Pyramiden	100—150	—	3.—	28.—	—
suberosa pendula Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	8.—	—	—
Mit korkiger Rinde, wagerechten Ästen und hängenden Zweigen.					

Schlingpflanzen.

Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Actinidia Lindley . Strahlengriffel (Dilleniaceae).				
arguta <i>Franch. & Sav.</i> Spitzblättriger Strahlengriffel	150—200	2.50	20.—	180.—
In Japan heimischer, hochkletternder Strauch mit eilänglichen, schönen, dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert. Liebt einen sonnigen, feuchten Standort.	200—250	3.—	25.—	—
Kolomikta Maxim. Mandschurischer Strahlengriffel	80—100	3.—	—	—
Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zweigen und breitellänglichen, anfangs hellbräunlichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass die Hälfte des Blattes im Anfange grünlich-weiss, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheint.				
purpurea <i>Rehder</i> . Neu mit Topfballen	30—40	5.—	—	—
Diese Art ist nahe verwandt mit <i>A. arguta</i> <i>Miquel</i> , welche sich hauptsächlich unterscheidet durch die breiteren, oberseits glänzenden Blätter, die stärker und breiter gezähnt sind, und durch die grösseren Blüten, sowie die grünlichgelbe, kugelige Frucht.				
Akebia Decaisne . Akebie (Lardizabalaceae).				
quinata <i>Dene</i>	150—200	2.50	24.—	—
Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit dunkelgrünen, 3—5 zähligen Blättern. Die schönen, violetten Blütentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.				
» rosea	200—250	3.—	28.—	—
Blütentrauben mehr rosa als die Art.				
Ampelopsis Michaux . Jungfernwine (Vitaceae).				
Die Ampelopsis sind harte, raschwachsende, genügsame Schlinger. Sie gedeihen sowohl sonnig als schattig gepflanzt in jedem, etwas feuchten Gartenboden. Viele Arten bekommen eine prachtvolle Herbstfärbung.				
aconitifolia dissecta <i>Koch</i>	150—200	1.50	—	—
Schöne, tiefgeschlitzte Belaubung.				
betulifolia	150—200	2.—	—	—
dumetorum laciniata <i>Sarg</i>	100—150	1.50	12.—	—
Sehr starkwachsende Varietät mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen. Eine noch neuere Art aus dem Arnold-Arboretum.				

	Höhe in Zentimetern	pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
Ampelopsis (Fortsetzung):				
Engelmannii Eng. Zierlich belaubte, selbstklimmende Art mit schöner, roter Herbstfärbung. Sehr schnell wachsend.	100—150	—60	5.—	40.—
hederacea D.C. Ebenfalls schöne, selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.	100—150	—60	5.—	—
Henryana . Panaschierter Jungfernwein Eine vollkommen harte, sehr schöne Art aus Zentral- china. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prach- tvoller Panaschierung. Eine äusserst wertvolle, neuere Einführung.	80—120	2.—	—	—
hirsuta Donn. Rauhaariger Jungfernwein Blatt gross, grobgezähnt, beiderseits tief dunkelgrün, unterseits auf den Nerven rauh behaart. In den Ver- einigten Staaten heimisch.	100—150	—60	5.—	40.—
macrophylla Hort. (A. quinquefolia latifolia Hort.) Sehr grossblättrige Form.	100—150	—80	7.—	—
Maximowiczii Hort. Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen, geteilten Blättern und schöner, roter Herbstfärbung.	100—150	—60	5.—	40.—
muralis , siehe A. radicansissima.				
pubescens Schlecht. Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.	100—150	—80	7.—	—
quinquefolia Mchx. 1000 St. M. 300.— Bekannter „Wilder Wein“ mit funfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	100—150	—50	4.—	35.—
radicansissima Schelle (A. muralis Leng.) Schöner, starkwachsender, sehr empfehlenswerter Selbstklimmer.	100—150	—60	5.—	40.—
St. Pauli Koehne Hochkletternder, starkwüchsiger Selbstklimmer mit grossen, im Herbst leuchtend scharlach gefärbten Blättern und zierlich überhängenden Sommerranken.	100—150	—60	5.—	40.—
Veitchii Hort. (A. inconstans Miqu.) Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern usw. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und purpurnen Farbentönen prangt.	40—60 80—120	—60 —80	5.— 7.—	40.— 60.—
» gigantea Hort. Eine äusserst kräftig wachsende Form mit viel grösseren Blättern als die Art, und deren Oberseite eine glänzende, sattgrüne Färbung hat.	40—60 60—80 80—100	—60 —70 —80	5.— 6.— 7.—	40.— 50.— 60.—
» Gloire de Boskoop Hort. Schöne Form, die ähnlich der A. Veitchii purpurea das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist.	40—60 60—80 80—100	—60 —70 —80	5.— 6.— 7.—	40.— 50.— 60.—
» purpurea Hort. Färbt sich im Herbst, drei Wochen vor A. Veitchii, purpurrot. Der junge Trieb hat das ganze Jahr über eine prachtvolle, rothbraune Färbung.	60—80 80—120	—70 —80	6.— 7.—	50.— 60.—
virginiana Hort. Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbstklimmer mit prächtigter Herbstfärbung.	100—150 200—250	—60 —70	5.— 6.—	40.— 50.—
Aristolochia . Osterluzei, Pfeifenblume (Aristo- lochiaceae).				
mandschuriensis mit Topfballen Mit hellgrüner, bis spät in den Herbst haltender Belaubung.	20—30	3.—	—	—
Sipho L. Herit. Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopf- ähnlichen, braungrünen Blüten im Juni und Juli. Sehr starkwachsend, für sonnige und schattige Lagen. Liebt feuchten, kräftigen Boden.	150—200 200—250	4.50 5.50	40.— 50.—	— —
Celastrus Linné. Baummörder (Celastraceae). Harte, anspruchslose Schlinger, die in jedem Garten- boden, halbschattig oder schattig, gut gedeihen. Sie klettern gern an Bäumen empor und sind besonders im Herbst mit den zahlreichen, auffallend gefärbten Früch- ten eine Zierde.				

Celastrus (Fortsetzung):

flagellaris Ruprecht mit Topfballen
Neuer, raschwachsender, völlig harter Schlingstrauch
aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen
wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern
usw. sehr geeignet ist.

hypoglaucæ Hemsl (*C. hypoleuca Warb*)
Bereifter Baummörder mit unterseits blauweiss bereiften
Blättern.

orbiculata Thunb.
In China heimischer, stark und hoch schlingender
Strauch mit eirundlichen, freudiggrünen Blättern und
sehr zierenden Früchten, die gelb und scharlachrot
gefärbt sind.

Clematis L. Waldrebe (*Ranunculaceae*).

Alle *Clematis* sind äusserst dankbar und schön-
blühende Schlinger für sonnige bis halbschattige Lagen.
Im allgemeinen anspruchslos, lieben sie doch einen tief-
gründigen, lockeren, humosen Boden. Empfindlich zeigen
sie sich gegen stehende Feuchtigkeit. Im Herbst ist ein
Anhäufeln des Wurzelstockes von grossem Vorteil.

Grossblumige Hybriden, in Sorten meiner Wahl:

Freilandpflanzen in starker, gesunder Ware.....

Diverse Sorten.

alpina Mill.
Prächtiger, bis 3 m hoher Schlinger mit violett-
blauen Blüten von Mai bis Juli. Zur Bekleidung von
Felsen wunderschön.

fragrans
Ähnlich *C. flammula*, Blättchen meist rundlich bis
stumpfspitz, durchschnittlich kleiner als die von *C.*
paniculata Früchte stets wie *C. flammula*.

glauca
Strauchig rankende Art, Blüten offen, mit ausgebrei-
teten Sepalen, rispige Blütenstände, gelblich, Juli bis
September. Blätter gefiedert, mit dreizähligen Blätt-
chen, kahl, blaugraugrün, Früchte langgeschwänzt.

graveolens Lindl. (*C. orientalis*)
Im Orient heimische Art mit doppelt oder einfach
gefiederter, blaugrüner Belaubung, Blüte klein, gelb, in
dichten Büscheln im Sommer. Ungemein starker Wachser.

integrifolia L.
Schön blaublühender Halbstrauch, wird 1 m hoch,
blüht ziemlich früh im Sommer.

ligusticifolia Nutt.
Hoher Schlingstrauch mit gefiederten Blättern und
weissen Blüten. Blütenstände etwa wie „*C. Vitalba*“.

montana Budh.
Sehr hochkletternd. Die weissen, bis etwa 5 cm
breiten Blüten erscheinen im Mai.

» **rubens Jovin.**
Neue Sorte, aus den Gebirgen Zentralchinas ein-
geführt. Von gleichem Bau und gleicher Belaubung als
C. montana. Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen
rosa, sehr reich blühend.

orientalis, siehe *C. graveolens*.

paniculata Thunb.
Völlig winterharter und sehr schnellwachsender
Schlingstrauch, der im September eine Unmasse von klei-
nen, weissen, wohlriechenden, in rispenartigen Blüten-
ständen zusammengesetzten Blumen hervorbringt, welche
die Pflanze fast vollständig bedecken.

recta
Halbstrauch mit kleinen, weissen Blumen.

Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
20—30	3.—	—	—
100—150	4.—	—	—
100—150	1.—	9.—	80.—
150—200	1.50	12.—	100.—
200—250	2.—	15.—	120.—
100—150	3.—	25.—	—
60—80	1.50	—	—
150—200	1.50	14.—	—
150—200	1.50	14.—	120.—
150—200	1.50	14.—	—
60—80	1.50	14.—	—
150—200	1.—	9.—	—
200—250	1.50	14.—	—
80—120	2.—	18.—	—
80—100	2.50	24.—	—
100—150	1.—	9.—	80.—
150—200	1.20	10.—	90.—
60—80	1.50	14.—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Clematis (Fortsetzung):				
<i>serratifolia</i> Rehder.	150—200	1.50	14.—	—
Kletternder kahler Strauch mit gefurchten Zweigen und doppelt dreizähligen Blättern auf 4—8 cm langen Stielen, Blättchen eilanzettlich bis länglichlanzettlich, scharf und ungleich gesägt, beiderseits grün, unterseits glänzend. Blüten gelb, ziemlich gross, schwach duftend, nickend, in achselständigen, 1—3blütigen, $\frac{1}{2}$ —1 cm lang gestielten Cymen. Sehr selten.				
<i>tangutica</i> Andr.	60—80	2.—	18.—	—
Die Blumen sind prächtig goldgelb, vier Blumenblätter, etwa 40 mm lang und 18—20 mm breit, sehr effektiv. Sie ist durchaus winterhart, starkwachsend und reichblühend.				
<i>Vitalba</i> L.	150—200	—,70	6.—	50.—
Hochrankend, grünlichweiss, zur Bekleidung von Mauern, Lauben usw.				
<i>Viticella</i> L.	200—250	—,80	7.—	60.—
Kleinblumig, blau.				
<i>Viticella</i> L.	100—150	2.—	18.—	—
Cocculus de Cand. Kockel (Menispermaceae).				
<i>carolinus</i> de Cand.	100—120	3.—	—	—
Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze zu allmählich verschmälerten Blättern. Blüten im Juli und August, grünlich oder rötlich, in wenigblütigen Trauben.				
Glycine , siehe Wistaria.				
Hedera Linné. Efeu (Araliaceae).				
<i>Helix angularis aurea</i> Hort.	100—120	2.50	—	—
Blatt meist dreilappig, 4:4 cm gross, hellgelb mit grüner Aderung, bisweilen reingelb oder sattgrün. Schöne, auffallende Färbung, guter Wuchs.				
» <i>aureo-variegata</i> Hort.	100—120	2.50	—	—
Belaubung 3—5lappig, bis 6:5 cm gross, im Durchschnitt aber kleiner. Färbung mehr oder weniger grünlichgelb mit grüner Aderung. Wuchs mittelstark.				
» <i>hibernica</i> C. Koch	40—60	—,70	6.—	50.—
Schottischer Efeu mit grossen, bis 16 cm breiten, dunkelgrünen, lederartigen Blättern. Für Bepflanzung von Mauern usw. sehr zu empfehlen.				
» <i>sagittifolia</i>	40—60	2.—	—	—
Blatt meist 3-, seltener 5lappig, 7:4 cm gross; Mittellappen sehr lang und gleichmässig breit, oberseits glänzend dunkelgrün, Unterseite heller.				
» <i>spectabilis aurea</i>	40—60	2.—	18.—	—
Das 3-, selten 5lappige Blatt ist bis 6:6 cm gross, teils schwefelgelb, teils gelblichgrün mit grüner Aderung. Wuchs gut.				
<i>spectabilis aurea</i>	100—120	2.50	20.—	—
Lonicera L. (Caprifolium) Gaisblatt (Caprifoliaceae).				
Sämtliche Loniceren sind kräftig wachsende, dankbar blühende Schlinger zur Bekleidung von Laubengängen, Säulen, alten Bäumen usw. Sie lieben einen etwas feuchten, guten Gartenboden. Die Blütezeit beginnt meist im Juni, häufig bis zum Herbst anhaltend.				
<i>alseuosmoides</i> Graebner.	150—200	3.—	—	—
Schöner Schlinger mit braunroten Zweigen. Blätter lanzettlich bis schmallanzettlich, am Grunde meist in den 3—5 mm langen Stiel verschmälert, etwas dicklich, beiderseits kahl, nur am Rande gewimpert. Blüten meist an der Spitze der Zweige gehäuft, kurzgestielt, orangerot.				
<i>Caprifolium major</i> (L. magnevilla)	200—250	4.—	—	—
Mit schönen, gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.				
» <i>Hybriden</i> , ohne Namen	100—150	3.—	28.—	—
Mit schönen, gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.				
» <i>Hybriden</i> , ohne Namen	100—150	1.50	12.—	—
Mit schönen, gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.				
» <i>Hybriden</i> , ohne Namen	150—200	2.—	18.—	150.—
<i>ciliosa</i> Plantierensis	100—150	4.—	—	—
Zeichnet sich durch ihre schönen, leuchtend korallenroten Blüten aus.				

Lonicera (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Douglasii Blumen rötlichgelb.	80—100	2.—	—	—
etrusca Savi Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.	100—150 80—120	3.— 2.—	—	—
» major Form mit grösseren Blüten als die Art.	180—200	3.—	28.—	—
flexuosa aureo-reticulata Sehr hübsche Varietät mit goldgelb genetzter Be- laubung.	100—150	2.50	—	—
glauca Hill Mit sehr grossen, breitlänglichen, oberseits dunkel- grünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blumen im Mai, grünlichgelb mit rötlichen Streifen.	100—150	3.—	28.—	—
Henryi Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden worden ist. Blätter ausdauernd, bronziert grün. Blüten rötlichbronzefarbig.	150—200	3.—	28.—	—
Periclymenum L. Blüte gelblich, wohlriechend, von Juni bis September.	150—200 200—250	2.— 2.50	15.— 20.—	120.— 180.—
» hybrida nova L. Sehr starkwachsende, gelbblühende Form.	150—200 200—250	2.50 3.—	20.— 28.—	—
» quercifolia Hort. (L. sylvatica) Mit schönen, eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbblühend.	100—150 150—200	2.— 2.50	15.— 20.—	—
» semperflorens Eine sehr dankbar blühende Form, deren reicher Flor hellschwefelgelber Blüten den ganzen Sommer über anhält. Knospen oliv.	100—150	3.—	—	—
» serotina Ait. Blüht etwas später und reicher als die vorige Varietät. Blütenknospen olivrötlich. Schlund weissrosa, gelb verblühend.	100—150 150—200	2.— 2.50	18.— 24.—	—
Standishi lancifolia Rehd. Wenig schlingende, halbimmergrüne Art.	80—100	1.50	—	—
subaequalis Rehd. mit Topfballen Kahler Schlinger, Blätter kurz gestielt, elliptisch bis verkehrt eilänglich, stumpf, das oberste Blattpaar in eine elliptische, beiderseits spitze Scheibe verwachsen. Blüten trichterig.	30—40	3.—	—	—
Sullivantii Asa Gray Sehr schöne Art mit rotgelben Blüten, gehört zu <i>L. glauca</i> , ganz hart.	100—150 150—200	2.— 2.50	18.— 24.—	—
Lycium L. Bocksdoorn (Solanaceae). Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder über- hängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den gan- zen Sommer hindurch rötlichviolett blühend und im Herbst sehr zierend durch die korallenroten Beeren. Lieben sonnige, trockne Lage.				
chinense Mill. Chinesischer Bocksdoorn In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hell- grüner Belaubung. Sehr zierend sind die bis 2 cm langen, scharlachroten Beeren.	60—80	1.50	12.—	100.—
Menispermum L. Mondsame (Menispermaceae). canadense L. mit Topfballen Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit 3—7 lappigen, dunkelgrünen Blättern und grünlichweissen Rispen im Juni und Juli.	40—60	2.50	—	—
dauricum D. C. (M. dahuricum) Steht <i>M. canadense</i> nahe, unterscheidet sich jedoch sofort durch das Blatt. Dieses sitzt dem Stiel nicht am Rande auf, sondern mehr oder weniger nach der Mitte zu; ebenfalls ist es hübsch rötlich gerandet.	40—60	3.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Polygonum L. Knöterich (Polygonaceae).				
Aubertii Henry	120—150	2.—	18.—	150.—
Erstaunlich starkwachsende Art, die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen erscheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige im Sommer und Herbst.				
Baldschuanicum Regel	100—120	2.—	18.—	—
Sehr wertvoller und starkwachsender Schlingstrauch, der sich von Juni bis in den Herbst hinein mit langen, rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.				
Rubus , siehe unter Laubbölzer.				
Schizandra Richard (Magnoliaceae).				
chinensis C. Koch (Maximowiczia chinensis Ruprecht)	40—60	3.—	—	—
Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch. Die etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunkler Farbe. Die rötlichen, wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.				
Wistaria Nutt. (Glycine.) (Leguminosae.)				
sinensis D. C.	100—150	3.—	25.—	200.—
Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blättern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blütentrauben von blauer Farbe hervorbringt. Liebt warme, sonnige und geschützte Lage, woselbst sie aber Unmengen Blumen hervorbringt.				
	150—200	3.50	30.—	280.—

Gartengestaltung und Pläne

hierfür werden von mir nicht ausgeführt, da ich kein Gartenarchitekturbüro unterhalte. Durch meine vielseitigen Beziehungen zu maßgebenden Gartenarchitekten der verschiedensten Gegenden Deutschlands bin ich jedoch in der angenehmen Lage, meiner sehr verehrten Kundschaft Gartenarchitekten nachzuweisen, die alle diesbezüglichen Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit des geschätzten Auftraggebers erledigen werden.

Für die hiesige, nähere Umgebung — Oldenburg, Ostfriesland, Westfalen und Münsterland — bitte ich, sich direkt an Herrn **Josef Hempelmann**, Gartenarchitekt (D. W. B.), staatl. dipl. Gartenbauinspektor, **Schellohne**, Post Lohne i. Oldbg., wenden zu wollen, da er gerade mit den besonderen Verhältnissen dieser Gebiete bestens vertraut ist.

Stauden

oder winterharte, perennierende Freiland-Pflanzen.

Wertvolle Bienennährpflanzen sind mit „B“ bezeichnet.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde Band I: „Unsere Freilandstauden“ sowie „Der Blütengarten der Zukunft“, neueste Auflage, siehe vorletzte Umschlagseite.

Alle von mir angebotenen Stauden werden in besonders gut kultivierten, kräftigen

Pflanzen geliefert.

Durch fortwährende Prüfung der grossen Sortimente bin ich in der Lage, nur wirklich gute und charakteristische Sorten anzubieten.

Stauden können, soweit es sich nicht um holzartige handelt, nur als Frachtgut oder Eilgut zu den jeweiligen Tarifsätzen befördert werden. Sollte mir vom Besteller keine diesbezügliche Anweisung gegeben sein, so handle ich von Fall zu Fall nach meinem Ermessen.

Bei Abnahme von 50 Stück und mehr von einer Art und Sorte wird der Hundertpreis berechnet. Bei grösseren Mengen Preise auf Anfrage.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

Die Mannigfaltigkeit meiner Staudensammlung gewährleistet schönste Zusammenstellung der Sortimente.

100 Stauden für Schnitt und Rabatten in 10—15 guten Sorten	M. 30.—
100 » Mauer- und Einfassungssorten	» 20.—
100 » bessere Felsenpflanzen und alpine Stauden	» 25.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acaena , Stachelnüsschen. Rosaceen.			
Buchanani Silbrig, blaugrüne Polster bildend, kleinblättriger als die nachfolgenden Arten.	—30	2.50	—
glauca Blaugraue Polster bildend, sehr wüchsig, Nüsschen sehr zahlreich etwa 10 cm über dem Laub tragend, Juni—Juli.	—25	2.—	—
novae-zeelandiae Laub grün, grösse, rote Stachelnüsschen direkt auf dem Laub tragend.	—25	2.—	18.—
Acanthus , Bärenklau. Acanthaceen.			
spinosus, B. Hübsche Art mit tief eingeschnittenen, weissbedornen Blättern. Blüten im Juli—August rosig-fleischfarben, in stark bewehrten Blütenähren von 50—100 cm Höhe. Standort sonnig, etwas feucht.	—30	2.50	—
Achillea , Schafgarbe, Edelgarbe. Kompositen.			
argentea Niedrig bleibende, rasenbildende Staude mit reinweissen Blumen im Juni und weissfilziger Belaubung.	—30	2.50	20.—
aurea Niedrige Schafgarbe mit feinzerteilter, grauer Belaubung und goldgelben Blütendolden, Juli—August, 20—30 cm.	—30	2.50	—
Eupatorium Parkers Var. (A. filipendulina) Fast meterhohe, sehr reichblühende und wirkungsvolle Staude mit grossen, goldgelben Blütendolden. Ende Juni—Herbst. Abgeschnitten sehr lange haltbar.	—40	3.50	30.—
grandiflora Grossgefiederte, aromatisch duftende Blätter, junge leicht grau-filzig, bis 80 cm hoch, Blüte weiss, Mai—Juni.	—40	—	—
lingulata Blattrosette niedrig, frischgrüne Zungenblätter, Blütenstände bis 40 cm, schön weiss, Juni.	—50	—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Achillea (Fortsetzung):			
millefolium Cerise Queen (Kirschkönigin)	—35	3.—	28.—
Unverwüstliche, sehr dankbare Schnittblume, leuchtend kirschrot. Mitte Juni. Etwas heller und früher als Kelwayi.			
» Kelwayi	—35	3.—	28.—
Ähnlich Ach. millef. Cerise Queen, jedoch dunkler und etwas später. Ende Juni—Juli.			
Ptarmica plena	—40	3.50	30.—
Mit hübschen Dolden von gefüllten, weissen Blüten. Vorzüglich zum Schnitt, gut remontierend, 50—80 cm, Ende Juni—August.			
» plena The Pearl	—45	4.—	38.—
Blüht etwas später, aber ist im Wuchs kräftiger, Einzelblüten fester und kugelig. Remontiert sehr gut, Höhe 60 cm, Juli—Herbst.			
Aconitum , Eisenhut, Wolfshut, Sturmhut, B. Ranunculaceen-			
Fischeri	—50	4.50	40.—
Prächtig leuchtend ultramarinblaue Blüten an 50—100 cm langem, unverzweigtem Schaft. September. Laub sehr dekorativ, lackglänzend, tief dunkelgrün.			
Napellus bicolor , „Venuswagen“	—40	3.50	30.—
Sehr üppige, blau-weiße Form, bis 1,50 m, Juli.			
» hybridus praecox	—50	4.—	—
Schöne, blaue Form, frühblühend.			
pyramidale (A. Stoerkeanum)	—40	3.50	30.—
Seidenartig, tief ultramarinblaue Blüten in langen, pyramidalen Rispen, auf dichtbelaubten Trieben, 100—180 cm, Juni—August, Wurzelstock rettigförmig.			
rostratum coeruleum	—40	3.50	30.—
Leuchtend blau.			
septentrionale	—40	3.50	30.—
Schöne, blaue Blumen an meterhohem Stengel.			
Spark's Var.	—40	3.50	30.—
Wohl die dunkelste aller Sorten, bis 150 cm, Juni—August, tief dunkelblau, straffer Wuchs.			
volubile	—40	3.50	30.—
Laub tief 5—7teilig, Blüten violett, zu wenigen hängend. August. Knolle haselnussgross.			
» tenuisectum	—50	4.50	40.—
Wenig rankend, nur leicht überhängend, mit fein zerschnittener Belaubung und schönen, blauen Blumen im August.			
Wilsoni	—60	5.—	—
Spätblühende, hochwachsende Sorte mit lichtblauen Blüten in langen, kräftigen Rispen, Einzelblüten gross, blüht mit A. Fischeri, September—Oktober. Sehr wirkungsvoller Spätblüher.			
Actaea , Christophskraut. Ranunculaceen.			
alba	—60	5.—	—
Bis 1 m hoch, scharf eingeschnittene, mehrfach gefiederte Blätter, Blütenähren kürzer als bei Cimicifuga, Beerenstand weiss, sehr wirkungsvoll.			
Actaea , siehe weiter auch Cimicifuga.			
Adonis , Adonisröschen, Feuerröschen, Teufelsauge. Ranun- culaceen.			
amurensis, B.	—60	5.—	—
Blüht Februar—März mit schönen, goldgelben Blüten auf etwa 20 cm hohen Stielen. Für sonnigen, humosen Boden.			
» plena	—70	6.—	—
Kräftigwachsend, mit fein zerschlittem Laub und großen, ge- füllten, gelben Blüten, März—April. Nicht ganz so lebhaft leuchtend wie die einfache Art, aber auch sehr schön.			
Aetheopappus , Kaukasus-Kornblume, Flockenblume. Kom- positen.			
pulcherrimus (Centaurea pulcherrima)	—50	4.—	35.—
Hübsche, buschige Staude mit unterseits grauweiss-filzigen Blättern und langgestielten, äusserst haltbaren, 5—8 cm breiten, rosapurpurnen, kornblumenähnlichen Blüten. Für guten, nicht zu feuchten Gartenboden.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Agrostemma , Rade, Lichtnelke, Vexiernelke. Caryophyllaceen.			
<i>coronaria atropurpurea</i> (Lychnis coron. atropurp.)	— .25	2.—	—
Die länglichen Blätter sind sehr schön silbergrau, filzig. Die einer einfachen Nelke ähnlichen Blüten sitzen auf 60—90 cm hohen, verzweigten Blütenstielen. Blüten tief blutrot. Für sonnige, trockene Lagen. Juli—August.			
Ajuga , Günsel. Labiataen.			
<i>reptans atropurpurea</i>	— .25	2.—	18.—
Harte, heimische Staude mit oberirdisch kriechenden Ausläufern, purpurnem Laub und bläulichen Blüten, bis 15 cm, Mai—Juni.			
» <i>multicoloris</i>	— .25	2.—	18.—
Sehr bunt belaubte Sorte, stark wachsend.			
Alchemilla , Frauenmantel, Linau. Rosaceen.			
<i>alpina</i>	— .40	3.—	—
Zierlich belaubte, niedrige Staude mit runden, silbergraugrünen Blättern, kleinen, gelben Blüten in dichten Doldentrauben. Buschige Steingartenstaude für Halbschatten. Höhe 5—10 cm, Juni—August.			
Allium , Lauch. Liliaceen.			
<i>cyaneum</i>	— .30	2.50	—
Aus dichten Büscheln dunkelgrüner, grasartiger Belaubung erheben sich die ca. 20 cm hohen, kornblumenblauen Blütenköpfchen von Juni—August. Sehr reichblühend, Köpfchen nickend.			
<i>flavum</i>	— .30	2.50	—
Schönste, heimische Art, blaugraues, schmales Laub und gelbe, nickende Blüten. Williger Wachser. 40 cm, Juli.			
<i>pulchellum</i>	— .40	—	—
Lockere Blütendolden, leuchtend lilarot, 30—40 cm, August. Eigenartig schön.			
Alyssum , Steinkraut. Cruciferen.			
<i>saxatile</i> (A. Arduini), B. mit Topfballen	— .40	—	—
Blätter grau, weichfilzig, Blüten leuchtend goldgelb, 30—40 cm hoch, April—Juni, für den Felsengarten.			
» <i>citrinum</i> , B. mit Topfballen	— .40	3.—	—
Sehr schöne Form mit prächtigen, hellschwefelgelben Blütensträussen. Stark verzweigt, Triebe grün, weissfilzig behaart, sehr reichblühend, 30 cm hoch, April—Mai, für sonnige Felspartien.			
» <i>compactum</i> , B.	— .40	3.—	28.—
Blüten tiefgelb, nur 20 cm hoch, wertvoll.			
» <i>plenum</i> mit Topfballen	— .50	4.50	—
Prächtige Erscheinung von kurzem, dichtem Wuchs u. dichtgefüllten, goldgelben Blüten, 15—20 cm hoch, April—Mai.			
Anchusa , Ochsenzunge. Boraginaceen.			
<i>Barrelieri</i>	— .30	—	—
Staude mit kleinen, dunkelblauen Blüten im Mai—Juli an bis 75 cm hohen Trieben. Standort feucht, sonnig.			
<i>italica</i> Dropmore Variety	— .40	3.50	30.—
Wundervoll leuchtend dunkelblaue Blüten an reichverzweigten Trieben, bis gut 1 m hoch, Juni—Sept. Von bester Wirkung zusammen mit roten und gelben Stauden.			
» <i>Lissadell</i>	— .40	—	—
Der vorigen sehr ähnlich, etwas früher.			
» <i>Opal</i>	— .40	3.50	30.—
In Wuchs und Haltung ähnlich „Dropmore“, aber in Blume opalblau, also bedeutend heller. Sehr weiche Farbe.			
<i>myosotidiflora</i>	— .40	3.—	25.—
Vergissmeinnichtähnliche Blüten in reicher Fülle, 50—75 cm hohe Blüentriebe, April—Mai, Laub gross und tiefgrün. Empfehlenswert für Halbschatten.			
Androsace , Mannsschild. Primulaceen.			
<i>Laggeri</i> (A. carnea var. Laggeri)	— .50	4.50	40.—
Kleine, dichte, rasenbildende Pflanze, zierlicher und wertvoller als A. carnea. April—Mai, dunkelrot, nur wenige Zentimeter hoch.			
<i>primuloides</i>	— .50	—	—
Blüten rosa, grösser als bei A. sarmentosa, schöne, silberige Blattrosette, üppig wachsend, Ausläufer treibend, ähnlich Sempervivum.			

Anemone. Ranunculaceen.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
borealis	—20	1.80	—
Ähnlich <i>A. dichotoma</i> , aber kleinblumiger und früher, sehr stark wachsend.			
canadensis (<i>A. dichotoma</i> , <i>A. pennsylvanica</i>).....	—25	2.—	—
Blütenstände locker, Blüten bis 4 cm Durchmesser, reinweiss, Höhe etwa 40—50 cm.			
hupehensis , (<i>A. japonica hupehensis</i>).....	—40	3.50	—
Sehr reichblühend, leuchtend malvenrosa, Aug.—Sept., vor den anderen <i>A. japonica</i> -Sorten.			
japonica alba , siehe <i>A. jap. Honorine Jobert</i> .			
» Alice	—45	4.—	—
Verbesserung der „Königin Charlotte“, silbrig lilarosa Blüten extra gross mit 2 Reihen Blütenblättern, innen rosarot, nach aussen lilarosa mit hellem Rand Sept.—Nov.			
» elegans	—45	4.—	35.—
Sehr reichblühende, niedrigbleibende, dunkelrosa Sorte			
» Honorine Jobert (<i>A. jap. alba</i>).....	—40	3.50	30.—
Einfach weisse Sorte, grossblumig.			
» Kriemhilde	—60	5.50	50.—
Blumen halbgefüllt, rötlich fiederfarben, hübsch schalenförmig, 9—10 cm Durchmesser. Auffallend reine, klare Farbe auf festen, starken Stielen.			
» Luise Uhink	—45	4.—	35.—
Ausserordentlich kräftig wachsende Anemone mit grosser Belaubung und sehr grossen, edlen, reinweissen Blumen, gefüllt blühend. Sehr eindrucksvoll.			
» Max Vogel	—50	4.50	40.—
Dunkelrosa.			
» Prinz Heinrich	—50	4.50	—
Dunkelrot, halbgefüllt, etwa 40 cm hoch.			
» Schneekönigin (Neuheit 1924).....	1.50	12.—	—
Auffallende, wertvolle Verbesserung der <i>A. jap. Luise Uhink</i> , grösser, regelmässiger im Blütenbau, reichblühender, wüchsiger. Blütenfarbe prächtig reinweiss, 9—10 cm Durchmesser.			
nemorosa alba , B.	—30	2.50	20.—
Gewöhnliche, weissblühende Waldanemone, März—April, im Park in Massen unter Bäumen.			
» alba plena	—50	4.—	—
Weissegefüllt, spätblühend, sehr zierliches Blümchen, 2½—3 cm Durchmesser, äussere und innere Kronenblätter verschieden gross, daher sehr nettes Aussehen.			
» coerulea Robinsoni , B.	—35	3.—	28.—
Zart hellblau blühendes Buschwindröschen, später blühend als alle anderen Sorten. Für Halbschatten und frischen Boden, Höhe 10 cm, April—Mai, herrlich im Park in Massen, sehr reichblühend, Blumen bis 4 cm Durchmesser.			
» rosea , B.	—30	2.50	20.—
Rosa und früh blühend.			
pennsylvanica , siehe <i>A. canadensis</i> .			
Pulsatilla (<i>Pulsatilla vulgaris</i>).....	—45	4.—	35.—
Küchenschelle oder Osterblume mit grossen, hellvioletten Blüten, liebt sonnigen Standort. Die mehrfach gefiederten Blätter entwickeln sich erst nach der Blüte, Höhe 15 cm, Blüte aufrecht, weit geöffnet, April, fürs Alpenum.			
sylvestris	—45	4.—	—
An <i>A. japonica</i> erinnernd, Blüten weiss, nickend, duftend, liebt kalkhaltigen Boden, verträgt Schatten. Sehr frühblühende Schnittblume, Höhe 25 cm, Mai—Juni.			
» plena (<i>A. Elise Fellmann</i>).....	—50	—	—
Weisse, dichtgefüllte Blüten. Haltbare Bindeblume. Liebt kalkhaltigen Boden und Halbschatten. Höhe 30—40 cm, Mai—Juni.			
Antennaria , Fühlhorn, Katzenpfötchen. Kompositen.			
margaritacea (<i>Antennaria margaritacea</i> , <i>Gnaphalium margaritaceum</i>). Katzenpfötchen.....	—30	2.50	20.—
Strohblumenartige Blüthen mit weisslich glänzenden Hüllblättern und gelber Scheibe in unregelmässigen Doldentrauben, Laub weissfilzig, ungefähr 50 cm hoch, Juli—August, für trockene, sonnige Lagen.			

Antennaria (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
<i>tomentosa</i>	—25	2.—	15.—

Beste und schönste für ganze Rasen oder Teppiche. Blätter silbergrau, Blütenköpfchen weiss, etwa 10 cm hoch. Mai—Juni.

Anthemis, Kamille. Kompositen.

<i>Kelwayi</i>	—35	3.—	—
Harte, aromatisch duftende Pflanze, Laub fein zerschnitten, Blüten tief goldgelb, sehr dankbar und reichblühend, vom Aussehen einer gelben Marguerite. Höhe 50—80 cm, Juli—Frost. Für sonnige Lagen, wertvoll für Schnitt.			
» <i>alba</i>	—35	3.—	—
Weissblühende Form.			
» <i>pallida</i>	—35	3.—	—
Wie vorige, nur Blüten blassschwefelgelb.			

Anthericum, Graslinie, Zaunlilie. Liliaceen.

<i>Liliastrum major</i> , St-Bruno-Lilie, B.	—40	3.50	30.—
Blüten weiss in einseitwendiger Ähre, grossglockig, duftend, bis 50 cm hoch, Mai—Juni.			
<i>ramosum</i> (<i>A. graminifolium</i>)	—40	3.50	—
Blüten rispig, zierlich, mit zahlreichen, kleinen, weissen, Blüten besetzter Blütschaft, schön verzweigt, Höhe 50—80 cm, Juni—Juli.			

Apios (*Glycine Apios*), Erdbirne. Papilionaceen.

<i>tuberosa</i>	—50	4.50	—
mit Topfballen Mit knolligen Wurzeln, unpaarig gefiederten, fünf- bis siebenzähligen Blättern und ziemlich unansehnlichen, düsterroten Blüten, in Büscheltrauben, gut duftend. Bis 2—3 m hoch schlingend. Wuchert stark!			

Aquilegia, Akelei. Ranunculaceen.

<i>Hybriden</i>	—30	2.50	20.—
In schöner Farbenmischung.			

Arabis, Gänsekresse. Cruciferen.

<i>alpina</i> (<i>A. albida</i> , <i>A. caucasica</i>), B.	—25	2.—	18.—
Einfassungspflanze, die im zeitigen Frühjahr einen reichen Flor weisser Blumen bringt, 15—20 cm hoch, für sonnige, trockene Lagen.			
» <i>plena</i> (<i>A. albida plena</i>)	—30	2.50	20.—
Weiss gefüllt, gut für Binderei, blüht später als die einfache Form, von langer Blütdauer, 15—20 cm hoch.			
» <i>rosea</i>	—35	3.—	25.—
Hybride zwischen <i>A. alpina</i> × <i>A. aubrietoides</i> , niedriger als die <i>alpina</i> -Formen, nur 10 cm hoch, Laub etwas mehr silbergrau, Blüten zartrosa, April.			

Aralia, Aralie. Araliaceen.

<i>racemosa sachalinensis</i>	—75	—	—
Besonders üppige Form, 1,50 m Höhe.			

Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceen.

<i>bracteata splendens</i>	—25	2.—	15.—
Leuchtend karminfarbene, grosse Blütenköpfe, wohl dunkelste aller Sorten, 10 cm hoch, breitblättrig, Juni.			
<i>formosa splendens</i>	—30	2.50	20.—
Blüte leuchtend karminrot, Blütenkopf gross, 30—40 cm, wohl höchste aller Sorten, Mai—Juni.			
<i>Laucheana</i> (<i>A. maritima Laucheana</i>)	—25	2.—	15.—
Dichte, runde Büsche grasartiger Blätter, Blütenköpfe leuchtend rot, Mai—Juni, auf ca. 20 cm hohen Stielen, sehr reichblühend.			
<i>majellensis</i>	—30	2.50	20.—
Mit hellila Blütenköpfen, grosse, schön geschlossene Kugelblüten, 30 cm hoch, Mai.			
<i>maritima</i> (<i>Statice Armeria</i>)	—25	2.—	15.—
Mit lilaroten Blütenköpfen, Höhe ca. 15 cm, Mai.			
» <i>alba</i> (<i>A. leucocephala</i>)	—25	2.—	15.—
In Wuchs und Form gleich <i>A. maritima</i> , Blütenköpfe jedoch schneeweiss, Blütezeit später als die anderen Sorten.			

Arnica, Wohlverleih. Kompositen.

<i>amplexicaulis</i>	—40	—	—
Leichtwachsende, orangegelbe Staude, wolliges Laub, 50 cm, Juni—August.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Arnica (Fortsetzung):			
<i>longifolia</i> Schmalere und glattere Blätter als <i>A. amplexicaulis</i> , Blüte zierlicher, 40 cm, Juli—August.	— .40	—	—
Artemisia , Beifuss, Edelraute. Kompositen.			
<i>lactiflora</i> , Silberraute 1,5—2 m hohe Staude mit tief dunkelgrünem, stark zerschlitztem Blatt und grossen, weissen Blütenrispen im Herbst, September bis Oktober.	— .30	2.80	25.—
<i>parviflora</i> Blüten rahmweiss, von unten auf locker mit Blütenrispen besetzt, Höhe 60—80 cm, Juni—Juli.	— .40	—	—
Asarum , Haselwurz. Aristolochiaceen.			
<i>europaeum</i> Sehr niedrige Rasenstaude mit immergrüner, nierenförmiger Belaubung, glänzend dunkelgrün, Blüten glockig, grünlich purpurn, Mai—Juni, für schattige Plätze in nahrhaftem Boden.	— .35	3.—	25.—
Asparagus , Spargel. Liliaceen.			
<i>officinalis</i> B. Zierspargel für den Park, Schnittgrün.	— .50	4.—	—
Asperula , Waldmeister. Rubiaceen.			
<i>ciliata</i> , siehe <i>Crucianella stylosa</i> .			
<i>odorata</i> , Maikrautstarke Pflanzen 20 cm hohe Staude mit zahlreichen, kleinen, weissen Sternblüthen im Mai, das quirlständige Laub ist äusserst wohlriechend, für frischen, humosen Boden im Halbschatten.	— .25	2.—	15.—
Asphodelus , Affodill, Goldwurz. Liliaceen.			
<i>albus</i> (<i>A. ramosus</i>) Meterhohe Staude mit fleischigem Wurzelstock, sitzendem Blattschof, Blätter dreikantig, und ansehnlichen, traubigen Blütenständen, weiss, Mai—Juni, in Knospe sehr kontrastreich.	— .50	4.50	40.—
<i>luteus</i> Meterhohe Staude mit zierlichem, blaugrauem Laub, gelben Blütenrispen, grosse Einzelblüthen, lange Blütendauer, wertvoll für Eremurus-Gruppen, Juni—Juli.	— .75	7.—	—
Aster , Sternblume, Aster. Kompositen.			
<i>acris</i> (<i>Galatella punctata</i>) Typ mit lavendelblauen, ziemlich grossen Blüten, 60—80 cm, September.	— .30	2.80	25.—
» <i>nanus</i> (<i>A. acris compactus</i>) Dichte Büsche kleiner, blauer Sternblüthen, ca. 40 cm hoch, August bis September; schön für Töpfe.	— .35	3.—	28.—
» <i>roseus</i> Blüten lilarosa.	— .35	3.—	—
<i>alpinus albus</i> Schneeweisse Alpenaster, Höhe 15—25 cm, Mai.	— .30	2.80	25.—
» <i>magnificus</i> Blumen glänzend, satt lilablau mit goldenem Inneren. Fast doppelt so gross als die Art, bis 6 cm Durchmesser, mit mehreren Reihen strahliger Zungenblüthen. Beblätterte Blütenstiele, straff aufreht, einblütig, ca. 20 cm hoch, Mai—Juni.	— .30	2.80	25.—
» <i>superbus</i> Mit mittelgrossen, schön geformten Blumen, äusserst reichblühend, ganz vorzüglich zum Schnitt und besonders geeignet zum langsamen Treiben, auch für Topfverkauf. Blüten helllila, Mai—Juni, Höhe 30 cm.	— .40	3.50	30.—
<i>amelloides</i> (<i>A. amellus elegans</i>) Hübsche, indigoblaue Blüten, 4—5 cm Durchmesser, Mitte dunkel, in reichblütigen Doldensträussen, Höhe 60 cm, August—September.	— .35	3.—	—
<i>amellus Beauté parfaite</i> Eine der grössten unter den sommerblühenden Asten von dunkelvioletter Färbung mit gelber Mitte, Blüte 5 cm Durchmesser, Höhe bis 50 cm, sehr reichblühend, August—Herbst, Laub breitlanzettlich, dunkelgrün.	— .45	4.—	35.—
» <i>Emma Bedau</i> Hervorragende Schnitt- und Gruppensorte, reichverzweigt, mit grossen Sträussen leichter, edler Blüten von leuchtend ultramarinvioletter Färbung. Wohl dunkelste aller Sommerastern, Höhe 40—50 cm, August—September.	— .45	—	—

Aster (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
amellus Gruppenkönigin	— 45	—	—
Reichverzweigt, mit leuchtend lavendelblauen, gut geformten, strahligen Blüten in dichten Sträussen, Höhe 50 cm, August – September.			
» ibericus	— 35	3.—	28.—
Breitdoldige Blütenrispen mit tief violettblauen Blüten, 4–5 cm Durchmesser, Petalen leicht gedreht, Triebe gut verzweigt mit kurzen, lanzettlichen Blättern, sehr reichblühend, Höhe 40–50 cm, September bis Oktober.			
» ibericus Ultramarin	— 35	3.—	28.—
Schönste der Amellus-Klasse mit grossen Blüten von tieferblauer Farbe und gelber Scheibe. Pflanze mit straff aufrechtem Wuchs und grossen, breiten Blütendolden. Einzelblüten 4 cm Durchmesser, Höhe 60 cm, Oktober.			
» Otto Rudolf	— 45	—	—
Strafftstielige Sorte mit mittelgrossen, gut geformten, leuchtend dunkellila-farbenen Blüten in schönen Sträussen. Wegen ihrer Langstieligkeit zum Schnitt vorzüglich geeignet, Höhe 50–60 cm, August bis September.			
» Perry's Favourite	— 35	3.—	—
Hübsche Sorte mit rosafarbenen Blüten, sehr reichblühend, Belaubung sattgrün, Höhe 50–60 cm, August–September.			
» Preziosa	— 45	4.—	35.—
Ausserordentlich reichblühend, mit herrlich tief dunkelblauen Blüten, Triebe kaum verzweigt, Einzelblüte 3–4 cm Durchmesser, Blütdauer nahezu 8 Wochen, Höhe 30–50 cm, Oktober. Vorzüglich zu Beetpflanzungen.			
» rubellus	— 35	3.—	28.—
Leuchtend lilarosa, wirkungsvolle Färbung. Reichverzweigte Büsche, welche eine Fülle von strahligen Blüten bringen, Höhe 40–50 cm, August–September, für Schnitt und als wirkungsvolle Gruppensorte.			
» Rudolf Goethe	— 50	4.50	—
In edler Form und Blütengrösse unübertroffen, straff wachsend, gut verzweigt, bringen eine reiche Fülle herrlich lavendelblauer Blumen hervor, 6–7 cm Durchmesser, Höhe ca. 50 cm, August bis September.			
» Schöne von Ronsdorf	— 50	4.50	—
Reichverzweigte Sträusse bis 6 cm breiter, wunderbar lilarosa-farbiger Blüten, Höhe 40–50 cm, Aug.–Sept.			
» Wienholzi	— 35	3.—	—
Von allen rosafarbenen ist dies die leuchtendste, wächst kräftig und bringt ihre lockeren Blütensträusse etwa 3 Wochen früher als „Perry's Favourite“, Höhe 60 cm, August–Anfang September.			
Beauty of Colwall	— 50	—	—
Sehr schöne Hybride mit gefüllten Blüten, von schön lavendelblauer Farbe auf festen, starken Stielen und grossen, lockeren Doldenrispen, Höhe bis 1,20 m, Sept.–Okt.			
Blaumeise	— 35	3.—	28.—
Dichtbuschig, mittelgrosse, lavendelblaue Blüten, ungeheuer reichblühend, Höhe 80–100 cm, prächtiger Herbstblüher.			
Chapmanni	— 40	3.50	—
Blüten hellblau, Wuchs hoch, Oktober.			
coccineus	— 40	3.50	—
Alte, weinrote Herbstaster, Höhe 100–120 cm, Oktober, für Rabatten von bester Wirkung.			
Datschi (A. diffusus Datschi)	— 40	3.50	—
Wertvolle Form mit Blütenrispen bis tief in den Nov. hinein. Reinweisse, kleine Sternblümchen, Höhe ca. 80 cm, Laub wird als Bindegrün benutzt. Kommt meist erst unter Glas zur Blüte. Bei Eintritt des Frostes mit Ballen ausgehoben, eingetopft oder ins Kalthaus gebracht, blüht A. Datschi bis Mitte Dezember.			
» Findelkind (A. diffusus Datschi Findelkind)	— 40	3.50	—
Von der allbekannten und beliebten A. Datschi eine Spielart mit ganz zartrosa Blüthen. Sonst wie Datschi zu behandeln und zu verwenden.			
diplostephioides Leichtlini	— 35	3.—	—
Bedeutende Verbesserung des A. alpinus superbus, die durch edle Blütenform, Grossblumigkeit und Höhe der kräftigen Blütenstiele besonderen Wert als Schnittstaude besitzt. Leuchtend lila-blaue Strahlenblüten, Höhe 50–60 cm, Juli.			

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Aster (Fortsetzung):				
ericoides (<i>A. multiflorus</i>)	Dicht verzweigte Büsche, feinlaubig, mit dichten, grossen Doldensträussen und einer Unmenge kleiner, weisser Strahlenblüthen, Höhe 1 m, jedoch in Blüte grösser und bedeutend früher als <i>A. Datschi</i> , Oktober.	—30	2.80	25.—
formosissimus	Aufrechte Büsche mit lanzettlichen, dunkelgrünen Blättern. Die etwa 3 cm grossen, tief rötlichbraunen Blüten stehen in straffen, pyramidalen Doldentrauben. Tragt sich sehr gut, Höhe 1,5 m, Sept. bis Okt.	—30	2.50	—
Fremonti	Lilarosa, auf strammen Stengeln, gute Schnittblume, 30–40 cm hoch, April–Juni.	—40	—	—
Frikarti	Verwandt mit <i>A. Thomsoni</i> , grosse, edle, feinstrahligte Blüten, Wuchs buschig, 60–80 cm hoch, August–Oktober.	—60	5.50	—
grandiflorus (<i>A. tardiflorus coeruleus</i>)	Etwas rauhaarig, sparrig, Blüten ca. 4 cm breit, tief violett-blau mit zuletzt dunkler Mitte. Prachtige Farbe, schönste, dunkle Herbstaster, Höhe 1,5 m, Okt.–Nov.	—30	2.80	25.—
horizontalis (<i>A. diffusus horizontalis</i>)	Breit verzweigte Stauda mit tannenbaumartiger Wuchsanordnung der Blütenzweige. Blüten 1–2 cm gross, dicht übersät Randblüthen weiss, Mittelblüthen leicht karmin-weinrot. Ausserst zierend und eigenartig auffallend. Höhe bis 80 cm, Oktober.	—50	4.50	40.—
hybridus Blütenwolke, B.	Ausserst reichblühend, hellblau, mit dichten phloxartigen Rispen, Höhe 60–70 cm, Sept.–Okt.	—30	2.80	—
» Boule de Neige, B.	Rabattenstaude mit schmallanzettlichem, frischgrünem Laub, weissblühend mit gelber Mitte, wird nicht so leicht schwarz wie andere weisse Sorten. Höhe 60–80 cm, Sept.–Okt.	—30	2.80	25.—
» de la Toussaint, Allerheiligen-Aster, B.	Allerliebste, niedrig bleibende Sorte. Blüte mittelgross, mattlila in reicher Fülle. Blüht fast stets zu Allerheiligen, Höhe 20–25 cm.	—30	2.80	—
» Herbstwunder, B.	Straff wachsende, reinweisse Sorte von lang andauerndem Flor, Höhe ca. 80 cm, Sept.	—30	2.80	25.—
» luteus (<i>Solidago missouriensis</i>)	Kleine, zierliche, gelbe, asternähnliche Sternblüthen in sehr dekorativen Sträussen. Ausserst reichblühende Sorte, Höhe 30 bis 50 cm, Juli–September. Für Schnitt auch sehr wertvoll.	—30	2.80	25.—
» Mad. Cocheux, B.	Eine der niedrigsten unter den Herbstastern, bedeckt mit dichten Sträussen kleiner Blüthen, die erst weisslichrosa, im Verblühen rosalila sind, Höhe bis 40 cm, Aug.–Sept.	—30	2.80	—
» Nordlicht, B.	Leuchtend rosa, in lockeren Rispen, Blumen ziemlich gross, mit lebhaft gelber Mitte, sehr leuchtende Farbe, Höhe 100 cm, Sept. bis Okt.	—30	2.80	25.—
» Proserpine, B.	Lockere, pyramidale Rispen, grosse, dunkellavendelblaue Blüten mit bräunlichgelber Mitte, etwa 100 cm hoch, Okt.	—30	2.80	25.—
» St. Egwin, B.	Schön gedungen, buschiger Wuchs. Die edlen Blumen sind von feiner, leuchtendrosa Farbe, bei etwa 3½ cm Durchmesser, Gruppensorte ersten Ranges, Höhe 80 cm, eignet sich bei einmaligem Rückschnitt auch vorzüglich für Töpfe.	—30	2.80	—
incisa , siehe <i>Calimeris incisa</i> .				
Linosyris (<i>Linosyris vulgaris</i> , <i>Chrysocoma Linosyris</i>)		—30	2.80	—
Goldschopf	Dichtbuschige Stauda mit dicht linealbeblätterten Trieben und gelben Blüthen in endständigen Doldensträussen, Höhe 50 cm, Juli–Oktober.	—30	2.80	—
Mesagrande speciosus grandiflorus , siehe <i>Erigeron</i> .				
Nancy Ballard	Verbesserte „Beauty of Colwall“, Farbe rötlicher, mit riesigen Blütendolden.	—30	2.80	—

Aster (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Novae-Angliae Lill Fardell	—30	2.80	25.—
Beste, rote Herbstaster mit riesengrossen Einzelblüten, straffe Haltung, bis 2 m hoch, September.			
» pulchellum	—30	2.80	—
Bis 2 m hohe Staude mit sehr grossen Blüten, etwa 3 cm Durch- messer von tief karminrosa Färbung. Straff aufrechte, derbe, leicht wollige Stengel. Wohl höchste aller Herbstastern, September bis Oktober.			
Novi-belgii	—30	2.80	25.—
Die grossen, dunkellila gefärbten Blüten erscheinen im Oktober und stehen auf meterlangen Trieben.			
» Heiderose	—35	3.—	28.—
Eine der allerschönsten, rosafarbenen Herbstastern, deren Blüte- zeit Mitte September beginnt. Für alle Zwecke vorbildlich. Wenn einmal zurückgeschnitten, auch zur Topfkultur geeignet.			
Plejade	—30	2.80	25.—
Sehr niedrige Herbstaster, bis 40 cm, in Farbe ähnlich Madame Cochaux, nur röterer Schein. Zu Einfassungen verwendbar, Sep- tember—Oktober.			
ptarmicoides major	—35	3.—	28.—
Dichte, weisse Doldensträusse, vorzüglich für Steingärten, an- spruchlose Staude mit reichem Sommerdior, Blüten etwas grösser wie bei A. ptarmicoides. Juli—September.			
Schön Rottraut	—30	2.80	25.—
Feine Varietät von straffem Wuchs, mit leuchtend karminroten Blüten und lebhaft gelber Mitte, Höhe 1 m, September—Oktober.			
subcoeruleus	—30	2.50	20.—
Leuchtend hellviolette Blüten mit orangegeletter Mitte. Einzel- blüte bis 5 cm Durchmesser, Blüthenriebe einblütig, Höhe 40—50 cm, Mai—Juni.			
» Apollon	—30	2.50	—
Grossblumig, dunkelblau mit kleiner, orangefarbener Mitte, Höhe 40 cm, reichblühend, Juni, Petalen ganz gefaltet.			
» Artemis	—30	2.50	—
In Form und Wuchs ähnlich „Apollon“, aber von fein zartrosa- lila Farbe. Wohl beste Form der subcoeruleus-Astern. Höhe 40 cm, Juni.			
Aster in guten Sorten nach meiner Wahl 100 St. M. 20.—			
Astilbe , Prachtspiere, Scheingeissbart. Saxifragaceen.			
Arendsi Amethyst	—50	4.50	40.—
Tief violett-purpurn, frühblühend, straff aufrechte, weitver- zweigte Rispen.			
» Bergkristall	—50	4.50	40.—
Lange, gut verzweigte Blütenrispen von schneeweisser Farbe. Blüht einige Wochen später als die weisse „Diamant“.			
» Brunhilde	—45	4.—	35.—
Prächtige, federige Rispen von schön cremerosa Farbe mit leicht lila Schein. Mittlere Blütezeit. Blatt sehr gross, lebhaft grün, sehr hohe Blütenstände mit leicht hängenden Seitentrieben.			
» Ceres	—45	4.—	—
Leuchtend lilarosa, Stiele reich verzweigt, Rispen schön locker, sehr fein federartig und zierlich pyramidal gebaut, dabei aber doch kräftig. Laub gedrungen, dunkelgrün auf rötlichem Stiel. Blütezeit Ende Juli, gleich vorzüglich zu Gruppen, Rabatten und zum Schnitt.			
» Deutschland	—60	5.50	50.—
Über gesunder Belaubung kräftige, besonders schön geformte Blütenrispen von blendend weisser Farbe und verhältnismässig grossen Einzelblüten. Unter allen bisher im Handel befindlichen weissen Treibsorten wohl die schönste und beste. Frühblühend, niedrig.			
» Diamant	—45	4.—	35.—
Schöne, aufrechte Rispe von schneeweisser Farbe, schon gegen Anfang Juli blühend. Wertvolle Schnittsorte.			
» Emden	—60	5.50	50.—
Dichte, schöne Rispen, grosse Einzelblüten, von herrlicher lila- rosa (cattleyenrosa) Färbung, die namentlich für die Treiberei wert- voll ist. Frühblühend.			

Astilbe (Fortsetzung):

Arendsi Gloria

Dichte federige Blütenrispen, prächtig dunkelrosa mit schwach lila Schein. Für Beetbepflanzung geeignet, da niedrig bleibend, auch für Topfkultur.

» **Granat**

Reichverzweigte Rispe von bester Form, kräftig, leuchtend dunkelkarmin. Blütezeit Ende Juli. Hervorragend für alle Zwecke.

» **Gunther**

Langfederige, schmal pyramidale Rispen von leuchtend heller, reinrosa Farbe. Laub sehr gross, dunkelgrün auf dunkelroten, hellbehaarten Stielen. Sehr reichblühende Sorte. Ende Juli.

» **Hyazinth**

Straffe, dichte Rispen von leuchtend hilarosa Färbung.

» **Juno**

Die kräftigen, pyramidalen, reichverzweigten, federigen Blütenrispen sind über 1 m hoch und von leuchtend purpurrosa Farbe. Anfang August. Massige, grosse Belaubung, hell- bis dunkelgrün auf hellgrünen Stielen. Sehr reichblühend.

» **Kriemhilde**

Herrliche, lachsrosa Farbe und schöne, federige Rispen. Wertvoll für alle Zwecke. Lockere Belaubung, lebhaft grün auf roten Stielen. Blütenstände locker pyramidal, straff aufrecht mit wagerechten Seitentrieben. Ende Juli.

» **Lachskönigin**

Blütenstände straff und fest gestielt, schlank pyramidal. Zierliche, reichverzweigte, lockere Rispen, deren Blütenbüschel in prächtigem, hellem Lachsrosa erstrahlen. Belaubung gross, tiefgrün auf grünem Stiel.

» **Moeve**

Bewährte Treibsorte in Farbe und Wuchs ähnlich „Rheinland“, nur die Blütezeit derselben bedeutend verlängert.

» **Opal**

Über besonders kräftiger, breitblättriger, saftig grüner Belaubung erheben sich die sehr breiten, reichverzweigten und federigen Rispen in silbrig schimmerndem Lichtlila. Ende Juli.

» **Rheinland**

Wertvolle Treibsorte von niedrigem Wuchs und dichten Rispen von herrlich leuchtend rosakarmin Farbe mit Lachsschein.

» **Rosa Perle**

Belaubung kompakt, dunkelgrün, rötlich gestielt. Blütenstände auf starken Stielen, schön aufrecht getragen, dicht schmal pyramidal mit aufrecht strebenden Nebentrieben. Färbung fleischfarbig mit weicher Lachstönung. Sehr reichblühende Gruppen- und Schnittsorte.

» **Rubin**

Üppig, leuchtend dunkelkarmin, kräftige, gutverzweigte Rispen. spät, erst Ende Juli blühend.

» **Siegfried**

Die grosse, weitausladende Belaubung ist von gelblichgrüner Färbung auf hellgrünen Stielen. Blütenstände langgestielt, sehr locker pyramidal mit wagerechten Nebentrieben. Färbung im Erblühen zart karminrosa, später heller werdend.

» **Venus**

Grosse, dunkelgrüne, oft rötlich bronzierte Belaubung auf rötlichen Stielen. Blütenstände schlank pyramidal, locker gebaut, von schöner, leuchtend purpurrosa Färbung. Frühblühend.

» **Vesta**

Belaubung sehr gross, hoch und weit ausladend, dunkelgrün auf roten Stielen. Blütenstände schlank pyramidal, ziemlich dicht, von schöner, zarter, helllilarosa Färbung. Frühblühend.

» **Walküre**

Belaubung mässig stark, schwärzlichgrün auf roten Stielen, niedrig bleibend. Blütenriebe ausserordentlich gross und stark, locker pyramidal mit wagerecht bis leicht aufwärts gerichteten Trieben. Färbung leuchtend hellkarminrosa. Spätblühend.

» **Weisse Perle**

Im Wuchs der Sorte „Rosa Perle“ völlig gleichend, mit schön rahmweissen Blütenrispen.

chinensis

Zartrosa Blütenrispen. Steht A. Thunbergi sehr nahe. Kelch rosa, Blütenpetalen weiss. Höhe ca. 60 cm, Juli—August.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—45	4.—	35.—
—60	5.50	50.—
—45	4.—	35.—
—45	4.—	35.—
—40	3.50	30.—
—45	4.—	35.—
—45	4.—	35.—
—60	5.50	50.—
—45	4.—	35.—
—75	7.—	—
—45	4.—	35.—
—60	5.50	50.—
—40	3.50	—
—45	4.—	35.—
—40	3.50	—
—45	4.—	35.—
—45	4.—	35.—
—45	—	—

Astilbe (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
chinensis pumila	—50	4.50	—
Sehr niedrig bleibende Sorte, mit schönen, bis 30 cm hohen, lila Blütenständen in der Form ähnlich A. Taqueti. Juli—August.			
Davidi	—45	4.—	—
Stattliche Staude mit grossen, reichverzweigten, lockeren Blütenrispen von leuchtend roter Färbung. Höhe bis 180 cm. BELAUBUNG sehr schön, kräftig, mehrfach gefiedert. Ausserst wertvolle Schmuckstaude, für feuchte Stellen im Park.			
grandis	—45	4.—	—
Prächtiges Gegenstück zu A. Davidi mit schön pyramidalen, federiger, reinweissen Blütenrispe. BELAUBUNG meist grundständig, gross, tiefgrün. Rispe locker gebaut mit leicht überhängenden Seitentrieben und Spitze, Höhe 1,5—2 m.			
» delicata	—45	4.—	—
In Wuchs und Haltung gleich A. grandis, die prächtigen, aufrechten Blütenrispen haben jedoch eine schön rosa Farbe. Höhe 1,5 m, Juli—August.			
hybrida carminea	—40	—	—
Die verzweigten, federigen Rispen sind von karminpurpurner Farbe, Höhe 1 m, August.			
» crispa	—75	—	—
Gekrauste Zwergastilbe, feste, lederige, tiefgrüne BELAUBUNG, an Petersilie erinnernd, 15 cm hoch, Blüten rosaweiss, für feuchte Stellen im Steingarten, Treiberei und Zimmerschmuck. Juni—Juli.			
» Dr. Katier	—40	3.50	32.—
Rahmweisse Blütenrispen, frühblühend.			
» Geyser	—40	3.50	—
Schmal pyramidale Blütenrispen, rahmweiss, stark aufrecht. BELAUBUNG gross, sattgrün. Höhe 80—90 cm.			
» Gruno	—50	4.50	40.—
Schöne, lachsrosa Blütenrispen, starkwachsend, Höhe über 1 m, Juli.			
» Mousseline	—40	3.50	—
Ziemlich dicht gebaute, leicht übergeneigte Rispe, rahmweiss bis weisslich fleischfarben. BELAUBUNG gross. Gut wachsend und dankbar blühend. Höhe 80—100 cm. Juli.			
» Prinzess Juliane	—40	—	—
Zierliche, lockere Blütenrispen von lebhaft karminrosa Farbe, 80—100 cm hoch.			
» Queen Alexandra	—40	3.50	32.—
Kräftige Rispen von frischrosa Farbe. Vorzügliche Treibsorte. Ziemlich niedrig bleibend, ca. 40 cm, auch für Topfverkauf geeignet. Frühblühend.			
» Queen of Holland	—40	3.50	32.—
Schöne, grosse, weisse Rispen, ziemlich frühblühend.			
» rubella	—40	—	—
Triebe stark aufrecht, BELAUBUNG mässig gross, glänzend hellgrün, Rispe locker gebaut, ziemlich dicht mit kleinen Blütchen besetzt, hellfleischfarbigrosa, Höhe 80 cm, Juli—September.			
» Salland	—60	5.50	50.—
Blütenstiele ausserordentlich kräftig, leuchtend karminpurpur. Grosse, lockere Rispen, Höhe 150 cm, Juli—August.			
» vertilans	—40	3.50	—
Kräftige, pyramidale Blütenstände, deren Einzelblütchen mit ganz feinen, schmalen Blütenblättchen und zahlreichen Staubfäden von zarter, rosafarbener Färbung versehen sind. Beim Verblühen in bläulich Lila übergehend, Höhe ca. 75 cm, Juli.			
» Washington	—40	3.50	32.—
Weissblühende, beliebte Treibsorte.			
» W. E. Gladstone	—40	3.50	—
Schöne Treibsorte, Laub üppig dunkelgrün, kräftige, blendend weisse Blütenrispen. Höhe 50 cm, Ende Juni.			
Lemoinei Gerbe d'argent	—40	—	—
Grosse, lockere Blütenrispen, fleischfarbigweiss, auf kräftigen Trieben, Höhe ca. 60 cm, BELAUBUNG mittelgross, lichtgrün, sehr reichblühend. Juli—August.			
» Nebuleux	—40	—	—
Schlank gebaute, hohe Rispen von reinweissen Blüten. Höhe 80 cm, Laub hellgrün.			

Astilbe (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
simplicifolia	—75	—	—
Laub vollkommen abweichend, nur ungeteilt gelappt, sägezählig, kompakter Wuchs, nur 15 cm hoch, weisse, feine Blütenrispen, gut über dem Laub stehend, August—September. Für den Felsengarten an feuchten Stellen und für Topfkultur geeignet.			
Taqueti	—45	4.—	—
Steht A. Davidi in Blatt und Blüte sehr nahe, jedoch bedeutend niedriger, ca. 50 cm hoch, und früher, Anfang Juli. Ausläufer treibend. Sehr wirkungsvolle Staude.			
Thunbergi delicata	—40	3.50	—
Die dichtbuschige, grosse Belaubung ist lebhaft grün, rauhaarig, auf grünen Stielen. Prächtigt aufrechte Blütenrispen, locker, breit pyramidal mit wagerechten Nebentrieben von schöner, zartrosa Farbe. Blüten milchweiss mit rötlich gefärbten Kelchzipfeln, in Wuchs und Haltung der A. grandis ähnlich. Höhe bis 1,5 m, Juli—August			
» elegans	—40	3.50	—
Die Seitenäste der stark verzweigten zierlichen Rispen hängen trauerweidenartig über, was den blühenden Pflanzen ein besonders elegantes Aussehen verleiht. Wuchs kräftig, Blüte weiss, Höhe bis 1,20 m, Juli—August.			
» elegans carnea	—40	3.50	—
In Wuchs und Rispenbildung ähnlich der A. Thunb. elegans, mit schöner, hellrosa Blütenfarbe.			
» elegans rosea	—50	4.50	—
In Wuchs und Rispenbildung ähnlich der A. Thunb. elegans, mit dunklerem, leuchtenderem Rosa als A. Thunb. eleg. carnea.			
» Moerheimi	—40	3.50	30.—
Besonders schöne, grosse, weisse Blütenrispen. Seidig behaarte, hell- bis dunkelgrüne Blätter, Höhe ca. 120 cm bei einer Rispenbreite bis zu 50 cm, Juli.			
In den schönsten Sorten meiner Wahl , starke Pflanzen 1000 Stück M. 250.—	—	—	30.—
Astrantia , Sterndolde, Strenze. Umbelliferen.			
major	—35	3.—	—
Interessante Blütenstaude, kugelig, etwas an Scabiose erinnernd, mit rosa gestreiften Hüllblättern, für feuchte, schattige Stellen im Park. Höhe bis 1 m, Juni—August.			
Aubrietia , Blaukissen. Cruciferen.			
Eyrei rosea, B.	—40	3.50	—
Auffallend leuchtend rosa, Form von A. deltoidea, 10—15 cm hoch, März—April.			
grandiflora, B.	—30	2.50	20.—
Grossblumig, Hellschwarzblau.			
hybrida graeca	—30	2.50	20.—
Schön, dicke Polster mit leuchtenden, ziemlich dunkelvioletten Blüten.			
» Lavendel	—40	—	—
Grossblumig, lavendelblau, ziemlich spät blühend.			
» Leichtlini Crimson, B.	—40	3.50	—
Blüte leuchtend rot, bringt willkommene Abwechslung in die gewohnten Farben.			
tauricola	—40	3.50	—
Seltene, dunkelblau, ganz niedrigbleibende Art, sehr frühblühend.			
Baptisia , Papilionaceen.			
australis	—50	—	—
Harte, in Tracht an Lupinus gemahnende, blaublütige Staude. Blattwinkelständige Schmetterlingsblüten, blauviolett, Pflanze von blaugrauem Aussehen. Höhe 1 m, Mai—Juli.			
Bergenia , siehe Megasaea.			
Betonica (Stachys), Battunge. Labiaten.			
glomerata, B.	—25	2.—	—
Die hellrosafarbig, 8—10 cm langen Blütenähren stehen auf 20—30 cm hohen Stielen, Juli.			
» grandiflora superba, B.	—45	4.—	35.—
Bedeutend lebhafter als B. glomerata. Gut haltbare Schnittblume, rotviolett. Schöne Lippenblüten in dichter, breiter Ähre. Höhe 50 cm, Ende Juni—Juli.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Bocconia , Federmohn. Papaveraceen.			
<i>cordata</i> (B. japonica, B. jedoënsis, Macleya cordata)	—60	—	—
Wunderschöne, ornamentale Solitär-Staude, die bis 2,5 m hoch wird. Das herzförmige, stark buchtig gezähnte Blatt ist bläulich-grün, unterhalb weisslich. Die kleinen, weisslichen Blüten stehen in sehr grossen, aufrechten Rispen, August.			
<i>microcarpa</i>	—60	—	—
Eine noch üppigere und schönere Art als B. cordata. Im ganzen dieser aber sehr ähnlich.			
Brunella , Prunella, Braunelle. Labiaten.			
<i>grandiflora rosea</i>	—25	2.—	18.—
Die ziemlich grossen, sitzenden Lippenblütchen sind von leuchtend frischrosa Färbung. Laub graugrün. Höhe 25 cm, Juni.			
<i>incisa</i>	—30	2.50	20.—
Bis 40 cm hoch, Juni, dunkelrosa.			
» <i>rubra</i>	—30	2.50	20.—
Laub fein zerteilt, 25 cm hoch, rotblühend, Juni.			
<i>Webbiana</i>	—25	2.—	18.—
Wohl beste, dunkelste, mit grossen, blauviolettten Blüten, in Blüte an Betonica erinnernd, 25 cm hoch, Laub grün, Juni.			
Calceolaria , Pantoffelblume. Scrophulariaceen.			
<i>polyrrhiza</i>	—50	4.50	—
Hochinteressante Staude mit verkehrteilänglichen, fast grundständigen Blättern und gestielten, sattgelben, purpurn getupften, pantoffelförmigen Blüten in lockeren Scheindolden für Halbschatten an geschützten Orten im Alpinum. 10—15 cm hoch, Juni—Juli			
Calimeris , Falschaster. Kompositen.			
<i>incisa</i> (Aster incisa)	—40	3.—	—
Sehr harte und reichblühende Art, herbstasterähnlich mit kleinen, etwa 2,5 cm breiten Blüten mit gelber Mitte und weissen oder leichtlila Strahlen, Höhe 80 cm, Ende Juni—September.			
<i>integrifolia</i>	—40	3.—	—
Weissblühend, herbstasterähnlich, schön zum Schnitt, Juni—Juli.			
Calluna , siehe unter Laubhölzer.			
Caltha , Sumpfdotterblume. Ranunculaceen.			
<i>palustris monstrosa plena</i>	—50	4.50	—
Noch üppiger und grossblumiger als C. palustris plena. Höhe 25 cm, blüht etwas später, Ende Mai.			
» <i>plena</i>	—40	3.50	30.—
Grosse, frischgrüne Blätter und schön gefüllte, goldgelbe Blüten. Höhe bis 25 cm. April—Mai. Auch für trocknere Stellen, wo sie besonders reich blüht.			
<i>polypetala</i> , B.	—60	5.—	—
Im Wuchs üppiger als C. palustris mit oberirdischen Ausläufern, Blüten einfach gelb, bis 7,5 cm breit. Wuchert leicht, daher nur für grössere Anlagen und an Teichrändern, auch in seichtem Wasser.			
Calystegia , Staudenwinde. Convolvulacee.			
<i>pubescens plena</i> (Convolvulus japonicus)	—25	2.—	—
Schlingende Staude mit kriechendem Rhizom, pfeilförmigen, behaarten Blättern und langgestielten, 5—8 cm breiten, dunkelfleischfarbenen, windenartigen, gefüllten Blüten. Rankt über 2 m hoch. Blütezeit Juni—September. Wuchert!			
Camassia . Liliaceen.			
<i>esculenta</i> (C. Fraseri, Scilla esculenta)	—25	2.—	15.—
Hübsches, an Scilla erinnerndes Zwiebelgewächs mit schmal-linealen, aufrechten Blättern. Die in langgestielten, bis 40 blütigen Trauben stehenden Blüten sind von purpur- bis tiefblauer Farbe. Für lockeren, durchlässigen Boden in Südlage. Höhe etwa 50 cm. Mai.			
Campanula , Glockenblume. Campanulaceen.			
<i>carpatia</i>	—35	3.—	25.—
Niedrige, buschige Form mit reichem Flor der aufrechten, blauen Glockenblumen. Höhe 30—40 cm. Juli.			
» <i>nivea</i>	—35	3.—	25.—
In Wuchs und Form gleich voriger, nur mit blendend weissen Blütenglocken. Höhe etwa 30 cm. Ende Juni.			

Campanula (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
glomerata acaulis	—75	7.—	—
Stengellose Blütenbüschel, dunkelviolet, direkt auf der Blatt- rosette sitzend, 10 cm hoch, Juni—August. Für Alpinum und Stein- garten.			
» superba , Straussglockenblume.....	—50	4.50	—
Tiefdunkelvioletle Blütenbälle auf straffen, kräftigen Stielen Höhe etwa 40 cm, ganz hervorragend wirkungsvolle Art. Juni—Juli.			
grandis (C. latiloba).....	—35	3.—	25.—
Dichtbuschig, Blüten blau, winter in rauen Lagen aus. Ähn- lich der C. persicifolia, die grossen Blüten sitzen stiellos und dicht gedrängt an dem 80—100 cm langen Schaft. Juni—August.			
» alba	—35	3.—	25.—
Weissblühende Form der vorigen.			
lactiflora (C. celtidifolia).....	—40	3.50	—
Blütenrispen weitverzweigt, ziemlich kleine, kurzröhrige, milch- weisse Blüten in Büschelständen, bisweilen leicht hellblau. Höhe 75—100 cm. Ende Juni—August.			
latifolia	—40	8.50	30.—
Hellviolette Glocken. Höhe 75—100 cm. Juni—Juli.			
» alba	—40	3.50	30.—
Weissblühende Form der vorigen.			
macrantha alba (C. latifolia macrantha alba).....	—50	4.—	35.—
Straff aufrechte, dankbarste weisse Form für Schnitt, nicht wuchernd. Höhe 75—100 cm. Juni—Juli.			
Pallasiana	—40	3.50	30.—
Ähnlich C. pulcherrima, aber Blüten aufrechtstehend, Höhe etwa 75 cm, Juni—Juli.			
persicifolia alba (C. persicifolia Backhousei).....	—40	3.50	—
Schönste, weisse Glockenblume mit sehr edlen, grossen, blendend weissen Blüten. Dankbare Schnitt- und Schmuckstaude, Höhe etwa 75 cm, Juni—Juli.			
» alba plena	—50	4.50	—
Gefülltblühende Abart der vorigen.			
» grandiflora	—40	3.50	—
Herrlich leuchtend blaue Form der pfirsichblättrigen Glocken- blume.			
» Moerheimi	—50	4.50	—
Sehr hübsche Spielart mit hohen, straffen, aufrechten Blüten- stielen. Die dichtstehenden, schneeweissen Blüten sind 6—8 cm gross und ähneln einer gefüllten Kamellenblüte. Höhe etwa 75 cm, Juli.			
» Pfitzeri	—50	4.50	—
Halbgefüllt, dunkelblau, sehr schöne Blüten, 75 cm hoch, Juli.			
Portenschlagiana mit Topfballen	—35	3.—	25.—
Eine der wertvollsten, polsterbildenden Alpenen von ungewöhn- licher Reichblütigkeit. Die massenhaften, blauen Blüten entwickeln sich im späten Frühjahr und erscheinen ununterbrochen das ganze Jahr über bis zum Frost. Zu Einfassungen wertvoll, Höhe 10—15 cm, auch als Topfpflanze williger Blüher.			
pseudolanceolata	—50	—	—
pulcherrima	—35	3.—	25.—
Pyramidale, oft verzweigte Blütenstände, leuchtend violettblau, wuchert stark, daher Verwendung im grossen Park, Höhe 75 cm, Juli—August.			
pyramidalis	—40	3.50	—
Reichblütige, pyramidale Trauben, hellblau, über 1 m hoch, Juli—August.			
» alba	—40	3.50	30.—
Weisse Form der vorigen.			
Centaurea , Kornblume, Flockenblume. Kompositen.			
dealbata	—50	4.—	—
Blätter unterseits weiss behaart, Blüten einzeln, rosa, Mitte weiss, sehr reichblühend, Höhe ca. 50 cm, Mai—August.			
macrocephala	—50	—	—
Laub grün, Blüten kugelig, gelb, Höhe 100—120 cm, Juli—August.			
montana alba , B.....	—35	3.—	—
Reinweisse, grossblumige, ausdauernde Kornblume, junges Laub unterseits weissfilzig, Höhe etwa 30 cm, Mai—August.			

Centaurea (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
montana grandiflora, B.	— 35	3.—	25.—
Sehr grossblumige Varietät, Blütenstiele nur 25 cm hoch, etwas niederliegend, himmelblau mit rötlicher Zone, Mai—August.			
» Kaiser Wilhelm, B.	— 35	3.—	—
Sehr schöne, rein kornblumenblaue Sorte.			
» rubra, B.	— 40	—	—
Besonders schön, rotblühend.			
» sulphurea, B.	— 35	3.—	25.—
Blassgelbe Sorte von guter Blütenwirkung.			
rigidifolia	— 50	4.—	—
Verzweigte Art, mit fiederspaltiger, unterseits weissfilziger Be- laubung. Edle, hellrosa Blüten. Höhe etwa 50 cm, Juli—August.			
Tourneforti	— 50	—	—
Über 1 m hoch, rauhe, hellgrüne Blätter, Blüten satt goldgelb, Juli—August.			
Centranthus, Valeriana, Spornblume. Valerianaceen.			
ruber	— 40	3.50	30.—
Belaubung kahl, blaugraugrün, eilänglich mit prächtig dunkel- karminroten Blütensträussen feiner Röhrenblüthen, Höhe 60—100 cm, von Juli an ununterbrochen in Blüte.			
Cephalaria (Scabiosa, Succisa). Dipsaceen.			
alpina, Schuppenkopf	— 40	3.50	—
Grosse, behaarte Grundblätter und bis 2 m hohe, blassgelbe, end- ständige Blütenköpfe ab Juni.			
Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceen.			
Biebersteini, B.	— 30	2.50	—
Dicht weisswollige Art.			
tomentosum	— 25	2.—	15.—
Silberweisse Polster, zu Einfassungen.			
Chelone, Schlangenkopf. Scrophulariaceen.			
barbata coccinea (Pentstemon barbatus)	— 40	3.50	—
Wurzelstock kriechend, Blütenrispen schlank, verzweigt, pyra- midal, scharlachrot mit gelblichem, behaartem Schlund. Anspruchs- los, Höhe über 1 m, Juli—September.			
obliqua alba (Chelone glabra)	— 35	3.—	25.—
Blätter gegenständig, Blüten weiss, liebt feuchte, halbschattige Lagen in leichterem, etwas moorigem Boden. Höhe etwa 50 cm. August—Oktober.			
Chrysanthemum, Margerite, Wucherblume. Kompositen.			
corymbosum (Tanacetum, Pyrethrum) Rainfarn	— 50	—	—
Fiederspaltige Blätter, doldentraubige, weisse Blütenköpfe, Höhe 0.50—1 m. Juni—August.			
indicum plenum (Ch. japonicum), Garten-Chrysanthemum.			
Altgold	— 30	2.50	20.—
Gedrungen, mit kleinen halbkugeligen Pompon-Blüten. Hervor- ragende Gruppensorte für Massenwirkung, leuchtend goldbronzegelb, nach aussen mehr gerollt und in Rot übergehend. Höhe 50 cm. September.			
Anastasia	— 30	2.50	—
Überschüttet mit Massen kleiner Pompon-Blüten, feingeformt, leuchtend dunkelkarminrosa, Höhe 50 cm. September—Oktober.			
Champ d'Or	— 40	3.50	—
Schöne, niedrige Gruppensorte mit mittelgrossen Blüten. Wichtig unter den längstblühenden. Edle Blumen, wie japanische Chrysan- themen gelockt, glänzend leuchtend gelb, Höhe 70 cm, Oktober.			
Crimson Diana	— 40	3.50	—
Mittelgrosse bis grosse Blüten, dunkelbronze oder rotbraungelb erscheinend, Innenseite braunrot, Aussenseite golden. Sehr rund, kugelig werdend. Höhe 70 cm, Oktober.			
Dainty	— 35	3.—	—
Mittelgrosse bis grosse Blumen, dunkelrosa. Höhe 70 cm. September.			
Flamme	— 40	3.50	—
Mittelgross, scharlachbronze, rot mit gelb, an Dahlien erinnernd. Höhe 80 cm. September.			

Chrysanthemum (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
indicum plenum			
Frau W. Klapdor Frühblühend, klein pomponblütig, bei kurzem, breitverzweigtem Wuchs, für Gruppen und Töpfe, reinweiss. Höhe 50 cm. August bis September.	—35	3.—	25.—
Goldperle Mittelfrüh, pomponblütig, eigenartig vornehme, goldbraune Sorte. Höhe 70 cm. Oktober.	—35	—	—
Herbstbrokat Brauner Sport der Sorte „Anastasia“, sehr widerstandsfähig, stumpf goldbraun, von bläulichvioletten Reflexen durchschossen.	—35	3.—	25.—
Idi (Braune Normandie) Bronzefarbener Sport der Sorte „Normandie“. Sehr schöne, wertvolle Modifarbe. Höhe 75 cm. September.	—35	3.—	25.—
La Garonne Mittelgrosse Blumen, leuchtend terracottarot. Höhe 80 cm. Oktober.	—35	3.—	—
Madame Lyobard Sehr kräftig gestielte, herrlich weisse Sorte, grossblumig. Höhe 80 cm. Oktober.	—40	3.50	30.—
Margarethe Kiessling Sport von Mrs. Selby, herrlicher Dauerblüher, goldbraungelb. Höhe etwa 40 cm. September.	—35	3.—	—
Normandie Edelste aller rosa Sorten, mittelgrossblumig, sehr reichblühend. Höhe 80 cm. Oktober—November.	—35	3.—	25.—
Président Decaisne Kleinblumig, gelb, spätblühend.	—30	2.50	—
Pride of Cheston Besonders auffallend schönes Laub, im Aufblühen amarant-, später purpurrot.	—35	3.—	—
Ruby King Wichtigste Sorte unter den samtig Rotbraunen. Höhe 80 cm. Oktober.	—35	3.—	—
Spätgold Grosse, flache, schwefelgelbe Blume, sehr schön und haltbar. Höhe 80 cm. Oktober.	—35	3.—	—
Toulousaine Kleine, dichte Pomponblüte in vielblütigen Dolden, rotbraun mit bronze Hauch. Höhe 60 cm. Anfang Oktober.	—30	2.50	—
Verbesserte Miss Selby Edler Dauerblüher, kleinblumig, silberrosa. Höhe 40 cm. September.	—35	3.—	—
Zwergsonne Gelber Sport der Sorte „Altgold“, pomponblütig, leuchtend gold- gelb. Höhe 40 cm. September.	—30	2.50	20.—
In den schönsten Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen	—	—	20.—
Stecklingspflanzen mit Topfballen in vorgenannten Sorten nach meiner Wahl..... 1000 St. M. 100.—	—	—	12.—
Chrysanthemum Leucanthemum, maximum und serotinum (Chr. uliginosum), siehe unter Leucanthemum.			
Cimicifuga, Schlangenkraut, Silberkerze. Ranunculaceen.			
japonica Blütenrispe länger als bei C. racemosa, Pflanze niedriger, lockere Blütenrispen mit kleinen, weissen Blüthen. Bis 1,50 m hoch. Oktober bis Frost.	—60	5.—	45.—
racemosa Hübsche Art, bringt ihre sehr zahlreichen, kleinen, reinweissen Blüten in zylindrischen, ährenförmigen Trauben auf unverzweigten, kahlen, stielrunden Trieben schön aus dem meist grundständigen Laub heraus, erreicht nahezu 2 m. Ende Juli—August.	—60	5.50	—
Clematis, Waldrebe. Ranunculaceen.			
recta Nichttrunkende Waldrebe mit weissblütigen, grossen, rispigen Trug- dolden. Höhe 0,50—1 m, für trockene Stellen im Park. Juni—Juli. Weitere Arten siehe Schlingpflanzen.	1.50	14.—	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Convallaria , Liliaceen.			
majalis , Maiglöckchen	— .25	2.—	15.—
Altbekannte, heimische Liliacee mit kriechendem Rizom, ellip- tischen, grünen Blättern und weissen, prächtig duftenden Blüten- trauben, Höhe 20 cm, Mai, kurz vor oder mit den neuen Blättern.			
» grandiflora	— .30	2.50	20.—
Mit breiteren Blättern und grossen, breitglockigen Blütenständen. Äusserst wüchsige Form.			
Polygonatum (<i>Polygonatum officinale</i>)	— .35	3.—	25.—
Stengel kantig und gebogen, Blätter nach oben stehend, Blüten hängend, achselständig, zu 1—2 sitzend, Einzelblüte 3—4 cm gross, Höhe bis 50 cm, Juni, für Park im Halbschatten.			
Coreopsis , Mädchenauge, Wanzenblume. Kompositen.			
grandiflora , B.	— .30	2.50	20.—
Bringt eine Fülle langgestielter, edelgeformter, breitstrahliger Blüten hervor von prächtiger, klar goldgelber Färbung. Beste für Blumenschnitt. Höhe etwa 60 cm. Juni bis Frost.			
verticillata (<i>C. tenuifolia</i>)	— .40	3.50	—
Blätter zierlich, fein zerteilt, Blüten gelb, klein. Höhe 75 cm. Juli—September.			
Corydalis , Erdraucharten, Hohlwurz, Taubenkropf. Fumariaceen.			
cava (<i>C. bulbosa</i>)	— .40	—	—
Blüten leicht purpurn, 15—30 cm hoch. Ende März—April.			
lutea , gelber Lerchensporn, B.	— .30	2.80	25.—
Unverwüsthliche Pflanze unter den Dauerblüheren im Steingarten. Zierlich fiederteilige Balaubung, blaugrün, Blüten zitronengelb. Höhe 20—30 cm. Juni—September.			
ophiocarpa , B.	— .30	—	—
Ziemlich hoch wachsend, schlangenfrüchtig, oft nur zweijährig.			
Scouleri , B.	— .30	2.80	—
Treibt unterirdische Ausläufer, rosa, halbschattig, Höhe über 60 cm. Mai—Juni.			
solida (<i>C. digitata</i>), B.	— .40	—	—
Stengel in Knolle endend, Blüten trüb purpurn, für Schatten, Höhe etwa 15 cm, frühblühend, ab Ende März.			
Crinum , Hakenlilie. Amaryllidaceen.			
Powellii (<i>Amaryllis Powellii</i>), Freiland-Amaryllis, starke Pflanzen	1.—	9.—	80.—
Grosse, kräftige, amaryllisähnliche Blüten auf kräftigen Stielen zu 6—8 vereint, dunkelrosa, Laub dekorativ, lange, schmale, grau- grüne Blätter. Höhe über 1 m. Juli—August.			
» album starke Pflanzen	1.—	9.—	80.—
Weissblühende, prächtige Abart der vorigen.			
» intermedium » »	1.—	9.—	—
Hellrosa blühend, zwischen beiden obigen stehend in der Farbe.			
Crucianella , Rubiaceen.			
stylosa (<i>Phuopsis, Asperula</i>)	— .40	3.50	—
Waldmeisterähnliche Staude mit quirligen, lanzettlichen Blättern, Blüte karminpurpur. Mai—Juli.			
Cyclamen , Alpenveilchen, Primulaceen.			
europaeum	— .35	3.—	25.—
Blätter meist immergrün, Blüte karminrot. Juli—Oktober.			
Daboecia (<i>Menziesia</i>), siehe Laubhölzer.			
Delphinium , Rittersporn. Ranunculaceen.			
atropurpureum	— .45	4.—	35.—
Früheste aller Delphinium-Sorten, die grossen Blumen sind leuchtend purpurviolett mit schwarzer Mitte.			
hybridum Amos Perry	— .40	3.50	30.—
Halbgefüllt, rosa malvenfarbig, himmelblau angehaucht und ge- adert, mit schwarzem Auge, äussere Petalen himmelblau, sehr regel- mässige, runde Blumen.			
» Andenken an August Koenemann	— .50	4.50	40.—
Blütenstiele dicht über dem Boden gut verzweigt, Höhe ca. 100 cm; Farbe eigenartig leuchtend lasur kobaltblau, die Seiten- blätter an den Spitzen rosa gefärbt, Mitte weiss, lichtblau um- randet, locker gestellte Riesen-Einzelblumen.			

Delphinium (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
hybridum Arnold Böcklin	—50	4.50	40.—
Tiefenzianblaue, hochwachsende, kräftige Sorte von absoluter Meltaufreihheit, mittelgrosse Blüten, Seitenrispen ausserordentlich reichblühend.			
» Belladonna	—45	4.—	—
Elegante, himmelblaue, einfache Blütenrispen, niedrig und remontierend.			
» Belladonna Capri	—45	4.—	35.—
Das beste himmelblaue, einfache Delphinium. Edelgeformte Blüten in reichverzweigter Rispe.			
» Belladonna Dan Leno	—45	4.—	35.—
Mit besonders leuchtenden, hellkobaltblauen, einfachen Blüten mit weisser Mitte.			
» Belladonna grandiflorum	—45	4.—	35.—
Grossblumig, Stiele kräftiger, widerstandsfähiger und Blumen grösser und schöner als bei der Stammart.			
» Belladonna Lamartine	—50	4.50	40.—
Hervorragend schöne, tiefdunkelblaue Sorte, einfach, für alle Zwecke, widerstandsfähig gegen Meltau.			
» Belladonna Moerheimi	—45	4.—	35.—
Fast reinweiss, reichblühend mit grossen Rispen edelster Blumen. Meltaufrei und kräftig wachsend, im Verein mit den blauen Sorten prächtig.			
» Belladonna Mrs. J. S. Brunton	—45	4.—	—
Die schöngeformten Blumen sind leuchtend himmelblau mit weissem Auge. Zahlreiche Blütenstiele stark remontierend, gänzlich meltaufrei, überaus wirkungsvoll.			
» Belladonna Salland	—40	3.50	30.—
Einfache, prächtig dunkelblaue, grosse Blumen in lockeren Rispen.			
» Belladonna semiplenum	—45	4.—	35.—
Ähnlich der Stammart, aber halbgefüllt mit zartrosa Schein.			
» Belladonna Schwalbach	—45	4.—	35.—
Kompakter, niedriger und fester Wuchs, daher gegen Wind äusserst widerstandsfähig. Die zahlreichen, festen, straffen Blütenstiele verzweigen sich direkt über dem Erdboden und blühen gleichzeitig in zart himmelblauer Farbe. Prächtiges Gruppen-Delphinium.			
» Frau Emma Metzger	—40	3.50	30.—
Lieblich hellblau, mit grosser, weislichrosa Mitte. Farbe sehr frisch und lebhaft.			
» King of Delphinium	—50	4.50	40.—
Ultramarinblau mit weinrot und weisser Mitte, halbgefüllt, bis 4 cm grosse Einzelblüten. Einer der hervorragendsten Rittersporne.			
» Lize	—45	4.—	35.—
Sehr grosse, schöne, einfache Blumen in hohen Blütenrispen, leuchtend hellblau mit grosser, weisser Mitte. Widerstandsfähig gegen Meltau.			
» Mikie Ruys	—45	—	—
Halbgefüllte Blumen von rahmweisser Farbe mit gelbem Auge, ungefähr 90 cm hoch.			
» Mirabeau	—45	4.—	35.—
Ausser leuchtend blau, Mitte rötlich gefärbt, grosse, lockere Rispen.			
» Zuster Lugten	—45	4.—	35.—
Kräftigwachsend, mit gefüllten, flachen Blumen von edler Form und dunkelblauer Farbe. Dichtgedrängte, stumpfe Blütenstände.			
In schönsten Sorten meiner Wahl, 1000 Stück M. 250.—	—	—	30.—
Dianthus, Nelke. Caryophyllaceen.			
atrorubens	—35	3.—	25.—
Hohe, straffe Blütenstiele mit mehrblütigen Köpfen, leuchtend dunkelscharlachrot, ca. 75 cm hoch. Juni—Juli.			
carthusianorum purpureus plenus	—40	3.50	—
Lieblich rot, gefüllt.			
» roseus plenus	—40	3.50	—
Zartrosa, gefüllt.			
deltoides	—25	2.—	15.—
Rosa Blüthen mit purpurnem Ring auf vielverzweigten Stielen.			
» Brillant	—35	3.—	—
Niederliegend, lockerrasig, leuchtend karminrot, reichblühend, williger Wachser, ca. 30 cm hoch. Juni.			

Dianthus (Fortsetzung):	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
fragrans Niedrig polstrig, Blüten leicht rosaweiss, stark duftend, Höhe bis 30 cm. Juni.	—35	3.—	25.—
Pancizi Rotblühend, ähnlich <i>D. atrorubens</i> nur nicht so leuchtend.	—35	3.—	—
plumarius Diamant Weiss, gefüllt, grossblumig und sehr edle, ganzrandige Blüten. Mitte Juni.	—35	3.—	25.—
» Marktkönigin Gute, wüchsige Sorte, hat das weisseste Silberlaub aller Sorten. Blüte schön reinweiss. Juni.	—35	3.—	25.—
» Mrs. Sinkins Reinweiss, sehr reichblühende Sorte mit grossen, dichtgefüllten Blüten von sehr würzigem Geruch. Früheste der weissen Sorten. Als Knospe geschnitten, sehr haltbare Schnittblume. Juni.	—35	3.—	25.—
» Roter Vorbote Die zahlreichen Blüten sind lebhaft karminrot, mittelgross, mit feingeschlitzten Blütenblättern. Duft nicht sehr stark, früheste aller plumarius-Nelken. Ende Mai.	—35	3.—	25.—
» Schneeball Sehr schöne, weisse, ballartige Form.	—50	4.50	—
» Schöne von Prag Belaubung grünlichgrau, Blüten gross, locker, zartrosa mit dunklen Flecken am Grunde. Juni.	—35	3.—	25.—
» in den schönsten Sorten meiner Wahl	—	—	20.—
suavis, Duftnelke Sehr reichblühend, weiss, aber kleiner als <i>D. plumarius</i> . Sehr reizende Blütenfülle, locker überhängend über dem grünen Blatt- werk. Höhe 20—25 cm. Ende Mai.	—30	2.50	20.—
superbus nanus Leicht rosa Blüten, sehr schön feingeschlitzte Blütenblätter, sehr zierliche Erscheinung. Höhe ca. 20 cm. Mitte Juni.	—35	3.—	—
Dicentra , siehe <i>Dielytra</i> .			
Dictamnus , <i>Diptam.</i> Rutaceen.			
caucasicus Blüten rosa, dunkel gestrichelt, sehr üppiger Wachser, aroma- tisch duftendes Laub. Höhe etwa 1 m. Juni.	—50	4.—	—
Fraxinella, B. Ansehnliche, traubige Blütenstände, dunkelrosa, wegen der Brennbarkeit des aromatischen, ätherischen Öls, das im Laub ent- halten ist, auch „Brennender Busch“ und „Gaspflanze“ genannt. Höhe 50—75 cm. Mai—Juli.	—50	4.—	—
» alba, B. Weissblühende Abart der vorigen.	—50	4.—	—
Dielytra , Herzblume, Flammendes Herz. <i>Fumariaceen</i> .			
eximia Etwa 30 cm hohe Pflanze mit schönem, blassgraugrünem Laub. Blütentrauben frei über dem Laub, rosarot mit netter Zeichnung und verhältnismässig langer Form. Blüht ab Juni den ganzen Sommer hindurch.	—35	3.—	25.—
formosa Mehr grüne Belaubung, besonders im Austrieb, als vorige. Die blassrosaroten Blüten sind fast gleich denen von <i>D. eximia</i> in Form und Farbe. Höhe etwa 30 cm. Mai bis Sommerende.	—35	3.—	25.—
spectabilis, B. Tränendes Herz 1000 Stück M. 280.— Weithin wirkende, rosablühende Schmuckstaude, im Alter sehr gross werdend. Höhe 50—100 cm. Mai—Juni. Zur Treiberei sehr geeignet.	—40	3.50	30.—
Digitalis , Fingerhut. <i>Scrophulariaceen</i> .			
grandiflora (D. ambigua) Heimische Staude mit ährigen Blütenständen. Blüten gross, weitglockig, hellgelb, inwendig mit einem undeutlichen, braunen Adernetze. Juni—August.	—30	2.50	—
lutea Ebenfalls heimische Staude mit gelben Blüten, in allen Teilen kleiner als <i>D. grandiflora</i> .	—30	2.50	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Dodecatheon , Göttergabe, Götterblume. Primulaceen.			
Meadia-Hybriden	—50	4.50	40.—
Wunderhübsche Staude mit grundständigen, oval-länglichen, tiefgrünen Blättern und cyclamenähnlichen Blüten, violettrosa bis rötlich gefärbt zu mehreren an 30 cm langem Stiel, frei über der Blattrosette, Mai—Juni.			
Doronicum , Frühlingsmargerite, Gemswurz. Kompositen.			
caucasicum	—30	2.50	20.—
Wertvolle Frühlingsstaude mit grundständigen, frischgrünen Blättern und ziemlich grossen, lebhaft goldgelben Blüten. Sehr frühblühend, April—Mai, Höhe 25—30 cm.			
Columnae (D. cordifolium)	—30	2.50	20.—
Im Laub nicht so üppig wie D. cauc. magnificum, aber sonst sehr robuste und anspruchslose Art, mit zugespitzten Blütenblättern, nicht so gezähnt und nicht so breit, daher viel zierlicher erscheinend, Höhe 40—50 cm, April—Mai.			
plantagineum	—35	3.—	25.—
Sehr grossblumige und langstielige Art von grosser Reichblütigkeit, Höhe 75—100 cm, Mai.			
» excelsum (Harper Crewe)	—35	3.—	25.—
Grösstblumige Sorte, herrliche Schnittstaude, Laub im Austrieb viel dunkelgrüner als D. plantagineum, ebenfalls sind die Blütenstiele nicht so sehr mit Laub besetzt, daher Wirkung bedeutend besser, Höhe 80—100 cm, Mai—Juni.			
Dracocephalum , Drachenkopf, Etagen-Erika. Labiaten.			
Ruyschianum (Ruyschiana spicata)	—40	3.50	—
Blätter ganzrandig, gegenständig, lanzettlich an wenig verzweigten Stengeln, Höhe 25—40 cm, dunkelblaue, dichte Ähren. Juni—Juli.			
virginianum , siehe Physostegia.			
Echinacea purpurea, siehe Rudbeckia.			
Echinops , Kugeldistel. Kompositen.			
humilis , B.	—40	3.50	30.—
Blütenköpfe intensiv dunkelblau, kugelförmig, Höhe etwa 1 m, Juli—August.			
Ritro	—40	3.50	—
Blätter doppelt federspaltig, Blüten leuchtend hellblau, gegen 1 m hoch.			
Epimedium , Sockenblume, Elfenblume. Berberidaceen.			
alpinum , B.	—50	4.50	40.—
Pflanze mit kriechendem Wurzelstock, dreizähligen, lanzett-herzförmigen Blättern und 15—20 cm hohen, dünnen Blütenschäften, mit lockeren Trauben kleiner Blüten, purpurn mit gelb, April—Mai, sehr reichblühend, Höhe bis 30 cm.			
lilacinum , B.	—50	4.50	40.—
Zierliche Pflanze mit zahlreichen kleinen, helllila-farbigten Blüten. Höhe etwa 15 cm, Mai.			
niveum , B.	—60	5.—	45.—
Eine in allen Teilen kleinere Pflanze mit weithin leuchtenden, sehr schönen, verhältnismässig grossen, schneeweissen Blüten, in reicher Fülle frei über dem Laub, Höhe 10—15 cm, Mai.			
pinnatum , B.	—50	4.50	40.—
Stark lederartige Belaubung, dünne Blütenschäfte von etwa 20 cm Höhe, Blumen gelb, kurzgestielt, in länglichen Trauben, April. Austrieb schön dunkelrot, unterseits dicht flaumartig behaart.			
sulfureum , B.	—60	5.—	45.—
Blumen gross, in gedrängten Trauben, zart schwefelgelb, zarte, leuchtende Binfarbe, Höhe bis 25 cm, Mai.			
violaceum , B.	—50	4.50	40.—
Blumen schön, gross, hellviolett, langgespornt, Höhe etwa 20 cm, Mai.			
Eremurus , Kleopatranadel, Lilienschweif. Liliaceen.			
Bungei perfectus	5.—	—	—
Blätter schmal, bläulichgrün, leuchtend dunkelorange, spätblühend, wenn die anderen Sorten längst abgeblüht sind, daher besonders wert- und wirkungsvoll.			

Eremurus (Fortsetzung):

Elwesianus starke Pflanzen
extra » » 4.— 6.—

In allen Teilen die üppigste Sorte. Höhe mitunter 3 m, Blattwerk lebhaft grün in dichter, aufrechter Rosette. Sehr kräftige und breite Blütschäfte von zartrosa Färbung mit goldgelben Staubgefässen, Mai—Juni.

Kaufmanni (spectabilis) starke Pflanzen —.70 6.— 50.—

Interessante Species von etwa Meterhöhe, mit grünlichgelber Blütenrispe, Mai—Juni, zur Zwischenpflanzung zwischen obige Sorten.

Erica, siehe Laubhölzer.

Erigeron, Berufungs- oder Beschreikraut, Frühaster. Kompositen.

glabellus —.35 3.— —
Ziemlich niedrige Form, Blüten blassrötlichviolett. Höhe ca. 30 cm, Juni.

hybridus Antwerpia —.35 3.— 25.—
Sehr schöne, lila Blüten, reichblühend, strahlenförmig, grossblumig. Höhe 60—80 cm, von Ende Mai ab den ganzen Sommer blühend.

» **Quakeress** —.35 3.— 25.—
Mattrosalila, reichblühend, schöne, edle Blüte in unbeschreiblicher Fülle, mittelgross. Höhe 50—60 cm, Juni bis Herbst

macranthus superbus (Mesagrande speciosus grandiflorus) ... —.40 3.50 30.—
Blüten gross, tiefblauviolett, wohl die dunkelste Sorte mit lebhaft gelber Mitte, in lockeren, straffen Dolden. Höhe 50—60 cm, Juni—August. Vom Mesagrande-Gebirge stammend.

speciosus semiplenus —.40 3.50 30.—
Blüte prächtig dunkelblau, durch die 3—5 Reihen Strahlenblüten sieht die Blüte edler und voller aus als die einfachen Sorten. Höhe etwa 50 cm, Juni—August.

superbus grandiflorus —.40 3.50 30.—
Besonders grosse Blüte von schöner, rein dunkelvioletter Farbe, Blüte neigt zur Füllung und Monstrosität.

Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferen.

alpinum, Alpenedeldistel, **B.** —.40 3.50 30.—
Blütenköpfe von auffallender Schmuckwirkung. Die Blumenkrone sowie deren zierlich geschlitzten Hüllblätter und Blumenstiele sind stahlblau und von grosser Haltbarkeit, Höhe 60—80 cm, Juni—August.

giganteum, Elfenbeindistel, **B.** —.40 3.50 30.—
Sehr ansehnliche Pflanze, meist nur zweijährig, mit walzigen Blütenköpfen, von breiter Blattrosette umgeben, die aus scharf stachelspitzigen, vielfach zerteilten Blättchen besteht, welche auf hellgrünem Grunde eine elfenbeinweisse Zeichnung haben. Wird sehr stark von Bienen befliegen. Höhe 50—75 cm, Juni—August.

hybridum Juwel (E. Zabelii Juwel), **B.** —.50 4.— 35.—
Die ganzen Blütenstände, also Stiele, Hüllblätter und Köpfe, färben sich sehr früh herrlich dunkelstahlblau, Höhe 50—70 cm, Mitte Juni.

» **Violetta** (E. Zabelii Violetta), **B.** —.50 4.— 35.—
Ähnlich der vorigen. Auffallender durch die wirkungsvolle, violette Färbung der Blütenstände, Höhe 50—70 cm, Mitte Juni.

planum, **B.** —.35 3.— 25.—
Sehr zierliche Staude mit zahlreichen, verzweigten Blütenköpfchen, länglich rund, von prächtig stahlblauer Farbe, kleinköpfigste Art, Höhe bis 1,5 m, Juli—August.

Erythrochaete. Kompositen.

palmatifidum (Senecio japonicus) —.50 4.50 —
Staude mit sehr grossen 7—11teiligen Blättern. Die hübschen, orangegelben Blumen stehen in verzweigten Blütenständen. Als Einzelpflanze im Rasen an feuchten Stellen, Höhe 80—120 cm, Juli.

Eupatorium, Kunigundenkraut, Wasserdost. Kompositen.

cannabinum plenum —.40 3.50 30.—
Blüten gefüllt, leuchtend purpurrosa, in endständigen Blütensträussen. Prachtvolle Uferstaude, Höhe 1,5 m, August—September.

purpureum —.50 — —
Blätter quirlig, auf 1,5 cm hohen, unverzweigten Trieben eine Doldentraube von schön purpur-weinroter Färbung. Juli—August.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Euphorbia , Wolfsmilch. Euphorbiaceen.			
polychroma	—50	450	40.—
Dichtbuschige Rabattenstaude mit sehr leuchtenden, zitronen- gelben Blütendolden für trockene, sandige Lagen. Höhe 50 cm, Mai—Juni, auch Treibstaude.			
Fuchsia , siehe Laubhölzer.			
Funkia , Funkie, Taglilie. Liliaceen.			
chinensis	—35	3.—	28.—
besonders starke Pflanzen Blatt länglich eiförmig, gelblichgrün, Blütentriebe bis 1 m hoch, Blüten einseitig hängend, von heller, bläulichlila Färbung.			
» maculata	—35	3.—	28.—
Grossblättrig, gelblich gefleckt, wohl die früheste aller Funkien in Blüte.			
japonica alba	—35	3.—	28.—
Kleines, grünes Laub, niedrige Staude, reinweissblühend.			
» albo-marginata	—45	4.—	35.—
Wohl schönste Art mit weissgerandetem Blatt, schön zugespitztes Laub mittlerer Grösse.			
» albo-marginata lutescens	—45	4.—	—
Hellgrünes Laub, leicht weiss gerandet.			
» aurea	—45	4.—	35.—
Im Frühjahr gelbgrünes Laub, verhältnismässig kleinblättrig.			
» aurea maculata	—35	3.—	28.—
Mittelgrosses Blatt, grün und gelbbunt, ziemlich kleine Blüte in niedrigen Blütenständen.			
» Fortunei	—45	4.—	35.—
Laub breit und gross, blaugrau bis stahlblau, Blütenstiele kräftig, Blüte nahezu weiss, leicht lilaret angehaucht			
» Fortunei robusta	—45	4.—	—
Sehr starkwüchsig, wohl blaueste aller Sorten, auffallend runde, feste Blätter.			
» Fortunei variegata	—45	4.—	35.—
Hell-, dunkel- und graugrün gezeichnete Blätter, Blüte fast weiss.			
» gigantea	—45	4.—	35.—
Grosses, breites Laub, lebhaftgrün, wohl die grösstblättrigste aller Sorten.			
» glauca	—35	3.—	28.—
Sehr grosses, breites Laub, blaugrau.			
» glaucescens	—35	3.—	28.—
Grosses, breites Laub, grünlichgrau, sehr dekorativ.			
» lanceolata	—35	3.—	28.—
Vollkommen schmalblättrige, grüne Art. Sehr interessant und Abwechslung bringend.			
» maculata	—35	3.—	28.—
Ziemlich schmalblättrige und spätblühende Art.			
» ovata	—35	3.—	28.—
Blatt breit eiförmig, dunkelgrün, auffallend dunkle Blüte und hohe Stiele.			
» spathulata albo-marginata	—35	3.—	—
Ziemlich kleines, weiss gerandetes Blatt, Blüte sehr schön dunkel.			
» undulata medio-picta	—45	4.—	35.—
Stark weissbunte, kleinblättrige Art, mit schön gewellten und gedrehten Blättern, vorzüglich zur Topftreiberei.			
» univittata	—35	3.—	28.—
Ziemlich längliches Blatt mit lebhaft weissem Strich in der Blattmitte und den ganzen Blattstiel entlang. Sehr lebhaft und schön.			
» variegata	—40	350	30.—
Erinnert an F. undulata medio-picta, jedoch nicht so lebhaft bunt und nicht so stark gewellt.			
» viridissima marginata	—35	3.—	28.—
Ziemlich grosses Blatt, hell- und dunkelgrün gezeichnet, Rand dunkelgrün.			
In den schönsten Sorten meiner Wahl . 1000 St. M. 220.—	—	—	25.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Gaillardia , Kokardenblume. Kompositen.			
<i>grandiflora maxima</i> -Hybriden	—30	250	20.—
Prächtige, gelb und rot gefärbte, grosse Strahlenblüten auf kräftigen Stielen, Höhe 75—80 cm, Juni—August.			
Galax , Bronzeblatt. Diapensiaceen.			
<i>aphylla</i>	2.—	—	—
Seltene Schattenpflanze mit kleinen, immergrünen, herzförmigen Blättern und kleinen, dichtbesetzten, weissen Blütenähren auf nackten Schäften. Höhe etwa 20 cm, Mai—Juni.			
Galega , Geissraute. Papilionaceen.			
<i>bicolor</i> Duchess of Bedford, B.	—40	350	—
Blüten lavendelblau und weiss, ziemlich grossblumig. Höhe 50—75 cm. Juni—August.			
<i>officinalis albiflora</i>	—40	350	30.—
Heimische Stauden, über 1 m hoch, weisse Schmetterlingsblüten in achselständigen Blütenrispen von grosser Zahl. Juli.			
<i>persica</i>	—40	350	—
Stauden mit straffem, weitverzweigtem Wuchs mit wickenartigen, blassblauen Blüten. Laub gröber als bei obiger Sorte.			
Galtonia .			
<i>candicans</i> (<i>Hyacinthus candicans</i>), Kap-Hyazinthe	—40	350	30.—
Zwiebelgewächs mit kräftigem, blaugrünem Laub, grossen, weissen Glocken, die an straffem Schaft hängen, Höhe 100—150 cm. Juli bis August. Nur zweijährig.			
Gentiana , Enzian. Gentianaceen.			
<i>acaulis</i> , stengelloser Alpen-Enzian	—50	450	40.—
Dunkelgrüne Blattrosette lederartiger Blätter, glockige, 4—6 cm grosse, aufrechtstehende Blüten von satt dunkelblauer Farbe, sehr grossblumig, Höhe etwa 10 cm. April—Juni.			
<i>alba</i> (<i>G. flavida</i>)	—35	3.—	28.—
Grosses, hellgrünes Blatt, 30×8 cm, Blüten mittelgross, weisslich, knäuelartig, 15—20 in einem Kopf vereinigt. Höhe 40 cm. Juli.			
<i>asclepiadea</i> , Schwalbenwurz	—50	450	40.—
Blüten azurblau, blattwinkelständig, Höhe 30—70 cm. Juli— September.			
» <i>alba</i>	—50	—	—
Weissblühende Abart der vorigen.			
<i>cruciata</i>	—35	3.—	—
Kleine Pflanze mit gegenständigen, ovallanzettlichen Blättern, Blüten gebüscht am Ende der Zweige, innen schön blau, aussen grau. Höhe 20 cm. Juli—August.			
<i>Fetisowi</i>	—35	3.—	28.—
Botanisch interessante, trübblaue Art. Höhe 30 cm. Juli.			
<i>lutea</i> , Gold-Enzian	—50	450	40.—
Blüten gelb, quirlständig an hohen Stengeln, Höhe 50—100 cm, Blätter breit-elliptisch. Juli—August.			
<i>purpurea</i>	—60	—	—
Tracht ähnlich <i>G. lutea</i> , Blätter mehr gefaltet, Blüten aussen hellpurpur, innen gelb. Höhe 40 cm. Juni—Juli.			
<i>septemfida</i>	—60	550	—
Hellblaue Knäuelblumen, Laub schön kreuzständig, dunkelgrün. Höhe 15—30 cm. Juli—September.			
<i>straminea</i>	—40	—	—
Laub grossblättrig, hellgrün, Blüten strohgelb. Höhe 30 cm. Juni—Juli.			
<i>tibetica</i>	—35	3.—	28.—
Robust aufrecht, grossblättrig, Blüten klein, weiss mit grünlichem Anhauch.			
<i>Walujewii</i>	—35	3.—	28.—
Weisslichblau blühende Art.			
Geranium , Storchschnabel. Geraniaceen.			
<i>gibbosum</i>	—30	250	20.—
Dunkles Blau mit hellerer Mitte, Höhe etwa 70 cm, Juni.			
<i>grandiflorum</i>	—30	250	20.—
Blüten tiefviolettblau, grossblumig, früh- u. reichblühend, da nur etwa 30 cm hoch, besonders wertvoll. Mai.			

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Geranium (Fortsetzung):			
ibericum	—30	2.50	20.—
Blüten hellblauviolett, verträgt viel Trockenheit und Sonne, Höhe etwa 60—70 cm, Mai—Juni.			
macrorrhizum	—35	3.—	—
Reichblühend, rot, mehr doldenartig zusammenstehend, Höhe, etwa 40 cm. Mai—Juni.			
platypetalum	—35	3.—	28.—
Wohl leuchtendste Sorte, hellblau mit purpur Aderung, grossblu- mig, Höhe etwa 60 cm. Juni.			
pratense album	—30	2.50	—
Wohl beste weisse Sorte, Höhe etwa 50 cm, Juni, lockerer Wuchs.			
» plenum	—35	3.—	—
Gefülltblühende Abart mit leuchtend violettblauen Blüten, Höhe etwa 50 cm, Mitte Juli.			
Geum , Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceen.			
atrosanguineum	—40	3.—	—
Blüten dunkler als G. coccineum. Wuchs auch höher, etwa 75 cm.			
coccineum	—40	3.—	25.—
Blüten scharlachrot mit orange Schein, Höhe etwa 40 cm, ab Mitte Mai in Blüte.			
Eweni	—30	2.50	—
Blüten orangefarben, halbgefüllt, sehr leuchtend, Höhe etwa 30 cm, Mai—Juni.			
Heldreichi splendens	—40	3.—	25.—
Besonders schön, leuchtend mennigrot, Blumen sehr gross, höhere Stiele, bis 40 cm hoch, Mai—Juni.			
Rossii	—30	2.50	20.—
Laub fein gefiedert, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün, Blüten satt schwefelgelb, etwa 3 cm Durchmesser, Höhe etwa 15—20 cm, Mai.			
Gillenia . Rosaceen.			
trifoliata	—50	—	—
Hübsche Staude mit aufrechten Zweigen, dreizähligen Blättern, Blüten langgestielt, in Rispen, reinweiss mit rosa Rand, Höhe etwa 75 cm, Juni.			
Glechoma , Gundermann, Gundelrebe. Labiaten.			
hederacea, B.	—20	1.80	15.—
Schnellwachsender Kriecher zur Bekleidung von Mauerresten. Im Park als Rasenersatz wertvoll. Blüten rot, in Blütenständen schön über dem Laub, Höhe etwa 15 cm. Mai.			
Gnaphalium Leontopodium, siehe Leontopodium.			
margaritaceum , siehe Antennaria.			
Gunnera , peruanischer Rhabarber. Halorhagidaceen.			
manicata	3.—	—	—
Riesige Blätter mit hellen Rippen und lockerem Wuchs, höher gestielten Blättern als G. scabra. Höhe 1,5—3 m. Juli.			
scabra (G. chilensis)	2.—	18.—	150.—
extra starke Pflanzen	2.50	22.—	200.—
Besonders raubblättrig, dichter, gedrungener Bau, Blätter mit grünen Rippen, verträgt mehr Trockenheit, Höhe etwa 1,5 m. Juli.			
Gypsophila , Gipskraut. Caryophyllaceen.			
libanotica	—35	3.—	25.—
Schöne, weisse Sternpolster, Höhe bis 30 cm. Juni.			
paniculata , Schleierkraut, B.	—40	3.50	30.—
Aufrechte, fein verästelte Pflanze. Die Blütenstände tragen gra- ziös die fein schleierartig kleinen, weissen Blüthen. Laub fein, grau, Höhe bis 1 m. Juli—September.			
» plena	—70	6.50	60.—
Herrliche Form der vorigen mit dichtgefüllten, äusserst zierlichen Blüthen, Höhe etwa 1 m. Juli—September.			
repens monstrosa, B.	—40	3.50	30.—
Grosse Rasen bildend, kriechend, sehr schön, rosablütig bis fast weiss, Blüthen bedeutend grösser als G. paniculata, Höhe 15—20 cm. Juni—August.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hacquetia , Schaftdolde. Umbelliferen.			
<i>epipactis</i>	—40	—	—
Ähnlich <i>Hepatica triloba</i> für schattigen, humosen Waldboden. Gelbgrüne Blüten in kopfförmigen, umhüllten Dolden. Höhe 10—20 cm. April—Mai.			
Harpalum (<i>Helianthus</i>), Sonnenblume. Kompositen.			
<i>rigidum</i> Daniel Dewar	—40	—	—
Sehr schöne Form der amerikanischen Sonnenblume mit dunkel- goldgelben Randblüten, die kaktus-dahlienartig zugespitzt sind. Juli-September. Wuchert!			
Helenium , Sonnenbraut. Kompositen.			
<i>autumnale</i> Crimson Beauty	—50	4.50	—
Höhe nur 60 cm, Blumen bronze-karminfarbig, auffallende Färbung.			
» Gartensonne	—35	3.—	25.—
Dankbar blühende Herbststauden, goldgelb mit samtbrauner Mitte, Höhe etwa 1,5 m. Ende August—Oktober.			
» Riverton Gem	—35	3.—	25.—
Goldlack- <i>Helenium</i> , prachtvoll goldlackrot, auffallend, Höhe etwa 1,5 m. Ende August—September.			
<i>grandicephalum cupreum</i>	—50	—	—
Dunkelgoldgelb mit schwärzlichbrauner Scheibe. Höhe 80 cm.			
» Julisonne	—35	3.—	25.—
Prächtig dunkelgelb, Strahlenblüten am Rande leicht braun schattiert, Mitte kugelig, schwarzbraun, Höhe 80—100 cm. Juli bis August.			
<i>Hoopesii</i>	—35	3.—	25.—
Orangegelbe Sonnenbraut von lockerer Tracht und langer Blüten- dauer mit grossen Strahlenblüten, Höhe etwa 60 cm. Mai—Juni.			
<i>pumilum magnificum</i>	—35	3.—	25.—
Prächtig reingelbe Blüten, sehr reichblühend und ziemlich niedrig, buschig bleibend, Höhe 60—75 cm. Juni—Juli.			
Helianthemum , Sonnenröschen, Felsröschen. Cistaceen.			
<i>amabile plenum</i> (Rubin).....	—35	3.—	25.—
Dunkelgrünes, kleines längliches Laub und scharlachrote, ge- füllte Blüten in grosser Anzahl von Ende Mai ab über den ganzen Sommer, Höhe etwa 20—30 cm.			
<i>mutabile atrosanguineum</i> , B.	—30	2.50	20.—
Mit silbern scheinendem Laub und einfachen, blutroten Blüten in reicher Fülle ab Ende Mai, Höhe etwa 20 cm.			
» <i>sulphureum plenum</i> (Gelbe Perle).....	—35	3.—	25.—
Lebhaft gelbe und dicht gefüllte Blüten im Juni bis Juli, Höhe etwa 15 cm.			
Helianthus , Sonnenblume. Kompositen.			
<i>multiflorus plenus</i>	—40	3.50	—
Dicht ballartig gefüllt mit krauser Mitte, im Herbst blühend, fast 2 m hoch.			
<i>tuberosus albus</i> , Edel-Tobinambur, Jerusalem-Artischoke....	—30	2.50	20.—
Ziemlich starker Wucherer zum Verwildern im Park in warmer Lage, entwickelt in günstigen Herbst den einen reichen Flor weisser Blüten. Knollen bildend.			
Heliopsis , Sonnenauge. Kompositen.			
<i>scabra zinniaeflora</i>	—35	3.—	25.—
Zinniaähnliche gelbe Blüten, auf kräftigem Stengel, dichtgefüllt und als Schnittblume sehr dauerhaft. Juli, Höhe etwa 80 cm.			
Helleborus , Christrose, Schneerose, Nieswurz. Ranunculaceen.			
Hybriden, B.	—35	3.—	25.—
Varietäten in reichem Farbenspiel von weiss bis blutrot und von langer Blütendauer, wertvolles, ornamentales, festes Laub. Höhe etwa 50 cm, Februar—März.			
<i>niger</i> , B.	—70	6.50	60.—
starke Pflanzen zur Topfkultur			
blühbare Freilandpflanzen	—60	5.—	45.—
Echte, reinweiss blühende Christrose. Stengel einfach, blattlos, Blätter wintergrün, Blüten teilweise aussen leicht rötlich an- gehaucht. Höhe etwa 20 cm, Dezember—März.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hemerocallis, Taglilie. Liliaceen.			
disticha plena (H. kwanso flore pleno)	— 50	4.50	—
Blüte gefüllt, sehr feine Farbe und edle Blume, unten hellgelb, innen rötlichgelb, äussere Blumentheile grösser, alle etwas wellig, Höhe 60 cm, Mai—August.			
fulva	— 30	2.50	—
Blumen gross, weit geöffnet, bräunlichorangerot und vollkom- men geruchlos, sehr hart und anspruchslos, Höhe 1,20 m, Juli—August.			
» variegata	— 30	2.50	—
Buntblättrige Abart der vorigen, bandartig gelblichweiss ge- streift. Etwas zarter als die Stammart.			
hybrida Aureola	— 30	2.50	20.—
Schöne, lange Blütenrispen, beste frühe, Belaubung schmal, dunkelgrün, Blüthenstände 4—8blumig, hellgoldgelb, Höhe 75 cm, Mai—Juni.			
» Dr. Regel (H. Middendorffii)	— 40	3.50	30.—
Zierlich belaubt, Blüten tief orange, sehr zu empfehlen, Höhe 50 cm, Mai—Juni, blüht im Herbst ein zweites Mal.			
» Gold Dust	— 30	2.50	—
Sehr reichblühend, dunkelgelb. Höhe 1,50 m, Juni—Juli.			
» Orange Man	— 30	2.50	—
Schmale, sattgrüne Belaubung, Blüthenstände verästelt, vielblumig, Blüte innen goldig kadmiengelb, aussen hellbräunlich, sehr reich- blühend, Höhe etwa 80 cm, Mai—Juni.			
» Sovereign	— 30	2.50	20.—
Grosse und schön geformte, hellorange-gelbe Blüten. Blüten- stiele straff aufrecht, bis 10blütig. Robuste, sattgrüne Belaubung, Höhe ca. 90 cm, Mai—Juni.			
luteola	— 75	—	—
Rein zitronengelb, 6—9 Blüten auf einem Stengel, Höhe 70 cm, Juli.			
Sieboldi	— 30	2.50	—
Blütenrispe meist 2blütig, von satt kadmiengelber Färbung mit bräunlicher Schattierung auf der Aussenseite, Höhe nur etwa 50 cm, Mai—Juni.			
Hepatica, Leberblümchen. Ranunculaceen.			
angulosa (H. transsylvanica)	— 40	—	—
Im Laub mächtiger als H. triloba, nicht so ausgesprochen 3lappig, hellblau, grossblumig, für Schatten.			
» coerulea	— 40	—	—
Wunderbar leuchtend, dunkelhimmelblau, sehr frühblühend und grossblumig.			
triloba coerulea	— 40	3.50	30.—
Blätter streng stumpf-dreilappig, ungezähnt, mit lebhaft himmel- blauen Blüten. Höhe 10—15 cm. März—April. Auch für tiefsten Schatten.			
» rubra	— 40	3.50	—
Wie vorige, nur mit schönen, roten Blüten.			
Hesperis, Nachtviole. Crucifere.			
matronalis	— 40	3.50	—
Aufrechte, buschige Pflanzen mit ziemlich grossen, leicht wohl- riechenden, weissen bis schwach lilafarbenen Blüten in grossen, end- ständigen Trauben. An einfache Levkojen erinnernd. Höhe 80—120 cm. Mai—Juni. Für den Park sehr wirkungsvoll, oft nur zweijährig.			
nivea	— 50	—	—
Nur halb so hoch wie H. matronalis, schneeweiss, ähnlich einer einfach blühenden Levkoje.			
Heuchera, Granatrispe, Purpurglückchen, Zwiere. Saxifragaceen.			
brizoides Caprice	— 35	3.—	—
Sehr gut garnierte Rispen, Blütenchen zart lachs-farbenrosa, Ende Mai. Höhe etwa 50 cm.			
» Chlocheton	— 40	—	—
Sehr grossblumig, breitglockig, leicht karminrosa, im Grunde zartrosa. Ende Mai.			
» Fusée	— 40	3.50	30.—
Rubinrot mit Kastanienbraun. Laub dunkelgrün, die gelben Staubfäden erleuchten den Schlund der Blüten sehr lebhaft. Nicht ganz so dunkel, aber grossglockiger als die Sorte „Saturnale“. Höhe 50 cm. Ende Mai.			

Heuchera (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
brizoides gracillima	—40	3.50	30.—
Reizende Hybride mit besonders zierlichen Rispen kleiner, zart rosafarbener Blütenchen. Sehr wertvoll. Höhe etwa 60 cm. Ende Mai.			
» gracillima superba	—50	—	—
Dunkler als H. briz. gracillima, höher und kräftiger, Bau etwas größer, Laub besonders silbrig bronziert. Höhe etwa 80 cm. Ende Mai.			
» Grenade	—40	3.50	30.—
Zahlreiche Blütenrispen, Blüten mittelgross, rot mit lebhaft karmin Schein. Sehr zierlich. Ende Mai.			
» Plejade	—40	3.50	—
Kräftige Rispen, grosse Glocken, dunkelgranatrot, am Grunde karminrot lackiert, nach „Pluie de Feu“ die leuchtendste, aber be- sonders grossglockig und langstielig Ende Mai.			
» Pluie de Feu	—40	3.50	30.—
Kräftig verzweigte Rispe, beste rotblumige, edle Sorte mit vielen, glühend scharlachroten Glöckchenpyramiden, deren jede lange Wochen in Blüte steht, ziemlich grossglockig. Ende Mai.			
» Poësie	—35	3.—	25.—
Kleinblumig, aber ungemein reichblühende Sorte mit zart rosa- weissen Blütenchen. Ende Mai.			
» Radium	—40	3.50	—
Dichtgedrängte Blütenstände, hellkarmin mit lebhaft karmin Spitzen, blüht etwas später im Juni.			
» Saturnale	—50	—	—
Mittelgrosse Blütenchen, rubinrot in schwärzliches Kastanienbraun übergehend. Die Staubgefässe rufen einen starken Kontrast hervor. Dunkelste aller Sorten. Ende Mai.			
sanguinea alba (H. alba)	—35	3.—	25.—
Mit hübschen, weissen Blütenrispen, leicht grünlich übertönt, Stiele hellgrün, Glöckchen ähnlich denen der gracillima-Sorten, nur etwas grösser. Höhe etwa 40 cm. Ab Ende Mai.			
tiarelloides alba	—75	—	—
Mehr tiarellaartige Sternblütchen von zierlicher, weisser Er- scheinung.			
Zabeliana	—40	3.50	—
Sehr grosse Einzelblütchen, leuchtend rosa. Besonders auffallend im Laub, schön grün und stark gewellt und gezackt. Ende Mai.			
In schönsten Sorten meiner Wahl	—	—	25.—
Hibiscus , Eibisch. Malvaceen.			
Moscheutos	—40	—	—
Üppige, buschige Pflanzen mit eiförmigen, kaum gelappten, unten weissfilzigen Blättern und sehr grossen, rosafarbenen oder rein weissen Blüten mit purpurnem Auge. Höhe etwa 1 m. September bis Oktober. Für feuchte Lagen.			
palustris	—40	3.50	—
Im Laub heller als Moscheutos.			
» Meehans Pink	—40	—	—
Die grossen Blüten variieren in herrlichen, rosafarbenen Tönen.			
» roseus	—50	—	—
Sehr grossblumig, rosa.			
ponticus	—40	3.50	—
Blüht später als H. palustris, mit etwas breiteren, spitz-drei- lappigen Blättern, weiss.			
Hieracium , Habichtskraut. Kompositen.			
aurantiacum, B.	—25	2.—	15.—
Grünblättrig, Blüten zu 3—10 in lockeren Doldenrispen, orange- rot, wuchert ziemlich stark. Höhe etwa 50 cm. Juli—September für den Park zum Verwildern.			
rubrum, B. (H. aurantiacum × H. pilosella)	—25	2.—	15.—
Blüten leuchtend dunkelorange, trägt keinen Samen, wird daher nicht zum lästigen Unkraut. Höhe etwa 30 cm. Juli—August. Blüten einzeln, nicht in Dolden.			
villosum	—40	—	—
Silberweiss zottige Art, nicht wuchernd, Blüten gelb, Stengel ein- bis dreiköpfig, Juni—Juli.			

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Houstonia. Rubiaceen.			
serpyllifolia	— .25	2.—	15.—
Kleines, quendelblättriges Laub und zierliche, rosa bis himmel- blaue Sternblüthen in reicher Fülle, dichte Blütenpolster bildend, kriechend. Anfang Mai, für Steingärten und Plattenwege im Halb- schatten. Höhe etwa 10 cm.			
Hyacinthus (Muscari). Traubenhyazinthe. Liliaceen.			
botryoides, B. 1000 Stück M. 60.—	— .15	1.—	8.—
Frischgrüne Blätter steif aufrecht, Blütentrauben walzig, blau mit weissen Spitzen. Höhe etwa 15 cm. April—Mai.			
» albus, B.	— .25	2.—	15.—
Reinweiss blühende Abart, herrlich für Steingärten in sonniger Lage.			
candicans , siehe Galtonia.			
Hypericum , siehe Laubhölzer.			
Iberis , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferen.			
corifolia	— .30	2.50	20.—
Blätter lederig, gewimpert. Schöne, dichtbuschige Staude mit kleiner, dunkelgrüner Belaubung. Die 4 cm breiten Blütendolden mehr zylindrisch als bei den anderen Arten, ebenfalls reinweiss, aber später blühend. Höhe bis 20 cm. Mai.			
sempervirens Little Gem (Weisser Zwerg)	— .35	3.—	25.—
Sehr niedrig, Belaubung glatt, dunkelgrün, blüht in zahlreichen, die ganze Pflanze bedeckenden Dolden, prächtig reinweiss, Höhe 15 cm, Mai.			
» Schneeflocke	— .35	3.—	25.—
Mittelspät, überaus reichblühend, grossblumige, prächtig weisse Blütenkissen, Höhe etwa 20 cm, Mai.			
Incarvillea , Freiland-Gloxinie. Bignoniaceae.			
Delavayi 1000 Stück M. 220 —	— .35	3.—	25.—
Mit Wurzelknollen, Fiederblätter gross, Blütenschäfte 50—75 cm hoch, am oberen Ende gehäuft, 6—12 Blüten tragend. Blüte trom- petenförmig, tiefrosenrot mit gelber und brauner Zeichnung am Schlund, Höhe etwa 75 cm, Mai—Juni.			
grandiflora 1000 Stück M. 180.—	— .30	2.50	20.—
Belaubung grundständige Rosette, Blüten einzeln oder zu weni- gen auf 10—15 cm hohem, starkem Stiel. Einzelblüte bedeutend grösser und schöner als bei I. Delavayi, 4—6 cm gestielt, mit fünf- kantigem, grünem, schwarzpunktiertem Kelch, Blumenkrone röhrig, 5—10 cm Durchmesser. Färbung leuchtend hellkarminrot, die Röhre innen goldgelb und am Rande mit weissen Bändern versehen. Blüht vor I. Delavayi, Mai.			
Inula , Alant Kompositen.			
ensifolia (I. bubonium)	— .35	3.—	25.—
Kugeliger Busch, Blätter lineal-lanzettlich, Blüten klargelb, Höhe 20—30 cm, Juli—August.			
Helenium	— .50	—	—
Blätter gross, spitz herzförmig, unterseits filzig, Blütenstände doldenrispig, gelb. Höhe über 1 m.			

Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceen.**Iris germanica**

100 Stück in 10 verschiedenen, nachstehend aufgeführten, älteren Sorten
nach meiner freien Wahl M. 15.—, 1000 Stück M. 120.—

100 Stück in 10 verschiedenen, nachstehend aufgeführten, besseren Sorten
nach meiner freien Wahl M. 25.—

Nach der Wahl des Bestellers

pro Stück M. —.40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.—

Die mit × bezeichneten Sorten sind hundertweise abgebar. Wenn nicht ausdrücklich
Ersatz verboten ist, erlaube ich mir, etwa vergriffene Sorten durch ähnliche, möglichst
gleichwertige zu ersetzen.

Agatha.

Dom rosallila, Hängeblätter in samtig
Purpur übergehend.

Agnes Sorel.

Dom hellblau mit lila Schein, oft ge-
streift, Hängeblätter samtig blauviolett.

Alcazar pro Stück M. —.75

Dom offen, helllila, Hängeblätter samtig-
violett, am Grunde bräunlich geädert.

amabilis.

Dom helllila, Rand dunkler, stark gewellt,
Hängeblätter in Purpur auslaufend, weiss-
grundig mit dunkelpurpurner Aderung.

Iris (Fortsetzung):**Amelie.**

Dom leuchtend purpurblau, Hängeblätter schwärzlichpurpurblau, samtig glänzend.

× Antiope.

Dom stahlblau, auf gelbem Grunde leicht dunkel punktiert. Hängeblätter hellpurpur, gelblich genetzt.

Apollon.

Dom azurblau, Hängeblätter hellpurpur, gelblichweiss genetzt.

Augustina.

Dom bronzirt kupfriggelb, Hängeblätter gelb, schwarz schattiert, braunrot genetzt.

Augustus.

Dom lila, Hängeblätter dunkler getönt, am Ende in Violett übergehend, violette Aderung auf weissem Grunde.

× aurea.

Dom gelb bis kanariengelb. Hängeblätter zart geädert, am Bartende weisslich getönt, Dom im Verblühen etwas dunkler werdend.

Bariensis.

Dom weiss, lila bordiert, Hängeblätter weiss mit gelbem Schein, ebenfalls bordiert.

Baron Prévost.

Dom kupfrig ledergelb, Hängeblätter samtig purpurblau, im Grunde gelblich.

Bigotini.

Dom orangeschwefelgelb, rötlichbraun geädert, Fallblätter am Grunde und Rande gelblich, in der Mitte fast weiss mit lebhafter, rötlichbrauner Aderung.

× Bossuet.

Dom bronzefarbig, nach oben bläulich aschgrau werdend, Hängeblätter im Grunde braunrot geädert, purpur geflammt mit tiefpurpurlauer Aderung und violettem Anflug.

× Britannicus.

Dom rosig bronzirt mit leicht lila Anflug, Hängeblätter rosigviolett mit leicht schwefelgelbem Rand und dunklerer Aderung.

× Calypso.

Dom weisslichlila, im Grunde schwefelgelb, Hängeblätter weisslich mit blauvioletter Aderung.

× Caroline de Sansal.

Hellgelb mit Elfenbeinweiss, purpur Streifen.

Celeste.

Ganze Blume zart seidigblau.

× Chaméleon.

Dom einfarbig blau, dunkler blau geflammt, stark gewellt, Hängeblätter purpurviolett.

Charles Martell.

Dom gelb, Hängeblätter weiss mit fahlgelbem Schein, braunrot geädert.

Chloris.

Dom schwefelgelb mit kanariengelbem Grund, Hängeblätter weisslich, am Grunde gelblich mit rotbrauner Aderung.

× Cléopâtre.

Dom feurig kupfern in gelben Grund übergehend, mit lebhaft schwärzlichkarmoisin Aderung. Hängeblätter gegen Ende schwärzlichkarmoisin, stark geädert, im Grunde orangegeb.

Comte de Nanteuil.

Dom gelb, Hängeblätter braunrot geädert.

Iris (Fortsetzung):**× Comte de Saint-Clair.**

Dom weiss, mit leicht blauem Schein, Hängeblätter rötlichviolett, weiss umsäumt.

Contraste.

Dom Lichtblau mit leicht lila Anflug. Hängeblätter purpurblau, am Grunde in weisslich übergehend.

De Bless.

Dom zartlila, Hängeblätter bläulichweiss, dunkellila geädert, gegen Ende dunkellila schattiert mit schmalem, hellem Rand.

× Dr. Chouvenet.

Ganze Blume rötlichlila, Hängeblätter etwas dunkler als der Dom.

× Duc de Brabant.

Dom leuchtend purpurblau, Hängeblätter samtig, schwärzlichpurpurblau mit weissem, violett geädertem Grund.

× Duc d'York.

Dom zart rötlichlila, Hängeblätter samtig purpurviolett bis zur Hälfte vom Ende aus gelb gerandet.

Eckesachs pro Stück M. — 75

Blass lavendelblau mit purpurviolett.

× Edmond.

Dom zartlila weisslich, Hängeblätter samtig violettblau, weiss umrandet.

Elaine.

Aus der neglecta-Klasse.

Eldorado pro Stück M. — 75

Dom gelblich kupfrigbronze, braun geädert Grund, Hängeblätter hauptsächlich weiss, am Grunde gelb und mit besonders am Rande tiefpurpurlauer Aderung und Schattierung.

Ernest.

Dom aussen düster gelb, innen gelblichweiss, hellviolett getönt und sattviolett geädert. Hängeblätter hauptsächlich weiss, am Grunde gelb und mit besonders am Rande tiefpurpurlauer Aderung und Schattierung.

Florence.

Dom zartblau, an der Basis bräunlich geädert. Hängeblätter violett geädert auf weisslichem Grunde.

× Florentine.

Dom reinweiss mit grünlichem Kamm, Hängeblätter weiss mit gelber Mitte.

× Fury Queen.

Dom lilablau, Hängeblätter am Lappen in Dunkellila übergehend, weissgerandet mit lila Aderung.

Gajus pro Stück M. — 75

Dom reingelb, Hängeblätter stark dunkelpurpur geädert, weissgrundig, zartgelb umrandet.

× Gédéon.

Dom kupfrig bronzirt, Hängeblätter samtig purpur, strohgelb genetzt am Rande.

General Washington.

Dom zart porzellanblau mit dunklerer Aderung am Grunde. Fallblätter am Grunde weiss, am Lappen lebhaft samtig blau mit purpurlauer Aderung und Flammung.

Homer.

Dom dunkellavendelblau, gewellt, Hängeblätter am Grunde braun geädert.

× Hortense.

Dom hellschwefelgelb, mit dunklerem Grunde, Hängeblätter weisslichgelb, am Grunde bräunlich geädert.

Iris (Fortsetzung):**Hugh Block.**

Dom düster cattleyenfarbig, chromgelb mit goldigem, bräunlich geadertem Grunde. Hängeblätter weisslich bis hellbläulich.

Ignacite.

Weissgrundig mit braunroter Aderung.

Iris-König pro Stück — 75

Dom im Grunde zitronengelb, nach oben kupfrig getönt. Hängeblätter braunrot, gelb bordiert, samtig dunkelbraune, lila getönte Mitte.

Jaquiniana.

Karmin, bronze und braun.

× Jordaens.

Lilarot mit weisslicher Aderung.

Judith.

Dom nankinggelb, Hängeblätter dunkel-samtigrot mit hellerer Aderung.

Jules César.

Dom zartgelb, blass, Hängeblätter samtig braunrot.

Kharput (asiatica) . . . pro Stück M. — 75

Dom rötlich dunkelblau, Hängeblätter samtig glänzend schwärzlich purpurblau.

× Kochii (atropurpurea).

Dom leuchtend tiefhimmelblau, Hängeblätter leuchtend satt purpurblau.

La Marmora.

Dom dunkelzitronengelb mit Kupfer getönt, Hängeblätter samtig rotbraun, gelb geädert.

Lelieur.

Dom zart rötlichhimmelblau, Hängeblätter leuchtend hellpurpurblau, am Grunde weiss mit purpurner Aderung.

Liabaud.

Dom tiefgoldgelb, gewellt, mit rötlich-brauner Grundzeichnung, Hängeblätter goldgelb mit rotbrauner Aderung und scharlach-roter Flammung am Lappen.

L'Innocence pro Stück M. — 75

Dom niedrig, rahmweiss, seidenartig, Hängeblätter absteehend, von gleicher Farbe.

Lohengrin.

Kräftiges, auffallend breites Laub, ganze Blume rosa getönt, sehr grossblumig.

Louis Corbie.

Dom breit offen und Hängeblätter zartblau, dunkler geädert.

L. W. Clery.

Dom schwefelgelb mit kanariengelbem Rand, Hängeblätter samtig lila.

Madame Chéreau.

Ganze Blume milchweiss, azurblau bordiert, porzellanblauer Rand.

Madame Jenneau.

Dom himmelblau geflammt und geädert auf weissem Grunde, Hängeblätter weiss mit purpurblauer Aderung.

Madame Normann.

Dom hellgelb, Hängeblätter weisslich gelb mit schwach lila Aderung.

Madame Rivers.

Dom blasslila, verwaschen, bronziert gefleckt, Hängeblätter purpurrot geädert.

Madame Sonntag.

Dom mattblau mit rosa Anflug, Hängeblätter samtig violett, weiss genetzt.

major.

Dom leuchtend ultramarinblau, Hängeblätter samtig dunkelpurpurblau mit weissem, purpur geadertem Grunde.

Iris (Fortsetzung):**Maori King pro Stück M. — 75**

Dom dunkelgoldgelb, sonst dunkel-schwarzbraun mit gelbem Rande.

Maria Theresia.

Dom isabellenfarbig gelb, Hängeblätter amarantpurpur, gelb genetzt.

Meissonier.

Dom kupfrig bronziert, Hängeblätter rötlichlila, am Grunde bräunlich geädert.

Memnon.

Dom kupfrig bronziert, Hängeblätter rötlich, weiss geädert.

Minerve.

Dom cattleyenfarbig, violett bronziert, Hängeblätter purpurviolett mit weisser Aderung.

Minnie.

Dom rahmweiss, Hängeblätter weiss mit dunkelvioletter Aderung.

Minos.

Dom goldgelb, Hängeblätter weiss, stark braunrot geädert.

Mithras.

Dom dunkelgelb, kupfrig geflammt, Hängeblätter samtig purpur braunrot, gelb-randig, lila geädert.

Mlle. Nilsson.

Dunkelgelb mit Braun.

Mrs. Alan Gray . . . pro Stück M. — 75

Helllila mit rosa Anflug.

Mrs. Horace Darwin.

Dom reinweiss, Hängeblätter reinweiss mit violetter Aderung.

× Munico.

Purpurlila, hell und dunkel.

× neglecta.

Dom lilabläulich, Hängeblätter am Lappen in Dunkellila übergehend, weissgrundig mit dunkelblauer Aderung.

Nelly.

Dom seidig bläulichlila, Hängeblätter weiss, leuchtend dunkelblau geädert und geflammt.

odoratissima pro Stück — 75

Prächtig, grossblumig lichtblau.

Orphée.

Dom lebhaft goldgelb, Hängeblätter gelblich, braunrot geädert.

pallida speciosa.

Dom violaziert rot, Hängeblätter purpurn.

Panrace.

Dom goldgelb, Hängeblätter gelb, rötlichlila und weiss genetzt.

Pfaeuenaue pro Stück M. — 75

Dom kupfrig grünlichgelb, Hängeblätter mit lila verwaschener Mittentönung.

Pharaon.

Dom lilablau, Hängeblätter dunkler getönt, in der Mitte weiss.

Phidias.

Dom kupfrig bronziert, im Grunde auffallend schmal, dunklere Aderung auf lebhaftem Gelb. Hängeblätter am Ende samtig mit gelblicher Aderung, schwärzlichkarmin im Grunde.

Pluton.

Violett bronziert, bläulich lila.

× Poiteau.

Dom rosalia, gelblichgrün durchleuchtet, Hängeblätter verwaschen lila, im Grunde gelblich mit lebhaft braunroter Aderung.

Iris (Fortsetzung):

- Präsident Lincoln.**
Dom kupfrig braun, Hängeblätter dunkel-
purpurbraun, Rand heller.
- Präsident Thiers.**
Dom hellblau, Hängeblätter dunkelblau
mit lila Schein, im Grunde weisslich.
- Prinzess Victoria Luise**
pro Stück M. —.75
Zur variegata-Klasse gehörend.
- Prosper Langier.** pro Stück M. —.75
Dom seidig schokoladefarbig mit goldiger
Tönung, Hängeblätter schwärzlich blutrot
mit gelbem, rotbraun geadertem Grund.
- × **Purple King.**
Dunkelpurpurrot, frühblühend.
- Raphaël.**
Dom grünlichgelb, Hängeblätter schwärz-
lich purpurn, weiss geadert, gelb gerandet.
- × **Rebecca.**
Dom dottergelb, Hängeblätter samtig
karmoisin, am Rande gelblich getönt.
- Rheinnixe.** pro Stück M. —.75
Dom reinweiss, Hängeblätter blauviolett,
zart weiss bordiert.
- Riese von Cönnern** pro Stück M. —.75
Dom und Hängeblätter hellblau.
- Rollandiae.**
Dom hellpurpur, Hängeblätter mattweiss
mit rötlichlila Aderung.
- Sambucina major.**
Dom einfarbig lila, dunkel geadert,
Hängeblätter samtig purpurviolett.
- Samson.**
Dom goldgelb, Hängeblätter braunrot
geadert und gefleckt.

Iris (Fortsetzung):

- Sappho.**
Dom azurblau, Hängeblätter samtig purpur,
weiss genetzt.
- Schotel.**
Dom matt braunrot, Hängeblätter dunkel-
samtig violett auf Mattgelb.
- spectabilis.**
Samtig purpurn, im Grunde schwärzlich
braun schattiert.
- Sultane.**
Nankinggelb, karmoisinrot, weiss ge-
netzt.
- Sylvie.**
Dom zartlila geadert, Hängeblätter auf
weissem Grunde weitläufig bläulich genetzt.
- Teresita.**
Dom zartlila, Hängeblätter samtig purpur-
violett, weiss genetzt.
- Topaze.**
Dom blassblau mit rosalila Hauch,
Hängeblätter dunkler getönt.
- variegata major.**
Dom dunkeloliv, gelblich getönt, Hänge-
blätter samtig braunrot bronziert, weisslich-
gelb geadert.
- Venus.**
Dom grünlichgelb, blassoliv Schein,
Hängeblätter dunkel samtig purpurbraun.
- Victor Lemoine.**
Dom zartblau, gewellt, Hängeblätter
weiss mit dunkelvioletter Aderung.
- Virgile.**
Dom rötlich bronziert, Hängeblätter
samtig braunrot, strohgelb genetzt.
- × **Walter Scott.**
Dom isabellengelb, bronze Reflex, Hänge-
blätter rötlichlila, am Rande isabellenfarben.

Iris

- hexagona**
Dunkelblau.
- » **Lamancei (I. foliosa)**
Hellblau
- interregna Brunette**
Elfenbeinweiss mit gelbem, rotbraun geadertem Grund.
- » **Canari**
Dom schwefelgelb, im Grunde kanariengelb, Hängeblätter leicht
rosa durchscheinend, sonst schwefelgelb, fast einfarbig.
- » **Charmant**
Hellavendelblau mit samtig Veilchenblau.
- » **Empress**
Dom zart gelblichweiss, Hängeblätter von gleicher Färbung.
- » **Etta**
Dom lebhaft schwefelgelb mit kanariengelbem Grunde und brauner
Aderung, Hängeblätter in gleicher Färbung.
- » **Gerda**
Dom hellschwefelgelb mit dunklerem Grunde, Hängeblätter
ebenso, im Grunde kanariengelb durchleuchtet, bräunlichviolett
geadert.
- » **Helge**
Lichtzitronengelb mit Perlmutterfarben.
- » **Prince Victor**
Dom hellpurpurblau, Hängeblätter dunkler.
- notha**
Belaubung schmal dunkelgrün, Blütschäfte mehrblütig. Blüte
ähnlich der I. hispanica, zart himmelblau mit ebensolcher Aderung
auf weisslichem Grunde. Höhe 75—100 cm. Juni—Juli.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—75	—	—
—75	—	—
—40	—	—
—75	—	—
—40	—	—
—40	—	—
—40	—	—
—75	—	—
—75	—	—
—50	4.50	—

Iris (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
olbiensis Malinois	— 30	2.50	—
Dom bläselila mit zart braunorange Aderung Hängeblätter lebhafter lila gefärbt, im Grunde gelblich mit hellbrauner Aderung, Höhe 60 cm.			
» Menelik	— 30	—	—
Dom grünlichgelb, Hängeblätter rötlich getönt. Nur etwa 25 cm hoch. Mai.			
» Murillo	— 30	—	—
orientalis	— 35	3.—	25.—
Buschiger Wuchs, Blüten gross, gelb mit weiss. Höhe 1 m. Juni—Juli.			
» Snow Queen (I. orientalis alba)	— 35	3.—	25.—
Prac'tvolle, reichblühende Iris mit besonders grossen, rein- weissen Blüten. Höhe etwa 60 cm. Juni—Juli.			
pumila hybrida cyanea	— 35	3.—	25.—
Prächtige, dunkelviolette Einfassungsorte von grosser Reich- blütigkeit. Höhe 15—20 cm. Mai.			
» hybrida florila	— 35	3.—	—
Dom gelb, leicht kupfrig geflammt, Hängeblätter oliv getönt.			
» hybrida formosa	— 35	3.—	—
Dunkelveilchenblau, höher als I. pumila hybrida cyanea.			
serbica	— 35	—	—
Grünlichschwefelgelb, nur 15—20 cm hoch.			
sibirica atropurpurea	— 35	3.—	—
Blüten ziemlich klein, dunkelpurpur. Infolge grosser Blüh- willigkeit äusserst dankbare Klasse, prächtige Büsche, blüht frei über dem linealen Laub. Höhe 60—80 cm. Mai—Juni.			
» coerulea	— 35	3.—	—
Blüten hellblau, sonst wie vorige.			
species Kaukasus (I. caudata)	— 30	—	—
Blüte dunkelblau, Laub zieht sehr früh ein.			
squalens	— 30	2.50	—
Dom offen, bläselilahlila, Hängeblätter lebhaft dunkellila, dunkler geädert, am Grunde gelblich mit brauner Aderung. Narben- blätchen schwefelgelb mit leicht lila Rücken und Spitzen. Höhe etwa 70 cm. Juni.			
transsylvanica	— 30	2.50	—
Starkwachsend, gelb. Höhe 1 m. Juli.			
Wilsoni	— 35	3.—	—
Kleine gelbe Blüte mit brauner Aderung, ähnlich I. sibirica in der Form.			

Iris Kaempferi

zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grösse ihrer Blumen aus. Lieben sonnigen Standort mit recht feuchtem Boden, daher besonders verwendbar an Teichrändern, von hervorragender Wirkung. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni—Juli.

Hybriden ohne Namen in folgenden Farben:

1 = 1 Stück M. — 70; 10 Stück M. 6.—; 100 Stück M. 50.—.

- | | |
|---|--|
| 1. Reinweiss, hoch und mittelhoch. | 7. Durchgehend leicht tieferfarben geädert. |
| 2. Bläulichviolett mit gelbem Fleck in weisser Mitte,
gross. | 8. Violett, grossblumig. |
| 3. Weisslich mit helllila Rand. | 9. Rötlich schieferfarben, hoch. |
| 4. Rote Töne, hoch und mittelhoch. | 10. Purpurviolett mit lebhaftem, gelbem Fleck. |
| 5. Durchgehend lila geädert. | 11. Rötlich, grossblumig, niedrig. |
| 6. Rötlichviolett mit lebhaftem Fleck. | 12. Weiss, niedrig. |
| | 13. Samtig purpurrot. |

Japanische Namensorten:

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Asa-gasumi	1.—	—
Hochwachsend. Blüte gross. 6petalig, zart bläulichlila mit himmel- blauer Schattierung, Grundfleck tiefgelb.		
Bandai-no-nami	1.—	—
Sehr grosse 6—9 petalige Blüte mit leicht fallenden Petalen auf hohem Schaft. Leuchtend bläulichpurpur mit weisser Aderung und gelbem Grundfleck.		

Iris (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Gekka-no-nami Sehr grosse Blüte mit 6 flachgestellten Petalen von reinweisser Färbung und gelbem Grundfleck.	1.—	9.—
Hoboki Ähnlich „Komochi-guma“, höher und heller in Blüte mit sehr lebhaft gelbem Fleck.	1.—	9.—
Kimi-no-Megumi Blüte gross, auf mässig hohem Schaft, mit 3 flach ausgebreiteten Petalen. Helllila bis weiss abtönend mit dunkelfarbiger Aderung, Grundfleck gelb.	1.—	—
Komochi-guma Blüte 6 petalig, mittelgross, auf niedrigem bis mittelhohem Schaft mit ausgebreiteten Petalen von dunkler, tiefpurpurner Färbung mit gelbem Mittelfleck.	1.—	9.—
Taiheiraku Blüte gross, auf mässig hohem Schaft, mit 3–6 flach ausgebreiteten Petalen. Färbung rötlichviolett mit weisser Aderung und Mitte der Petalen, mit gelbem Grundfleck.	1.—	9.—
Ushinoiro Mittelhoher Wuchs, Blüte gross, mit 6 vollen, wagerecht stehenden Petalen. Die hellblaue Grundfärbung der Petalen ist dunkelblau geadert. Am Grunde der Petalen eine gelbe Zeichnung.	1.—	—
Yomo-no-umi Grosse Blüte mit 3 fallenden Petalen. Auf fast weissem Grunde hell- bis dunkellila schattiert. In der Mitte 3 kleinere, rosa geränderte Petalen. Feine Blüte. Hochwachsend. 20 cm Durchmesser.	1.—	9.—
Yourishimo Gefüllt, dunkelblauviolett, im Zentrum gelb.	1.—	—

Kaempferi-Hybriden.

hybridus Andrassi Dunkelviolett.	—90	8.—
hybridus Franz Hals Sehr edle Blume, breitzpetalig, leicht rosafila geflammt, sehr feine, fast weisse Grundfarbe.	1.—	9.—
hybridus Heinrich Witte Prächtig reinweisse, runde Blume. 6 Petalen, davon 3 weniger breit, 3 besonders schön breit mit leicht gelber Mittelrippe.	—90	8.—
hybridus Humberti Dunkelblau.	—90	—
hybridus La Nuit Gross, rund, dunkelblau mit dunkelpurpur Schein, mittlere Petalen büschelig aufrechtstehend.	1.—	9.—
hybridus lilacina Schön lila mit rotem Anflug, dunkler geadert, mit deutlichem, gelbem Mittelstrich auf jeder Petale.	—90	8.—
hybridus Montblanc Weiss, stark gespreizte, schmale Blumenblätter mit schwachgelber Mitte.	—90	8.—
hybridus Rembrandt Rötlichlila mit weiss gesprenkelt und geflammt, breitzpetalig, runde Blume.	1.—	9.—

Iris Kaempferi in Sorten meiner Wahl, mit Namen 100 Stück M. 80.—.

Kniphofia, siehe Tritoma.**Lathyrus**, Platterbse, Wicke. Papilionaceen.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
latifolius Blüten in 8–15 blütigen, die Blätter überragenden Büscheln, karminrot, geruchlos, bis 3 m hoch rankend. Blütenstände gut gestielt, Juni–Juli.	—40	3.50	30.—
» albus Weissblühende Form der vorigen.	—40	—	—
» Pink Beauty In Farbe ähnlich L. latifolius, jedoch intensiver und Blüten bedeutend grösser.	—40	3.50	—
» roseus Rosablühende Abart von L. latifolius.	—40	3.50	—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lathyrus (Fortsetzung):			
<i>latifolius</i> Weisse Perle	—75	—	—
Besonders grossblumig, reinweiss.			
<i>luteus</i> , <i>vernus</i> usw., siehe <i>Orobis</i> .			
Lavandula , Lavendel. Labiaten.			
<i>vera</i>	—50	4.50	40.—
Immergrüner, stark aromatischer Halbstrauch, Blüten blau, quirlig in lockeren Ähren.			
Leontopodium , Edelweiss. Kompositen.			
<i>alpinum</i> (<i>Gnaphalium Leontopodium</i>)	—40	3.50	30.—
Echtes Alpenedelweiss. Höhe 15—25 cm. Juni—Juli. In un- gedüngtem Boden besonders schön weisse Blütensterne.			
<i>himalaicum</i>	—50	—	—
Ziemlich spätblühend, kleinblumig. Juli—August.			
<i>japonicum</i> (<i>Gnaphalium Sieboldianum</i>)	—50	—	—
Blütenstände viel lockerer strahlend und die Blätter oberseits glänzend dunkelgrün und nur unterseits silberweiss filzig.			
<i>sibiricum altaicum</i>	—40	3.50	—
Ähnlich <i>L. alpinum</i> , aber in allen Teilen üppiger, aber nicht so reinweiss. Auffallend grosse Blütensterne. Höhe etwa 20 cm. Juli.			
Leucanthemum (<i>Chrysanthemum</i>), Margerite. Kompositen.			
<i>maximum</i> <i>Etoile d'Anvers</i>	—40	3.50	30.—
Sehr grossblumig mit kleiner, gelber Scheibe. Langstielige, riesenblumige Prachtsorte. Blumen besonders fest und wider- standsfähig. Höhe etwa 75 cm. Juli.			
» <i>Etoile de Nivelles</i>	—40	3.50	30.—
Eine der reichblütigsten aller Sorten. Auffallend schöne Varietät mit sehr eleganten, reinweissen Blüten, die bis 10 cm Durchmesser halten, auf guten Stielen, sehr frühblühend. Juli.			
» <i>Hildegard von Grüter</i>	—40	3.50	30.—
Riesenblumig mit nur ganz kleiner, gelber Scheibe. Wegen Reichblütigkeit zu Gruppen und wegen der festen Stiele zu Schnitt besonders geeignet, etwa 70 cm hoch. Juli.			
» <i>hybridum Ophelia</i>	—40	3.50	30.—
Die edlen, grossen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Farbe im Erblühen zartschweifgelb, später rahmweiss ist. Die einzigste Sorte in dieser Farbe. Kräftig wach- send, bringen sie an reichverzweigten Stengeln langstielige Einzel- blüten in grosser Zahl hervor.			
» <i>Niobe</i>	—75	—	—
Besonders grossblumig, reinweiss, leicht gewellte Blumenblätter.			
<i>plenum</i>	—50	4.50	—
Gefüllt, kleinblumig, mehr an <i>Pyrethrum</i> erinnernd, reinweiss, etwa 50 cm hoch. Juni—Juli.			
<i>uliginosum</i> (<i>Pyrethrum uliginosum</i> , <i>Chrysanthemum serotinum</i>)	—35	3.—	25.—
Grosse, weisse, herbstblühende Margerite, wertvoll wegen der späten Blütezeit. August—Oktober, über 1 m hoch werdend.			
Leucojum , Amaryllidaceen.			
<i>vernum</i> , Märzbecher	—15	1.—	8.—
Blüten weiss mit grünen Spitzen, runder und kugliger als die bekannten Schneeglöckchen. Für Halbschatten.			
Liatris , Prachtscharte. Kompositen.			
<i>callilepis</i>	—50	4.50	—
Straff aufrechte, leuchtend purpurrosa Blütenkerzen. Höhe 60 bis 80 cm. Juli—August.			
<i>spicata</i>	—50	4.50	—
Nur 30—50 cm hoch, violettpurpur, ähnlich <i>L. callilepis</i> . Juli— September.			
Lilium , Lilie. Liliaceen.			
<i>auratum</i> , Goldbandlilie	2.—	18.—	—
Prachtvolle, riesenblumige, weisse, japanische Lilie mit schoko- ladefarbenen, karminroten oder violettpurpurnen Flecken. Blume 18 25 cm breit und 10—12 cm lang mit prächtig gelben Strahlen- bändern. Höhe bis 1,5 m. August.			
<i>bulbiferum</i>	1.—	9.—	80.—
Trägt in den Blattachsen kleine Brutzwiebel; becherförmige Blüten von schöner Farbe.			

Lilium (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Burbanki	— 80	7.—	—
Trägt auf schlanken, bis 1 m hohen Trieben 2—6 Blüten. Färbung in der Mitte rein goldgelb, nach den Spitzen zu mehr oder weniger scharlachrot verwaschen.			
candidum	— 50	4.50	—
Überall bekannte, weisse oder Madonnenlilie. Höhe etwa 100 cm. Juni—Juli.			
carolinianum , siehe <i>L. Michauxianum</i> .			
colchicum	— 80	—	—
Mitteltgrosse, gelbe, schwarzpunktierte Blüten, 1—1,30 m hoch. Mai—Juni. Sehr hart, auch für Treiberei, wohlriechend.			
Hansoni	1.20	10.—	90.—
Schöne, frühblühende, zur Martagon-Gruppe gehörende, mitteltgrosse, tiefgoldgelbe Lilie. Trägt eine Unmasse von Blüten, oftmals schwarzgefleckt. Eigenartig vornehme, porzellanartig feste Blüten von starkem Duft. Höhe etwa 1,50 m. Belaubung wirtelig. Anfang Juni.			
Henryi	1.—	9.—	80.—
Prächtige Art, in Tracht zwischen <i>L. tigrinum</i> und <i>L. speciosum</i> stehend. Blütenstände bis 30blütig, glänzend orangerot mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken und warzigen Auswüchsen. Triebe sehr stark, schwärzlich und dichtbelaubt. Höhe bis 2 m. August.			
longiflorum giganteum	1.20	10.—	—
Eine japanische, stark duftende Lilie. Blüten wagerecht abstehend, trompetenförmig, bis 15 cm lang und ebensoweit geöffnet. Petalenspitzen hübsch rückwärts gebogen. Färbung reinweiss. Höhe 70 cm. Anfang August.			
» multiflorum	1.20	10.—	—
Ähnlich der vorigen, jedoch vielblumiger und früher.			
Marhan	2.—	—	—
Hybride zwischen <i>L. Martagon</i> u. <i>L. Hansoni</i> . Straffe, aufrechte Stämme, vielblumig, Grundfarbe hellorange, fast ganz braunrot getuscht. Höhe bis 1,50 m. Juli.			
» G. F. Wilson	2.—	—	—
Blumen hellzitronengelb, Spitzen der Blütenblätter karmin schattiert und purpurn gefleckt. Höhe 100—120 cm. Juli.			
Michauxianum (<i>L. carolinianum</i>)	— 70	6.—	50.—
Blumen aufrechtstehend, flach geöffnet, etwa 6—8 cm Durchmesser von leuchtend orangescharlachroter Färbung. Höhe etwa 40—60 cm. Juli.			
Pardalinum	— 70	6.—	50.—
Leopard-Lilie aus der Martagon-Klasse. Blüht in allen Schattierungen zwischen gelb und rot, gold und scharlach, orangegelb mit roten Flecken. Höhe etwa 60—80 cm. Juli—August. Für feuchte Stellen.			
» californicum	— 70	6.—	—
Blumen tief orange, kastanienbraun gefleckt. Spitzen der Petalen intensiv scharlach gefärbt. Höhe bis 1 m.			
» Johnsoni	— 70	6.—	50.—
Sehr schön lebhaft orange gefärbte und kräftig gefleckte Blumen.			
» Red Giant	1.—	9.—	—
Leuchtend scharlachorange Blüten, von besonderer Grösse.			
philipinense formosanum	1.50	12.—	—
Sehr schöne, weissblühende Lilie, aussen leicht rosa getönt. Laub zierlich. August. 1 m hoch.			
speciosum album	1.20	10.—	90.—
Grosse und schöne Blume, reinweiss, aussen dunkelrot.			
» Melpomene	1.—	9.—	80.—
Dunkelkarmesin mit Weiss, stark gefleckt und weiss umrandet.			
» rubrum	1.20	10.—	90.—
Prachtvolle grosse Blumen, rot, nach der Spitze zu blässer werdend, schwarzrot gefleckt.			
superbum	— 70	6.—	50.—
Amerikanische Türkenbundlilie der Martagon-Klasse. Schöne Varietät, Blumen zahlreich, lang gestielt, zurückgerollt, orange, braunrot gefleckt. Höhe 150—200 cm. Juli—August.			

Lilium (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Thunbergianum bicolor	— .60	5.—	—
Niedrig bleibend. Grundfarbe gelb, Spitzen der Petalen orange- rot geflammt.			
» brevifolium	— .60	5.—	—
Ähnlich L. Thunbergianum, jedoch stärker gefleckt.			
tigrinum, Tigerlilie	— .30	2.—	15.—
Leuchtend orangefarben mit purpurnen Flecken. Grosse Blüte mit zurückgeschlagenen Blumenblättern. Sehr reichblühend. Höhe 100—150 cm. Juli—August.			
» Fortunei	— .30	2.—	15.—
Höchste, starkwüchsigste Form der Tigerlilie.			
» plenum	— .40	3.—	20.—
Gefüllt blühende Tigerlilie. Ganz prächtig mit 3 Lagen Blumen- blättern. Farbe mit feinem Lachsschimmer, nicht so rot wie die übrigen L. tigrinum-Sorten. Höhe 80—100 cm. Juli—August.			
» splendens	— .30	2.—	15.—
Trägt grossblumigere und ornamentalere Blüten als die Art. Farbe dunkelorange mit schwarzen Flecken, besonders leuchtend.			
umbellatum incomparabile	1.—	9.—	—
Eine der frühesten und leuchtendsten Lilien, blutrot auf orange- farbenen Grunde, bis 14 cm Durchmesser, in der unteren Hälfte der Petalen goldgelber Fleck mit einigen, schwarzen Strichen geziert.			
» Sappho	1.—	—	—
Hellorange, Spitzen und Petalen bis zur Hälfte rot verwaschen.			
Wallacei	— .70	—	—
Hübsch- und reichblühende Art. Blüten flach ausgebreitet, 15 cm Durchmesser, tief orange lachsfarbig, rosig-aprikosenfarbig getönt, schwarzbraun gefleckt. August. Etwa 50 cm hoch.			
Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceen.			
Cymbalaria mit Topfballen	— .25	2.—	15.—
Blüten hellviolett mit gelb, Juni—August.			
pallida, Mauerflachs mit Topfballen	— .25	2.—	15.—
Kleines, 5 cm hohes, kriechendes Pflänzchen mit rundlichen Blättern und bleich-blauvioletten, duftenden Blüten, liebt reichlich Sonne und armen Boden. Mai bis Frost.			
Lindelia. Boraginaceen.			
spectabilis (Cynoglossum longiflorum)	— .40	3.50	—
Aufrecht, rauhbülgig mit hübschen, vergissmichnichtähnlichen, grossen, saphirblauen Blüten in nickenden Wickeltrauben. Schutz gegen Nässe! Höhe 50 cm, Juni.			
Lithospermum, Steinsame. Boraginaceen.			
prostratum (L. fruticosum) mit Topfballen	— .40	3.50	30.—
aus dem Freiland	— .35	3.—	25.—
Reizende, kleine Felsenpflanze. Blüten achselständig, purpur- violett, äusserst lebhaft und dankbar blühend. Höhe bis 10 cm. Mai—Juni.			
Lupinus, Lupine. Papilionaceen.			
polyphyllus	— .35	—	—
Blaublühende, grosse, dichte Blütentrauben auf kräftigem Schaft. Sehr anspruchslos und wirkungsvolle Staude. Höhe bis 100 cm. Juni—Juli.			
» albus	— .35	3.—	28.—
Schön reinweiss blühend.			
» Moerheimi	— .40	3.50	—
Schönste aller Staudenlupinen, zartrosa mit dunkelkarminrosa Anflug. Höhe etwa 60 cm. Mai bis Hochsommer.			
» Ruby King	— .40	3.50	30.—
Dunkelste der Staudenlupinen, sehr wirkungsvoll, stumpf karmin- purpur.			
Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceen.			
chalcidonica, Brennende Liebe	— .30	2.50	20.—
Blüten in Köpfen, leuchtend scharlachrot, wertvolle Farbe. Höhe 50—100 cm. Juli.			
» alba	— .30	2.50	—
Weisse Form der vorigen, Blütenstiel und Kelch weiss wollhaarig. Höhe 75—100 cm, Juli.			

Lychnis (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
dioica	—30	2.50	20.—
Blüten in rundlichen Köpfchendolden zusammenstehend, schön hellkarminpurpurn, stark klebrige Stengel, Höhe bis 100 cm. Mai bis August.			
Haageana (<i>L. fulgens</i> × <i>L. coronata</i>).....	—30	2.50	20.—
Blüten zu 2 oder 3, leuchtend zinnoberrot (auch lachsrosa und weissliche Töne). Meidet Feuchtigkeit! Höhe 30—50 cm, Juni—Juli.			
viscaria splendens plena	—35	3.—	25.—
Bekannte, gefüllte Pechnelke, Stengel stark klebrig, Blütenstände rispentraubig, purpurn. Höhe etwa 40 cm. Mai—Juni.			
Lysimachia , Felberich, Weidenkraut. Primulaceen.			
brachystachys	—50	—	—
Etwas rauhaarig, Blätter lineallänglich, Blütenstände erst nickend, ährig, weiss.			
clethroides	—30	2.50	—
Wurzelstock kriechend, Triebe in 25—30 cm langen Ähren endend, weiss. Höhe 80—100 cm. Juli—August.			
Lythrum , Weiderich. Lythraceen.			
alatum	—40	3.50	—
Belaubung hellgrün. Die wirtelig angeordneten Blüten stehen in schlanker, aufrechter Ähre von herrlich leuchtend satter Karminfärbung. Sehr dankbar blühende Staude. Höhe 100—150 cm. Juli bis August.			
Malva , Althaea rosea , Stockrosen.....	—40	—	—
Hybriden in den Farben karmesin, scharlach und schwefelgelb. Sehr beliebte Rabattenstaude. Höhe bis 2 m. August.			
Megasea (<i>Bergenia</i> , <i>Saxifraga</i>), Riesen-Steinbrech. Saxifragaceen.			
cordifolia , B.	—40	3.50	—
Breite, herzförmige, gewellte Blätter. Blüte hellrosenrot in Dolden. Höhe bis 50 cm. April—Mai.			
speciosa , B.	—50	4.50	—
Blüht rosa noch in den Wintermonaten Februar—März. Wintergrün.			
Stracheyi , B.	—40	3.50	—
Blüht sehr früh, weiss mit zart fleischfarbig, vor dem Laub. Belaubung frischgrün. Höhe etwa 30 cm. März—April.			
Mentha , Pfefferminze. Labiaten.			
rotundifolia variegata	—30	2.50	—
Mit gelblichweissbunten Blättern, unterseits rauhfilzig mit hellen Blüten in dünnen Ähren. Laub stark aromatisch. Höhe 30 cm. Juli—August in Blüte.			
Menziesia (<i>Dabeocia</i>), siehe Laubbölzer.			
Mertensia . Boraginaceen.			
echioides	—40	3.50	30.—
Kleines, etwa 15 cm hohes Pflänzchen mit hellgrüner Belaubung und zahlreichen, dunkelultramarinblauen Blütenähren im Mai. Dunkelste Sorte.			
paniculata	—50	—	—
Habsche Staude, eine Menge hängender Blütentrauben tragend von zart hellblauer Farbe, herrliche, röhrenförmige Blüten. Höhe 40 cm. Mai—Juni.			
sibirica (<i>M. ciliata</i>).....	—50	—	—
Blüten zart hellblau, nickend. Mit zierlichen Rispen. Etwa 50 cm. Mai—Herbst.			
Meum , Bärwurz. Umbelliferen.			
athamanticum	—40	—	—
Tiefgrüne, fast haarfein zerteilte Blätter, weisse Blüten dolden.			
Mimulus , Gauklerblume. Scrophulariaceen.			
luteus	—30	2.50	20.—
Blüten gelb mit dunkler Schlundzeichnung. Höhe etwa 30—40 cm. Juni.			
luteus × cupreus	—30	2.50	20.—
Sehr schöne, orangefarbene Hybride.			

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Monarda , Bienenbalsam, Etagenblume. Labiaten.			
<i>didyma</i> , Rotmäulchen	—30	2.50	20.—
Hochrote, ziemlich lange Lippenblüten in endständigen, quirligen Köpfchen. Höhe 50—80 cm. Juli.			
» <i>alba</i>	—40	—	—
Weissblühende Form der vorigen.			
» Cambridge Scarlet	—30	2.50	20.—
Scharlachrote Gartenform.			
» <i>salmonea</i>	—30	2.50	20.—
Lachsfarbene Gartenform von grosser Reichblütigkeit.			
» <i>violacea superba</i>	—30	2.50	20.—
Dunkelkarminrote Gartenform, im Wuchs höher als die übrigen, im Farbton dunkler als <i>M. didyma salmonea</i> und besonders schön durch die herrlich satt weinrot gefärbten Blätter unterhalb der Blütenstände.			
Morina . Dipsaceen.			
<i>elegans</i> (<i>M. longifolia</i>) Karden-Distel	—50	—	—
Harte, interessante, ornamentale Staude mit fiederbuchtigen Blättern, die gleich dem Kelch stachelig gezähnt sind und anfangs weisslichen, später rosenroten Blüten mit alpenveilchenartigem Duft in aufrechten Blütenständen. Höhe 40—60 cm. Juni—August.			
Mulgedium . Kompositen.			
<i>alpinum</i> , Milchlattich	—30	2.50	—
Mit kurzästigem, nicht kriechendem Wurzelstock, leierförmig-fiederteiligen Blättern und blauen Blütenköpfchen in Rispentrauben, Höhe über 1 m. Juli—August.			
<i>Bourgaei</i> (<i>Lactuca Bourgaei</i>)	—30	2.50	—
Entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen, zartblauen Blumen im Juli, August.			
<i>giganteum</i>	—30	2.50	—
Über 2 m hoch werdend, Blumen violettblau. Juli—August.			
Muscari , siehe Hyacinthus.			
Myosotis , Vergissmeinnicht. Boraginaceen.			
<i>palustris</i> Graf Waldersee	—25	2.—	15.—
Frühlühend, dunkelblau.			
» <i>Perle von Ronneberg</i>	—25	2.—	18.—
Mit besonders schönen, dunkelhimmelblauen Blüten.			
» <i>semperflorens Nixenaugae</i>	—25	2.—	15.—
Lebhaft himmelblau.			
Nepeta . Labiaten.			
<i>macrantha</i> , (<i>Dracocephalum sibiricum</i>), B.	—30	2.50	—
Blätter oval, beiderseits grün, Blüten zartblau. Höhe über 1 m Juni—Juli.			
<i>Mussini</i>	—40	—	—
Laub silbergrau, ausgebreitet aufsteigend, Blüten kleiner als bei <i>N. macrantha</i> , himmelblau. Höhe 25 cm. Mai—Juli.			
Oenothera , Nachtkerze. Onagraceen.			
<i>Fraseri</i> , B.	—30	2.50	20.—
Bedeutend flachere Blüten bei hellerem Laub als <i>Oe. glabra</i> , sehr reichblühend. Höhe etwa 60 cm. Juli.			
<i>glabra</i> , B.	—30	2.50	20.—
Goldgelbe, trichterige Blüten in dunklem Laub ergeben einen feinen Kontrast. Höhe etwa 40 cm. Ab Mitte Juni.			
<i>missouriensis</i> (<i>Oe. macrocarpa</i>)	—40	—	—
Wuchs kriechend, Blätter derb, jung weisslichgrau behaart, Blüten sehr gross, schwefelgelb. Höhe 30 cm. Juli—September.			
<i>speciosa</i>	—40	—	—
Kleinblumige Sorte. 40 cm hoch.			
Omphalodes . Boraginaceen.			
<i>verna</i> , Frühlings-Vergissmeinnicht, B.	—25	2.—	15.—
Kleines, blaues Blümchen, auch wohl an Ehrenpreis erinnernd. Höhe bis 15 cm. April—Mai.			
» <i>alba</i> , B.	—30	2.50	20.—
Weissblühende Abart der vorigen.			

Ononis, Papilionaceen.

- hircina**, Hauhechel.
Aufrechte, drüsig-behaarte Stengel, dreizählige Blätter und rosa
Blüten in beblätterten Trauben gegen Ende der Zweige. Höhe
60—80 cm. Ende Juni—Juli.

Opuntia, Freiland-Feigen-Kaktus. Kakteen.

- | | pro
Stück
M. Pf. | pro 10
Stück
M. Pf. | pro 100
Stück
M. Pf. |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| comanchica | —80 | 7.50 | 70.— |
| Starkwüchsige Sorte mit grossen, runden, stark bestachelten Gliedern, Blüte hellgelb. Juli. | | | |
| albispina | —80 | 7.50 | — |
| Weisstachelige Form der vorigen, eine der festesten Sorten, reichblühend, hellgelb, später in bräunlichen Ton übergehend. | | | |
| gigantea | 1.— | — | — |
| Mit besonders grossen Blättern und Blüten. | | | |
| lutea carneo-staminea | —80 | — | — |
| Blüten grünlichgelb in Rehfarben übergehend, Staubfäden fleischfarben. Glieder gross. | | | |
| major | 1.— | — | — |
| Grosse Glieder mit schöner Bestachelung, Blüte hellgelb mit hellbräunlicher Mitte und fleischfarbenen Staubfäden. | | | |
| pallida | —80 | 7.50 | — |
| Blüten ganz weisslich gelb mit grünlichem Schein. | | | |
| rubra | —80 | 7.50 | — |
| Glieder gross und dünn, oval, weitläufig bestachelt. Blumen ca. 6 cm breit, tief schalenförmig, dunkelbräunlich-zinnover, nach dem Rande zu und auf der Innenseite in Karmin übergehend. Innenseite der Blüte lackglänzend. Staubfäden gelb in Hellrot übergehend. | | | |
| fragilis caespitosa | 1.— | — | — |
| Die sehr dicht stehenden, walzenförmigen, hellgrünen Glieder sind noch kleiner als die von <i>Op. fragilis</i> . Blumen 6 cm breit, hellgelb mit lebhaft rotbrauner Mitte und karminfarbenen Staubfäden. | | | |
| mesacantha Greeni | 1.— | — | — |
| Mittelstachelig. | | | |
| macrorrhiza | 1.— | — | — |
| Starkwurzelig, Blüten gelb. | | | |
| pachyclada Spaethiana | 1.— | — | — |
| Der reiche Flor bietet mit seinen im Aufbrechen sattgelben, dann in einen wunderschön bräunlich lachsfarbenen Ton übergehenden Blüten ein reizendes Farbenspiel. | | | |
| Rafinesquei | 1.— | — | — |
| Saftiggrüne Glieder, ziemlich gross, fast ohne Stacheln. Blüht im Hochsommer auf den Rändern der Blätter, die breit verkehrt-eiförmige Gestalt haben. Die etwa 7 cm breite Blüte ist hübsch schalenförmig, schwefelgelb mit leicht gebräunter Mitte und hat gelbe Staubfäden. | | | |
| cymochila | 1.— | — | — |
| Glieder bis 14 cm lang, breit, verkehrt-eiförmig, dünn, hell- bis graugrün. Blumen 8—9 cm breit, hellgelb mit grünlichem Schein. | | | |
| xanthostemma rosea | 1.25 | — | — |
| Blüten karminrosa, in bemerkenswerter Fülle. Glieder mittelgross, lang, dick. | | | |

Jungpflanzen mit Topfballen in den Sorten: O. comanchica, com. rubra und spirocentra 100 St. M. 50.—

Ornithogalum, Milchstern. Liliaceen.

- | | | | |
|---|-----|-----|------|
| umbellatum , Stern von Bethlehem | —25 | 2.— | 15.— |
| Blütenstände doldig, weiss mit schönen, grünen Rückenstreifen. Blüht von 11 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags. Höhe 10—30 cm. April—Mai. | | | |

Orobis, Walderbse, Waldwicke. Papilionaceen.

- | | | | |
|---|-----|-----|---|
| aurantiacus | —35 | 3.— | — |
| Höhe etwa 30 cm, Blüte im Mai, kupfrig orangegelbe Blütentrauben. | | | |
| formosus, B. | —35 | 3.— | — |
| Schöner Frühlingsblüher, Ende Mai. Höhe bis 50 cm. | | | |

Orobis (Fortsetzung):

lathyroides, B.

Blüten klein, reichblühend, sehr schön tiefdunkelblau. Höhe 40 cm. Juni.

luteus

Hellgrünes Laub und schwefelgelbe Blütentrauben. Juni.

vernus, B.

Blätter 2—4 paarig, Blütenstände gerade, 4—6 blütig, Blüten leuchtend karminrot, später bläulich. Schöne Frühlingspflanze. Höhe 30 cm. Mai.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
— 35	3.—	25.—
— 35	3.—	—
— 35	3.—	25.—

Paeonia, Pfingstrose, Gichtrose. Ranunculaceen.

albiflora = sinensis.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

10 Stück in 10 älteren Sorten M. 7.—	10 Stück in 10 besseren Sorten M. 9.—
100 » » 10 » » 60.—	100 » » 10 » » 80.—

Nach Wahl des Bestellers

pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 12.—, 100 Stück M. 100.—

Amabilis speciosa.

Lebhaft violettrosa, ballförmig.

Audomarensis.

Gross, leuchtend karminrot mit silbrigem Reflex

Auguste Mieliez.

Hellila mit purpur, sehr gross, stark gefüllt.

Baronne James de Rothschild.

Dunkel- bis hellrosa, ballförmig, dichtgefüllt.

Caroline Allain.

Lilarosa, Zentrum lachsrosa, buschig.

Comte de Neipperg.

Lebhaft karminamarant, Wuchs gedrunken.

Diaphane.

Durchscheinend rosa, ballförmig, gut gefüllt.

Dr. Cords.

Dunkelviolettsa, sehr gross, stark gefüllt

Dr. Jussieux.

Dunkelrosa, gross, ballförmig.

Dr. Nestor Pallasy.

Satiniert purpuramarant, hoch, ballförmig.

Duchesse de Nemours.

Ballförmig, dichtgefüllt, reinweiss, Mitte leicht grünlich.

Duguesclin.

Lebhaft karminrosa, buschig, reichblühend.

Duke of Wellington.

Rahmweiss, gross, ballförmig gefüllt, Mitte gelblich elfenbeinweiss.

Festiva.

Mattrosa, fleischfarben getönt, gedrunken wachsend, ballförmig dichtgefüllt.

Festiva maxima.

Reinweiss, karmin geflammt, sehr gross.

Fragrans.

Rosa, innen gelblich.

General Bertrand.

Violettsa, Zentrum lachsfarbig, hochwachsend.

Georges Cuvier.

Lebhaft rosa, straff aufrecht, ballförmig.

Humei carnea.

Zart fleischfarben, Zentrum heller.

L'élégante.

Reichblühend, lebhaft rosa, Mitte heller.

Madame de Montigny.

Tiefpurpurkarmin, kompakt wachsend.

Madame Lemoitier.

Hellsilbrigrosa, ballförmig, gross.

Monsieur Duchartre.

Lebhaft violettrosa mit Purpur und Lachs.

Mr. de Chavigné.

Hellviolettsa mit weissem Rand. Busch gedrunken.

officinalis Browni.

Einfach rot, mit gelben Staubfäden, reichblühend.

Omer Pascha.

Dunkelpurpur, sehr gross, halbgefüllt, Stiele straff.

Prince Charles d'Aremberg.

Brillant dunkelviolet, gross, locker gefüllt.

Pulcherrima modesta.

Leuchtend karminrot, buschig, früh.

Purpurea major.

Hellpurpur, gross, dichtgefüllt.

Purpurea superba.

Dunkelpurpurviolett, gross, locker gefüllt.

Rosea delecta pulchra.

Sattrosa, mittलगross, ballförmig, früh.

Rosea elegans.

Zartrosa und lachsfarben, ballförmig gefüllt, gross.

Rubens.

Grosser, hoher Ball, schön rosa mit lachs Tönung.

Rubicunda marginata.

Mittलगross, rosa, Füllung fleischfarbig.

Soeur Melanie.

Dunkelpurpur, spätblühend.

Thorbecki.

Zart rahmfarben, grosse, ballförmige Blüten.

Victoire tricolore.

Dunkelrot, gross, locker gefüllt, Wuchs gedrunken.

Victor Paquet.

Dunkelpurpur, gross, dichtgefüllt, feste Stiele.

Paeonia (Fortsetzung):**Japanische Sorten,**

die sich durch prächtige Färbungen auszeichnen und als Vasenschmuck und zu Bindezwecken äusserst reizvoll sind.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

10 Stück in 10 älteren Sorten M. 8.—, 10 Stück in 10 besseren Sorten M. 10.—

Nach Wahl des Bestellers

pro Stück M. 2.—, pro 10 Stück M. 18.—.

Sämlingspflanzen ohne Namen pro Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.—.

Benisanghai.

Rot mit hellerer Mitte, 3 Lagen Petalen.

Chiokagami.

Dichtgefüllt, elfenbeinweiss mit feinen Karminstreifen, Zentrum leuchtend hellgelb.

Fuji-no-mine.

Sehr gross, gefüllt, schneeweiss, Staubgefässe gelb

Gekkiuden.

Mittelgross, locker, reinweiss.

Ginko-nishiki.

Weiss, purpurn gestreift, mittelgross, halbgefüllt.

Hakuseiko.

Weiss, ballförmig, stark gefüllt, gross.

Hana-no-sata.

Sehr gross, ballförmig, violett, Mitte rahmweisse, bandartige Staubgefässe.

Hatsutori.

Lilarosa mit weiss, halbgefüllt.

Hinodeseikai.

Gross, karmin in rosa übergehend, Zentrum breit, rosig mit gelb.

Hogioku.

Weiss, Mitte gelb, gross, niedrig buschig.

Hyakka-to.

Purpurrosa, Staubgefässe gelb, schmal bandförmig.

Ikimidama.

Schneeweiss, gelbe Mitte, stark gefüllt.

Izayoi.

Schalenförmige Blüte, reinweiss, rot gestreift.

Kabata.

Gross, fast gefüllt, dunkelnelkenfarbig, Spitzen heller.

Kama-no-kegoromo.

Gross, halbgefüllt, purpurkarmin.

Karafune.

Blüte gross, aussen weiss bis zartrosa, innen rahmweiss.

Kasane-jishi.

Weiss, lachsrosa schattiert, leicht gekraust.

Kunimori.

Gross, halbgefüllt, dunkelkarmin.

Makitateyama.

Gross, locker, hellkarmin, breite, hellbraune Staubgefässe.

Meigetsuko.

Blass lilarot, breite, gelblichhellbraune Staubfäden.

Mine-no-momiji.

Einfach, weiss, mit vielen, gelben Staubfäden.

Mine-no-yuki.

Mittelgross, aussen weiss bis zartrosa, innen hellgelb.

Nishiki-gawa.

Mittelgross, mattweiss mit braun gestreift.

Nureginu.

Gross, Grund weiss mit breiten, rosa Streifen.

Ohirama.

Gross, locker, dunkelrosa mit weissen Spitzen.

Reikai-zan.

Mattrosa, Mitte Goldfäden, sehr gross.

Riugegno.

Enorm gross, locker, purpurliila, spät.

Riuhasen.

Sehr gross, matt rosaweiss, Rand heller

Seioba.

Gross, fast einfach, dunkelrosa, Mitte purpurfarbig.

Seirin-nishiki.

Stark gefüllt, rahmweiss.

Shiraginu.

Gross, halbgefüllt, rahmweiss, spät.

Shishi-asobi.

Gross, lilarosa, Staubblätter sehr kraus.

Shishi-odori.

Weiss, Mitte gelblich, gut gefüllt.

Someganoko.

Einfach, sehr gross, karmin, Staubgefässe sehr breit, dunkelpurpur mit rosa und gelb

Tamabotan.

Mittelgross, rahmweiss, dichtgefüllt, schwach rotgestreift.

Tatsugashira.

Stark gefüllt, weiss mit rosa Streifen.

Yayera.

Weiss und gelb mit Rot gestreift, stark geschlitzt.

Zansetsu.

Blüte sehr gross, einfach, reinweiss, spät.

Paeonia.**anomala**

Blüten einzeln, einfach, ziemlich klein, rosalila, reichblühend. Höhe 50 cm. Mai—Juni.

»

alba

Weissblühende Abart.

lutea

Baumpäonie mit einfachen, kleinen, sattgelben Blüten.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—.60	5.—	—
—.60	5.—	—
8.—	—	—

Paeonia (Fortsetzung):**Veitchi**

Bildet einen dichten, runden Busch. Laub zierlich zerteilt, blaugrün. Blüten einfach, purpurnkarminrot zu mehreren an einem Stengel, nickend, interessant. Höhe etwa 50 cm. Mai—Juni.

Papaver, Mohn. Papaveraceen.

nudicaule, sibirischer oder Island-Mohn. Freilandpflanzen mit Topfballen

Ähnlich *P. alpinum*, jedoch höher, Blätter nicht so fein geschlitzt, Blüten mit festen, drahtartigen Stielen, bei der Stammart gelb, bis 30 cm hoch. Ende April bis Herbst. In den Farben Gelb, Weiss und Orange.

orientale Brightness, B.
Leuchtend orangescharlach, Laub stark silberflaumig, später als die meisten roten Sorten blühend.

» **Goliath, B.**
Auffallend leuchtend scharlachrot mit kleinen, schwarzen Punkten am Grunde der Petalen, etwas dunkler als *P. or. grandiflorum*.

» **grandiflorum, B.**
Sehr grossblumig, scharlachrot.

» **Mrs. Perry, B.**
Lachsrosa, grossblumig, etwas dunkler im Ton als *P. or. Prinzess Viktoria Luise*.

» **Perry's White, B.**
Weissblühend mit lebhaft wirkenden, schwarzen Punkten. Im Verblühen silberrosa.

» **Prinzess Victoria Luise, B.**
Wundervoll zart lachsrosa, sehr haltbar.

» **Royal Scarlet, B.**
Sehr wirkungsvolle, reichblühende und riesengrosse Sorte von prächtig scharlachroter Farbe mit grossen, breiten, schwarzen Punkten im Grunde der Blumen.

» **Würtembergia, B.**
Sehr grossblumig, karmoisinblutrot, mit schwarzen Flecken, sehr wirkungsvoll.

Pentstemon, Bartfaden, Fünffaden. Scrophulariaceen.

arizonicus
Blätter schmal, tiefgrün, Blüten mittelgross, hellpurpurn. Höhe bis 30 cm.

glaucus
Blaugraugrüne Belaubung, Blüten rispig, lila oder violett purpurn. Höhe bis 30 cm. Juli—August.

Phlomis, Filzkraut. Labiaten.

Samia, B.
Blüten quirlartig, gelb. Höhe 80 cm. Juni.

tuberosa, B.
Blüten lebhaft karminrot, quirlartig, an meterhohen, straffen, spärlich belaubten Trieben. Juni.

Phlox, Flammenblume. Polemoniaceen.

amoena
Rasenbildend, Laub frischgrün, Blütenstände dichtdoldig, leuchtend karminrot, dunkler als *Ph. setacea*.

Arendsi
Arends'sche Züchtungen, Kreuzungen zwischen *Ph. divaricata*-Formen × *Ph. decussata*-, *paniculata*- und *sufruticosa*-Formen.

Hanna
Leuchtend purpurrosa, etwas dunkler als *Ph. pilosa*.

Hilda
Blüten weiss, zuweilen ganz zartlila Schein und leuchtendrosa Auge. 30—40 cm hoch. Frühblühend.

Lisbeth
Aus den lila Knospen entwickeln sich gut geformte Blumen, weiss mit zartlila Schein. Reich verzweigt, lange blühend.

Phlox (Fortsetzung):

canadensis, siehe Ph. divaricata.

decussata, beliebte, herrliche Sommerblüher.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
10 Stück in 10 besten Sorten	M. 3.—		
100 „ „ 10 guten „	„ 20.—		
100 „ „ 20 „ „	„ 25.—		
Alphonse Diepenbroeck	—35	3.—	—
Grossblumig, zartrosa, dunklere Mitte.			
Argon	—35	—	—
Musselinrosa und fleischfarben.			
Arthur Ranc	—30	—	—
Grossblumig, zartrosa.			
Australien	—35	3.—	25.—
Grosse Dolden und Einzelblumen, niedriger Wuchs, daher auch genannt „Niedrige Hochberg“, in Farbe wie diese.			
Baron van Dedem	—35	3.—	25.—
Grossblumig, scharlachblutrot, kräftige Dolde.			
Coeur de Lion	—35	3.—	25.—
Rosapurpur, Auge karmoisin.			
Coquelicot	—35	3.—	25.—
Feurig, orangemohnrot, lebhaft.			
Direktor Dr. Vogl	—35	3.—	25.—
Fast rein dunkelblau, wertvoll.			
Embracement	—35	3.—	25.—
Lachsfarbig kupfern mit purpurner Mitte.			
Episode	—30	2.50	—
Weinrosa, Mitte karmin.			
Eugène Danzanvilliers	—30	2.50	20.—
Mattlila mit weisser Mitte.			
Europa	—35	3.—	25.—
Sehr grosse Dolden und Einzelblumen, schneeweiss mit silber- weiss, rotgerandetem Schlund, oder weiss mit karminrotem Auge. Hervorragender Gruppenphlox.			
Feuerbrand	—40	3.50	30.—
Leuchtend orangescharlach, Mitte etwas dunkler.			
Frau Anton Buchner	—35	3.—	25.—
Grossdoldig, reinweiss.			
Fräulein G. v. Lassberg	—40	3.50	—
Grossblumig, dichte Dolden, reinweiss.			
Frithjof	—35	3.—	25.—
Tief lilarsa, wuchtige Dolden.			
Frühlicht	—40	3.50	—
Frühblühend, grosse, dichte Sträusse lichtrosafarbiger Blüten.			
Gruppenkönigin	—35	3.—	25.—
Riesige Dolde, zartlila-fleischfarbigrosa mit scharfem, karmin- purpur Auge.			
Hindenburg	—40	3.50	30.—
Feurig karmoisinrot mit dunklem Auge, leuchtendste Farbe. Prächtig.			
Imperator	—40	3.50	30.—
Leuchtend dunkelkarminrot mit noch dunklerem Auge, spät. Dunkles Laub, schwärzliche Stiele.			
Iris	—30	2.50	20.—
Bläulichviolett mit blauer Mitte.			
Kapitän König	—50	4.—	—
Lachsrosa mit blutroter Mitte, grossblumig und grossdoldig.			
Le Mahdi	—50	4.—	35.—
Tiefdunkelblau, sehr wirkungsvoll.			
Loki	—35	3.—	25.—
Rein lachsrosa mit dunkelkarminrotem Auge.			
Major von Sprosser	—75	7.—	—
Leuchtend rein karminamarant.			

Phlox (Fortsetzung):**decussata**

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Nana coerulea	—30	2.50	20.—
Schön violettblaublühend, reichblühend.			

Nordlicht	—40	3.50	30.—
Karminrosa Gruppensorte.			

Reichsgraf von Hochberg	—50	4.—	35.—
Leuchtend tiefamarantrot.			

Rijnstrom (Rheinstrom)	—35	3.—	25.—
Blüte gross, dunkelrosa.			

Selma	—30	2.50	—
Lachsrosa mit kirschrotem Auge, grossdoldig.			

Septemberglut	—40	3.50	30.—
Lachskarminrot von grosser Leuchtkraft.			

Thor	—40	3.50	30.—
Blendend lachsrot mit blutroter Mitte.			

U-Deutschland	—40	3.50	30.—
Leuchtend scharlachorange, grossblumig.			

Wala	—50	4.—	35.—
Blendend schneeweiss, helles Laub.			

Wanadis	—40	3.50	—
Schön lilablau mit karminvioletttem Auge.			

William Ramsay	—40	3.50	30.—
Einfarbig, leuchtend dunkelpurpur.			

Württembergia	—40	3.50	30.—
Frisch karminrosa, grosse Doldie, herrliche Gruppensorte.			

decussata robusta Andenken an Wilhelm Pfitzer	—40	3.50	30.—
Leuchtend karminrosa, dicke, pyramidale Doldie mit sehr starkem Knospenansatz, daher ungemein lange Blütezeit.			

divaricata (Ph. canadensis)	—35	3.—	25.—
Im Mai blühender, niedriger Phlox, etwa 20 cm hoch, von dunkelvioletter Farbe.			

maculata hybrida Alpha	—40	3.50	—
Lange Rispen, leuchtend rosa mit dunklerer Mitte. Frühblühend.			

» hybrida Schneelawine	—40	3.50	30.—
Blendend weisse Rispen.			

pilosa (Ph. aristata)	—35	3.—	25.—
Gegenstück zu Ph. divaricata. Höhe 30—40 cm, Blätter schmal, behaart, Doldenrispen leuchtend rosa. Juni.			

» Brillant	—40	3.50	30.—
Leuchtend dunkelkarminrosa. Höhe 25 cm. Mai.			

setacea (Ph. frondosa)	—30	2.50	20.—
Prächtige Blütenpolster im Mai mit leuchtend karminrosa, ziemlich runden Blumen.			

» atropurpurea	—40	3.50	30.—
Dunkelste der Polster-Phloxe, tiefdunkelrosa, sternartig geschlitzt und gespreizte Blüten.			

» Moerheimi	—40	3.50	30.—
Leuchtend karminrosa, herrlich sternartige Blüthen, schönste und zierlichste aller Ph. setacea-Sorten.			

» nivalis	—40	3.50	30.—
Schneeweiss blühend.			

» Schneewittchen	—40	3.50	—
Polsterbildend, kaum 15 mm im Durchmesser haltende Blüthen, schneeweiss, Höhe 10 cm. April—Mai. Steingarten, Trockenmauern.			

stellaria	—35	3.—	25.—
Grossblumig, blass zartblau. Höhe 20 cm. Mai.			

suffruticosa Gryp	—40	3.50	—
Weiss mit rosa Auge.			

» Magnificense	—40	3.50	30.—
Purpurkarmin gefärbte Blütenrispen			

Physostegia, Drachenkopfbiume, Etagen-Erika. Labiaten.

imbricata	—30	2.50	20.—
------------------------	-----	------	------

Physostegia (Fortsetzung):

virginica (*Dracocephalum virginianum*).....
Falscher Drachenkopf mit hellrosalila Lippenblüten in aufrechten,
dichtblütigen, langen, endständigen Ähren. Höhe etwa 1 m. Juli
bis August.

» **alba**
Weissblühende Form der vorigen.

» **rosea**
Rosablühende Form.

Phyteuma, Rapunzel, Teufelskralle, Triftwurz. Campanulaceen.

Scheuchzeri
Bis 50 cm hoch, Blütenstände kugelig, himmelblau, für den
Felsengarten.

Pirola, Birnkrout, Wintergrün. Pirolaceen.

rotundifolia
Blüten an Maiglöckchen erinnernd, weiss mit grünlich gezeich-
netem Rücken, an etwa 20 cm hohen Stengeln im Mai bis Juni, für
Halbschatten.

Platycodon, Ballonblume (*Wahlenbergia*). Campanulaceen.

Mariesi albus
Weissblühende Form der folgenden.

» **majus**
Aufrechte, buschige, bis 50 cm hohe, etwas blaugrüne Pflanzen
mit schönen, tiefblauen, 5–8 cm breiten Glockenblumen in reicher
Fülle. Knospe ballonartig. Juli–August. Auch für Vasenschmuck.

species aus Korea
Sehr schön, niederliegend, lebhaft blau, kleinblättrig. Juli bis
August.

Polemonium, Sperrkraut. Polemoniaceen.

Richardsonii, B.
Blüten gross, leuchtend himmelblau, reichblühend, oft von Mai
bis August. Höhe etwa 50 cm.

» **album, B.**
Weissblühende Form der vorigen.

Polygonatum, siehe Convallaria.**Polygonum**, Knöterich. Polygonaceen.

alpinum
Blütenrispen weiss. Höhe etwa 75 cm. Mai–Juni, nicht
wuchernd.

Bistorta, Otternzunge, Wiesenknöterich
Blütenähren rötlichweiss. Höhe bis 1 m. Mai–Juni, nach Rück-
schnitt oft zweite Blüte August–September.

cilinode
Blüten unscheinbar, weisslich, treibt bis 4 m lange Ranken, für
Felsbekleidung.

vaccinifolium, Heidelbeer-Knöterich
Etwas halbstrauchig, Blüten leuchtend rosa, 10–20 cm hoch,
Herbstblüher.

Weyrichi
Erreicht bis 1 m Höhe. Rispen grünlichweiss. September.

Potentilla, Fingerkraut. Rosaceen.

alba
Dichte Polster, silberweiss behaarter Belaubung. Kriechend
reinweiss. Höhe etwa 15 cm. Mai.

atrosanguinea
Tief dunkelblutrot, einfach, hoch. Juli.

hybrida plena Arlequin
Scharlach mit goldgelb, leicht gefüllt. Juni.

» **plena M. Hawkins**
Feurig orange mit hellgelb, buschiger und etwas später als
„Arlequin“.

» **sulphurea plena**
Gelbgefüllt, spätblühend. Juli.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Physostegia (Fortsetzung):			
virginica (<i>Dracocephalum virginianum</i>)..... Falscher Drachenkopf mit hellrosalila Lippenblüten in aufrechten, dichtblütigen, langen, endständigen Ähren. Höhe etwa 1 m. Juli bis August.	—30	2.50	20.—
» alba Weissblühende Form der vorigen.	—30	2.50	20.—
» rosea Rosablühende Form.	—30	2.50	20.—
Phyteuma , Rapunzel, Teufelskralle, Triftwurz. Campanulaceen.			
Scheuchzeri Bis 50 cm hoch, Blütenstände kugelig, himmelblau, für den Felsengarten.	—50	—	—
Pirola , Birnkrout, Wintergrün. Pirolaceen.			
rotundifolia Blüten an Maiglöckchen erinnernd, weiss mit grünlich gezeich- netem Rücken, an etwa 20 cm hohen Stengeln im Mai bis Juni, für Halbschatten.	1.50	—	—
Platycodon , Ballonblume (<i>Wahlenbergia</i>). Campanulaceen.			
Mariesi albus Weissblühende Form der folgenden.	—40	3.50	—
» majus Aufrechte, buschige, bis 50 cm hohe, etwas blaugrüne Pflanzen mit schönen, tiefblauen, 5–8 cm breiten Glockenblumen in reicher Fülle. Knospe ballonartig. Juli–August. Auch für Vasenschmuck.	—40	3.50	—
species aus Korea Sehr schön, niederliegend, lebhaft blau, kleinblättrig. Juli bis August.	—40	3.50	30.—
Polemonium , Sperrkraut. Polemoniaceen.			
Richardsonii, B. Blüten gross, leuchtend himmelblau, reichblühend, oft von Mai bis August. Höhe etwa 50 cm.	—35	3.—	25.—
» album, B. Weissblühende Form der vorigen.	—40	3.50	30.—
Polygonatum , siehe Convallaria.			
Polygonum , Knöterich. Polygonaceen.			
alpinum Blütenrispen weiss. Höhe etwa 75 cm. Mai–Juni, nicht wuchernd.	—40	—	—
Bistorta , Otternzunge, Wiesenknöterich Blütenähren rötlichweiss. Höhe bis 1 m. Mai–Juni, nach Rück- schnitt oft zweite Blüte August–September.	—30	2.50	20.—
cilinode Blüten unscheinbar, weisslich, treibt bis 4 m lange Ranken, für Felsbekleidung.	—40	3.50	—
vaccinifolium , Heidelbeer-Knöterich Etwas halbstrauchig, Blüten leuchtend rosa, 10–20 cm hoch, Herbstblüher.	—60	5.—	—
Weyrichi Erreicht bis 1 m Höhe. Rispen grünlichweiss. September.	—50	—	—
Potentilla , Fingerkraut. Rosaceen.			
alba Dichte Polster, silberweiss behaarter Belaubung. Kriechend reinweiss. Höhe etwa 15 cm. Mai.	—35	3.—	25.—
atrosanguinea Tief dunkelblutrot, einfach, hoch. Juli.	—50	—	—
hybrida plena Arlequin Scharlach mit goldgelb, leicht gefüllt. Juni.	—35	3.—	25.—
» plena M. Hawkins Feurig orange mit hellgelb, buschiger und etwas später als „Arlequin“.	—35	3.—	—
» sulphurea plena Gelbgefüllt, spätblühend. Juli.	—40	3.50	—

Potentilla (Fortsetzung):

insignis	Rotblühend, einfach, silberblättrig, Höhe etwa 25 cm. Juni.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
nepalensis Willmottiae	Leuchtend weinrote Blüten, etwa 50 cm hoch werdend. Juni bis September.	— .40	3.50	—
		— .30	2.50	20.—

Poterium, siehe Sanguisorba.**Primula**, Primel, Himmelsschlüssel, Schlüsselblume. Primulaceen.

Auricula	Prachtvolle Mischung grossblumiger Spielarten. Höhe 10—20 cm. Mai—Juni.	— .25	2.—	18.—
Beesiana	Eigenartig samtig lilapurpur mit deutlich gelbem Auge. Höhe bis 40 cm. Juni—Juli.	— .35	3.—	25.—
Bullesiana (P. Balleyana × P. Beesiana)	Prächtige Hybriden mit überraschendem Farbenspiel in gelben und roten Tönen.	— .35	3.—	25.—
Bulleyana , echt	Herrliche bis 60 cm hohe Blütenstände mit 5—7 Quirldolden übereinander, prächtig leuchtend orangerot. Juni—Juli.	— .40	3.50	30.—
cashmeriana	Blätter unterseits gelb bestäubt, Blüten ähnlich Pr. denticulata, bis 30 cm hoch. April.	— .50	—	—
denticulata	Schöne, hellgrüne Blattrosette, Blätter stumpf-eilanzettlich, ge- zähnt, unbestäubt. Blüten in hell- oder dunklerlila Doldenköpfen von etwa 20 cm Höhe. April.	— .35	3.—	25.—
» alba	Weissblühende Form.	— .40	3.50	30.—
frondosa	Blätter unterseits bestäubt, Blüten schön rosa. Mai.	— .50	4.—	—
Helena	Sehr gute, wüchsige Primel mit tiefveilchenblauen, verhältnis- mässig grossen Blüten, acaulis-artig. Ganz prächtige Blütenkissen. Höhe bis 20 cm. April—Mai.	— .40	3.50	30.—
hybrida La Lorraine	Typ wie Primula cortusoides, Blütenstiele etwa 20 cm hoch, Blüten tiefkarminrot mit gelbem Auge. Mai.	— .50	4.—	35.—
» Ville de Nancy	Ähnlich Pr. hybr. La Lorraine, nur Blütenkrone zierlich gefranst. 25 cm hoch. Mai.	— .50	4.—	35.—
japonica	Blüten karminpurpur, weinrot, feurig. Höhe etwa 30—40 cm. Mai—Juli. Bei früher Blüte im Herbst zweite Blüte.	— .40	3.50	30.—
Juliae	Kriechend, Blättchen nierenförmig, langgestielt, Blüten satt- violett, Schlund gelb. Bildet dichte, sattgrüne Blattpolster, die im Frühjahr von einem reichen Flor der lebhaften Blüten bedeckt sind. Unvergleichlich schön im Alpinum. Höhe bis 10 cm.	— .35	3.—	25.—
luteola	Schwefelgelbe Art. Juli—August blühend.	— .35	3.—	25.—
pulverulenta	Blüten zart lachsfleischfarbig mit orange gelbem Stern und in- dischroter Röhre. Blütenschafte sowie Blütenstiel und Kelch sind dicht weisslich bepudert.	— .40	3.50	30.—
rosea grandiflora	Laub hellgrün, Blüten herrlich rosarot, für halbschattige, feuchte Plätze, Bachränder, in Massen an Teichen hervorragend wegen der leuchtenden Farbe. Höhe bis 20 cm. April—Mai.	— .30	2.50	20.—
Sieboldi amoena grandiflora		— .50	4.50	—
» Daphnis	Rosa mit weisser Mitte.	— .50	4.50	—
Silva-Taroucana (P. Cockburniana × P. pulverulenta)	Leuchtend orangeschlarlach, im Verblühen in sattes Karmin über- gehend. In allen Teilen besser als die beiden Eltern.	— .75	—	—
Veitchi	Der P. cortusoides sehr ähnlich, aber viel schöner und robuster wachsend. Blumen tiefrosa mit orange Band und Stern in wenig- blättriger Dolde. Höhe etwa 20 cm. Mai—Juni.	— .40	3.50	30.—

Primula (Fortsetzung):

veris elatior	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Bekannte, bunte Gartenprimel, sehr formen- und farbenreich in grossen, blütenreichen Dolden, zum Teil sehr wohlriechend. Höhe 20—30 cm. April—Mai.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	—25	2.—	15.—

Prunella, siehe Brunella.**Pulmonaria**, Lungenkraut. Boraginaceen.

angustifolia azurea, B.	—35	3.—	25.—
Blüten schön blau, gut zum Treiben. Höhe 15—30 cm. April.			
officinalis, B.	—35	3.—	25.—
Blasser in Blüte, sehr reichblühend. Höhe etwa 30 cm. April.			
rubra, B.	—35	3.—	25.—
In älteren Exemplaren unter Bäumen im zeitigen Frühjahr einen reichen Flor seiner roten Blüten entwickelnd.			
saccharata variegata, B.	—40	3.50	30.—
Das ganze Jahr hindurch zierend infolge der schön weissbunten Belaubung. Mit rotvioletten, glockigen Blüten im April—Mai.			

Pyrethrum, bunte Margeriten. Kompositen.**roseum hybridum**, in nachstehenden Sorten:

Aphrodite	—50	4.50	—
Gefüllt, reinweiss, strahlend, straff gestielt.			
Aurore boréale	—40	—	—
Gefüllt, pomponartig, hellgelblich weiss mit lebhafter, gelber Mitte. Etwa 50 cm hoch. Ende Mai.			
Blutfink	—45	4.—	35.—
Einfach, blutrot.			
Ceres	—40	—	—
Dichtgefüllt, beim Erblühen zart weisslich fleischfarbig, später weiss, Mitte schwach gelblich.			
Diana	—40	3.50	—
Dichtgefüllt, dunkelrosa bis hellkarminrot.			
Dr. Bosch	—60	5.50	50.—
Einfach, neuartig, leuchtend lachsrosa. Wertvolle Binfarbe, langstielig.			
Hamlet	—45	4.—	35.—
Einfach, bestbewährt, rein rosa, sehr früh, langstielig, grossblumig.			
James Kelway	—45	4.—	35.—
Einfach, samtig schwärzlichzinnober, kräftige Stiele, reichblühend.			
Madame Munier	—45	4.—	35.—
Halbgefüllt, silbrigrosa, äusserst starkwüchsig.			
Madeleine Le Clerq	—45	4.—	35.—
Gefüllt, grossblumig, langstielig, silbrigrosa, lockere Blume.			
Maienglut	—50	4.50	—
Dunkelrot, ähnlich P. James Kelway, Blume lockerer, strahliger und mehr karmin getönt.			
Montblanc	—50	4.50	40.—
Dichtgefüllt, reinweiss, eine der besten und schönsten weissen.			
Queen Mary	—50	4.50	—
Dichtgefüllt, zartrosa, edel, wüchsig, Mitte fast weiss.			
Reine des Blanches	—40	3.50	—
Einfach, weissblühend.			

Pyrethrum.

Tschihatschewi	—30	2.50	20.—
Rasenartige, grüne Polster mit kleinen, margeriteartigen Blüten von etwa 10 cm Höhe. Mai.			
uliginosum , siehe <i>Leucanthemum uliginosum</i> .			

Ramondia. Gesneriacee.

pyrenaica	1.—	—	—
Wertvolle, rosettenartige Felsenpflanze mit schönen, grossen, tief blauvioletten Blüten, Juni—Juli.			

Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuss. Ranunculaceen.

aconitifolius plenus	—75	—	—
Blüthen auf niedrigen, reichverzweigten Trieben, dichtgefüllt, reinweiss.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ranunculus (Fortsetzung):			
acris plenus , Goldknöpfchen Mit starkgefüllten, leuchtend gelben Blumen im Mai. Höhe bis 30 cm. Wuchert nur wenig.	—35	3.—	—
amplexicaulis Weissblühend, graugrünes, stengelumfassendes Laub. Höhe etwa 20 cm Mai.	—60	—	—
gramineus Sehr schön gelb blühend, an <i>Papaver nudicaule</i> erinnernd. Laub grasartig. Höhe 25 cm. Mai.	—50	4.50	—
repens plenus Dichtgefüllte Abart des kriechenden Hahnenfusses. Mai bis Juni. Höhe 30 cm.	—35	3.—	—
speciosus plenus Sehr grossblumige, goldgelbe Art, flache Blüte. Höhe 30—40 cm. Mai—Juni.	—35	3.—	25.—
Rheum , Rhabarber. Polygonaceen.			
australe (Rh. Emodi) Üppig, Blätter herzförmig, kupfrig überhaucht, Blütenrispen rot, aufrecht, bis 1,5 m hoch.	—50	—	—
Rodgersia , Schaublatt. Saxifragaceen.			
aesculifolia Blätter ähnlich denen der Rosskastanie, Blütenstände bis 1 m hoch, weisslichrosa. Juni—Juli.	1.—	—	—
pinnata alba Schöne Blattrosette. Höhe 40—50 cm, Blatt mit 5—7 länglich verkehrt eiförmigen Teilblättchen, Blüten weiss in aufrechten, pyramidalen, bis 80 cm hohen Ständen. Juni—Juli.	—80	7.—	60.—
podophylla Herrliche Dekorationsstaude mit bronzartig glänzenden grossen gefingerten Blättern und spiraceenartigen Blütenrispen im Mai—Juni. Erreicht ca. 75 cm Höhe.	—90	8.—	75.—
tabularis Blätter ähnlich <i>R. peltata</i> , hellgrün, borstig behaart, Blütenstände bis 1,5 m dichtbesetzt. Juli.	1.—	—	—
Rudbeckia , Sonnenhut. Kompositen.			
flava Sehr frühblühend, Juni, Höhe 50—70 cm, gelb mit schwarzer Mitte.	—40	3.50	—
laciniata plena Golden Glow (Goldball) Sehr wertvoll, bis 2 m hoch, dichtgefüllte, goldgelbe Blüten. Benötigt Stütze.	—35	3.—	25.—
occidentalis Wird bis 200 cm hoch, Blüten hellgelb, August—September. Eignet sich vorzüglich für feuchte, nasse Lagen.	—35	3.—	—
purpurea (<i>Echinacea purpurea</i>) Blüten purpurrosa mit brauner Mitte, Juli—August, bis 1 m hoch. Sehr grossblumig.	—50	4.—	35.—
speciosa (<i>R. Neumannii</i>) Sehr reichblühend, Blumen orangegelb mit schwarzer Mitte. Juli—Oktober, bis 50 cm hoch.	—35	3.—	25.—
Ruta , Raute. Rutaceen.			
graveolens Laub sehr fein zerteilt. Juli—August, gelbe Blütchen, Höhe etwa 50 cm.	1.—	—	—
Sagina subulata , siehe <i>Spergula pilifera</i> .			
Sanguisorba , Koelbel, Wiesenknopf. Rosaceen.			
obtusata (<i>Poterium obtusum</i>), B. Reichblühend, rosarot. Juni—Juli. Höhe etwa 1 m.	—50	4.—	35.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceen.			
<i>ocymoides</i> Niedrige Felsenpflanze, Blütenstände klebrig, Blüten lebhaft rosenrot. Mai—Juni.	—40	3.50	—
<i>officinalis plena</i> Rosafarbene Blüten, in büscheligen Blütenständen.	—40	3.50	—
Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceen.			
<i>aizoides crocea</i> mit Topfballen Zierlich gelb.	—40	3.50	—
<i>Andrewsi</i> Sehr zierlich hellgrün, schön gezähnt, zu Einfassungen schön geeignete Rosette. Blüte im Juli, weisslich.	—25	2.—	15.—
<i>aspera</i> Moosartig, grüner Rasen, Blüte im Mai. Höhe 10 cm.	—30	2.50	20.—
<i>controversa</i> Kleine Rosetten mit Perlenrand.	—30	2.50	20.—
<i>Cotyledon pyramidalis</i> Sehr robuste Rosetten, Ende Mai blühend, bis 50 cm hoch.	—50	4.50	—
<i>Elisabethae</i> (S. Burseriana × S. sancta) mit Topfballen Blüten einzeln, schwefelgelb.	—50	4.50	—
<i>granulata plena</i> mit Topfballen Sehr zierlich kleine, weisse, gefüllte Blüten ähnlich Levkojen. Nach der Blüte ziehen die Pflanzen ein, Knöllchen bildend, Mai, Höhe 15—25 cm, blüht etwas nach dem Hauptflor der Hybriden.	—40	3.50	30.—
<i>granulata</i> × <i>dicipiens</i> Sehr reichblühend, einfach weiss. Mai, 15—20 cm hoch.	—35	3.—	25.—
<i>Haworthi</i> Blüht sehr lange, weiss, Mai—Juni. Höhe 10—15 cm.	—30	2.50	20.—
Hybriden, Porzellanblümchen in nachstehenden Sorten:			
» <i>Juwel</i> Petalen oberseits purpurn. In Farbe ähnlich S. splendens, dafür aber 14 Tage später erblühend und somit eine willkommene Ver- längerung des roten Saxifraga-Flors. Dunkelste Sorte. Mai, 10 cm hoch.	—40	3.50	—
» <i>magnifica</i> Zart hellrosa, wohl die grossblumigste von allen, kräftig und robust wachsend, reichblühend, von frischer Farbe. Eine bedeutende Verbesserung der älteren Sorte S. Rhei superba. Mai, 15—20 cm hoch.	—35	3.—	25.—
» <i>Purpurmantel</i> Die mittelgrossen Blumen sind von einer ganz eigenartig schönen, karminrosa Färbung mit purpurnem Schein. In Farbe zwischen S. hybr. Juwel und S. hybr. magnifica, Mai, 10—15 cm hoch.	—35	3.—	25.—
» <i>rosea superba</i> Frisch karminrosa, grossblumig, dichte Polster bildend, mittel- hoch, sehr reichblühend, Mai, 20—30 cm hoch.	—35	3.—	25.—
» <i>Schöne von Ronsdorf</i> Die mittelgrossen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend dunkelkarmin und blühen von April bis Juni. Von vor- züglicher Fernwirkung, Höhe 15 cm.	—40	3.50	—
» <i>Teppichkönigin</i> Niedrigste Form, nur 5 cm hoch, lebhaft rosa, reichblühend. Die zierlichen Blumen werden gegen Ende etwas heller, herrliche Polsterbildner für Steinpartien.	—40	3.50	—
<i>umbrosa</i> Locker rasig, Blütenstände 10—20 cm hoch, Mai—Juni, überaus reichblühend. Für schattige Einfassungen.	—25	2.—	15.—
In Sorten meiner Wahl	—	—	20.—
Scabiosa, Skabiose, Grindkraut. Dipsaceen.			
<i>australis</i> Laub lanzettförmig, ganzrandig, Blüten fast kugelige Köpfchen von blassblauer Farbe, 40 cm. August.	—50	—	—
<i>caucasica alba perfecta</i> Blüten gross, weiss, Höhe 80 cm, Juni—September.	—40	3.50	—
Scutellaria, Helmkraut. Labiaten.			
<i>alpina</i> Blüten purpurn, niederliegend.	—40	—	—

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, B. Crassulaceen.			
Aizoon mit Topfballen	—25	2.—	18.—
Blätter nicht immergrün, Blüten gelborange. Juli.			
album mit Topfballen	—25	2.—	18.—
Blätter linealwälflich, wechaelständig, weiss, Höhe 10—20 cm. Juli.			
» micranthum chloroticum mit Topfballen	—25	—	—
» murale »	—25	2.—	—
anglicum	—20	1.80	15.—
» minus	—20	1.80	15.—
Sehr kleinblättrig.			
elongatum	—25	2.—	18.—
Blüht Juni, etwa 25 cm hoch.			
Fabarium Brillant	—50	4.50	—
ibericum mit Topfballen	—20	1.80	15.—
kamtschaticum »	—25	2.—	18.—
Gelb, Mitte Juni, 15 cm hoch.			
Lyidium	—20	1.80	15.—
Lebhaft grüne, rötlich überhauchte Rasen, 5—10 cm, Blüten rötlichweiss. Juni.			
populifolium	—40	3.50	—
Pappelähnliche, graugrüne Blätter, weisse Blüten, Freiland.			
reflexum mit Topfballen	—25	2.—	18.—
Juli, 25 cm hoch, lebhaft gelb.			
rhodanthum »	—25	2.—	18.—
Blaugrün, sehr schön.			
Rhodiola linifolium rubrum	—40	—	—
Scharlachrot.			
spathulatum purpureum	—30	2.50	20.—
spectabilis (purpurascens)	—25	2.—	18.—
spurium mit Topfballen	—20	1.80	15.—
Rosa.			
» atropurpureum »	—25	2.—	18.—
Rot.			
» splendens »	—20	1.80	15.—
Dunkelrosa.			
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl M. 2.—			
100 » » 10 » » » » 15.—			
Sempervivum, Hauslauch, Hauswurz. Crassulaceen.			
Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern in nachstehenden Sorten.			
alpinum	—20	1.50	10.—
arachnoideum	—20	1.50	12.—
Rosetten 2 cm breit, Blüten lebhaft rubinrosa, Rosetten zierlich silberweiss, spinnwebig überzogen.			
atropurpureum	—20	1.50	12.—
Brauni	—20	1.50	12.—
californicum	—20	1.50	12.—
Blaugrün, grosse Rosette, Blüten hellrot.			
fimbriatum	—20	1.50	—
Funkii	—20	1.50	—
Hübsche, halbkugelige, braunspitze Rosetten bildend. Blüten rosa mit purpurnem Streifen.			
glaucum	—20	1.50	—
Bis 8 cm breite, blaugrüne Rosetten, Blütenstände bis 25 cm hoch, heller oder dunkler rot.			
Requieni	—20	1.50	—
Gross, dunkelbraun.			
robustum, siehe S. tectorum.			
Schnittspahni	—20	1.50	10.—
tectorum	—20	1.50	10.—
Der gemeine Hauslauch, grasgrün, sehr gross und Blütenstände sehr hoch, bis 35 cm, rosenrot.			
triste	—20	1.50	10.—

Sempervivum (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Verloti	—20	1.50	—
violaceum	—20	1.50	—
Abart von <i>S. tectorum</i> mit blauvioletten Rosetten.			
Wulffeni	—20	1.50	12.—
Grosse Rosetten, Blütenstände bis 25 cm hoch, hellgelb mit purpurnem Auge.			
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl M.	1.50		
100 » » 10 » » » » » » 10.—			
Senecio , Kreuzkraut, Greiskraut. Kompositen.			
Clivorum, B.	—50	4.50	—
Grosse, runde Blätter und orangegelbe Blumen in doldenartigen Ständen. Juli—August.			
» Othello, B.	—60	—	—
Besonders schön grossblumig. August.			
» Orange Queen, B.	—60	5.50	—
Üppig, grossblumig, wohl beste Art.			
» subcrenatus, B.	—60	5.50	—
Sehr reichblühende, schöne Varietät von etwa 80 cm Höhe, in allen Teilen etwas kleiner als die Art. Blüte tiefgelb. Juli.			
Veitchianus	—60	5.50	—
Mit grossen, herzförmigen Blättern und meterlangen Blumenstengeln. Letztere tragen längs des oberen Teils glänzende gelbe Blumen von 8—10 cm Durchmesser, die Juli—August in Flor stehen.			
Wilsonianus	—60	5.50	—
Grosse, seerosenähnliche Blätter und feste, lange, bis 150 cm hohe Stiele, dicht mit schönen, goldgelben Blumen besetzt, die Juli bis August erblühen.			
Shortia , Winterblatt. Diapensiacee.			
uniflora grandiflora	2.50	20.—	—
Seltener, herrlicher Frühlingsblüher, aus Japan stammend, mit schönen, 3—4 cm im Durchmesser haltenden, weissrosa Blüten von sehr edlem Charakter. Winterschutz!			
Sidalcea , Doppelmalve. Malvacee.			
oregona Rosy Gem, B.	—30	2.50	20.—
Meterhohe, malvenartige Staude mit schön tiefrosa Blüten an reichbesetzten, meterhohen Blüthentrieben. Straff und kräftig wachsend.			
Silene , Leimkraut. Caryophyllaceen.			
acaulis exscapa	—35	3.—	25.—
Zierliche, feinblättrige Form, schöne Polster bildend, Blüte im Mai. Höhe 5 cm.			
alpestris	—30	2.50	20.—
Bis 15 cm hohe Polster bildend, mit sehr niedlichen, weissen Blütensternen bedeckt. Ende Mai.			
Asterias	—30	2.50	—
Blätter gebüschelt, lanzettlich, Blüten in 50 cm langen, gestielten, kugeligen Köpfchen, purpurrosa. Mai—Juni.			
maritima alba plena	—40	3.50	—
Schöne, weissgefüllte Blumen, vorzüglich zu Einfassungen, niederliegend. Triebe 30 cm lang. Mai.			
Schafta	—30	2.50	—
Lockerrasig, 10 cm hoch, Blüten leuchtend rosa. Juni—September.			
Sisyrinchium , Binsenlilie. Iridaceen.			
anceps (angustifolium)	—40	3.50	—
Blauviolett. Mai—Juni. 20 cm.			
striatum	—40	3.50	—
Irislaub, Blütenstände sehr lange blühend, schwefelgelb, auf der Rückseite der Petalen rosa gestreift. Juni—August. 50—75 cm hoch.			
Soldanella , Alpenglöckchen. Primulaceen.			
alpina	1.—	—	—
Im März leicht rosa Blüten, tief gefranst, Blätter ganzrandig. Höhe 10 cm.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Soldanella (Fortsetzung):			
montana	1.—	—	—
Schönste und grösste Art, Blätter deutlich gekerbt, höher als S. alpina. Mai—Juli.			
Solidago , Goldrute, Goldraute. Kompositen.			
aspera , rauhbblättrige Goldrute.....	—35	3.—	25.—
Graziös gebogene, gelbe Blütenrispen. 1 m und höher. August bis September.			
brachystachya , B.	—30	2.50	20.—
Nur 15—20 cm hoch, ist im Herbst mit goldgelben Blüten über- laden.			
elliptica , B.	—30	2.50	20.—
Etwa 30—40 cm hoch, blüht August—September sehr reich, gelb.			
hybrida „Frühgold“, B.	—35	3.—	25.—
Sehr schöne, frühblühende Gartenform.			
missouriensis , siehe <i>Aster luteus</i> .			
mollis , B.	—30	—	—
Grosse, gelbe Rispe.			
multiradiata , B.	—30	2.50	—
Niedrig, rasig, Blüten gelb, in dichten Trauben, auf 15—20 cm hohen Stengeln im Juli.			
recurvata variegata , B.	—30	2.50	—
Goldbunt.			
rigida , B.	—30	—	—
Shortii , B.	—30	2.50	20.—
Wuchs straff aufrecht, Rispen federig, lange, schmale Blätter, sehr wertvoll. September—Oktober.			
stricta , B.	—30	2.50	—
Spätblühend.			
virgaurea nana , B.	—35	3.—	25.—
Spergula , Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceen.			
pilifera (<i>Sagina subulata</i>), Sternmoos.....	—20	1.50	12.—
Ganz niedriges, frischgrünes, moosartiges Gewächs mit kleinen, weissen Blüthen. Ende Juli bis August.			
» aurea	—30	2.50	—
Goldgelbe Form der vorigen.			
Spiraea , Spierstaude. Siehe auch <i>Astilbe</i> . Rosaceen.			
Aruncus	—60	5.—	—
Weiss oder gelblichweiss blühend. Bis 1 m hoch. Juni—Juli.			
» Kneiffi	—80	—	—
Eine der schönsten Arten mit sehr fein geschlitzten Blättern, niedrig bleibend. Höhe 80 cm. Juni—Juli.			
filipendula	—40	3.50	—
Wurzelstock knollig, von farnartigem, elegantem Habitus. 80 cm hoch. Blüte gelblichweiss. Juni—Juli.			
» plena	—60	5.50	—
Herrliche Abart der vorigen mit ornamentalen Blattrosetten und nur etwa 40 cm hohen Blütenständen mit lebhaft elfenbeinweissen, gefüllten Blüthen dicht besetzt. Juni.			
Humboldtii	—30	2.50	—
Höhe 1 m. Grosse, lockere Blütenstände. Juni.			
kamtschatica	—25	2.—	—
Weiss, sehr stark wachsend, Juli.			
lobata	—35	3.—	25.—
Breite Blütenstände, rosa. Juli—August.			
» hybrida	—35	3.—	25.—
Nur 50 cm hoch, lebhaft rosa, sehr gut, Mitte Juli.			
palmata	—60	5.50	—
Prächtig dunkelkarminrot, etwa 70 cm hoch werdend. Juni—Juli.			
» elegans	—35	3.—	25.—
Blumen heller als die Art, leicht rosa. Höhe 80 cm. Juni—Juli.			
sylvestris kamtschatica	—60	—	—
Dichtere Rispe als <i>Sp. Aruncus</i> . Juni.			

Spiraea (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ulmaria discolor	—25	2.—	—
Höhe 80 cm. Ende Juni bis Juli.			
» plena	—35	3.—	25.—
Dichtgefüllte Blumen von blendend weisser Farbe, sehr wirkungsvoll. Höhe 1 m. Juni—Juli.			
venusta	—30	2.50	—
Karminrot blühend. Höhe 120 cm. Juli.			
» L'Innocence	—40	3.50	—
Leicht blassrosablühend. Höhe 1,50 m. Juli.			
» magnifica	—40	3.50	—
Höhe 1,50 m, etwas heller als Sp. venusta, Dolde aber viel grösser. Juli.			

Stachys, Ziest. Labiaten.

lanata	—25	2.—	18.—
Höhe 20—40 cm. Weiss-wollig-filzig, Blüten purpurn, zu Einfassungen.			

Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceen.

latifolia	—35	3.—	25.—
Blätter gross, eiliptisch, bis 60 cm hoch, Juni—September.			
serbica	—35	3.—	—
Für Felsenpflanzung.			
tatarica	—35	3.—	—
Höhe 30 cm. Blütenstände breit schirmartig, weiss oder rosa. Juli—August.			

Stenanthium, Liliaceen.

robustum	2.—	—	—
40—50 cm lange Blätter und bis 1,50 m hohe, prächtige, gelblich-weisse Blütenrispen. Juli—August. Sehr lange blühend.			

Stokesia, Kompositen.

cyanea	—35	3.—	25.—
Auf 40 cm hohen Stielen grosse, asternartige Strahlenblüten von prächtiger, hellblauer Färbung. Juli—Oktober.			
» alba	—35	3.—	25.—
Weissblühende Abart.			
» praecox purpurea	—40	3.50	—
Bereits Anfang Juli blühende, rote Abart.			

Symphytum, Beinwell, Wallwurz. Boraginaceen.

aspermum aureo-variegatum	—60	—	—
Blätter stechendborstig behaart, Blüten anfangs rötlich, dann blau mit weissem Rande, mit goldbunter Belaubung. Höhe etwa 1,20 m. Juni—August.			
grandiflorum	—40	3.50	—
Blüht im Mai. Höhe 30 cm, gelbweisse Blüten, Halbschatten.			

Synthisis (Wulfenia). Scrophulariaceen.

reniformis , B.	—35	3.—	—
Sehr frühblühende Staude, April, mit 15—30 cm hohen, vielblütigen, dichten, violetten Blütenähren.			

Telekia, Sonnenstern. Kompositen.

speciosa (Bupthalmum speciosum)	—60	5.50	—
Blätter herzförmig, gross, Blütenstände breit, orangegelb. Ende Juni, Höhe 1 m.			

Teucrium, Gamander. Labiaten.

chamaedrys	—25	2.—	15.—
Sehr schön wintergrün, zu Einfassungen. Weitere Arten siehe Laubbölzer.			

Thalictrum, Wiesenraute, **B.** Ranunculaceen.

adiantifolium	—40	3.50	30.—
Besonders fein zerteiltes Laub. Höhe 25 cm, für Binderei.			
aquilegifolium , Amstelraute	—35	3.—	25.—
Blüten aufrecht. Höhe bis 1,2 m, dunkelpurpurlila, akeleiblättrig.			
» album	—35	3.—	25.—
Weissblühende Form der vorigen.			
» roseum	—35	3.—	—
Rosa blühende Form.			

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Thalictrum (Fortsetzung):			
<i>aquilegifolium compactum album</i>	—50	4.50	40.—
Viel gedrungener im Wuchs und von schöner, reinweisser Farbe.			
<i>Cornuti</i>	—35	3.—	—
Blüte gelblichweiss. Ende Juni.			
<i>dipterocarpum</i>	—30	2.50	20.—
Ähnlich <i>Th. Delavayi</i> , nur bedeutend höher, bis 2 m, etwas dunkler in der Farbe und kleinblumiger. Sehr fein. Durch die gelben Staub- gefässe besonders zierlich.			
<i>flavum</i>	—35	3.—	—
Höhe 1 m, akeleiblätrig, Blüten gelblich. Ende Juni bis August.			
<i>glaucum</i>	—35	3.—	—
Höhe 120—150 cm, blaugrüne, glänzende Belaubung, Blüten gelb- lich. Ende Juni bis August.			
<i>hybridum eminens</i>	—30	2.50	—
Juni. Höhe 1 m, gelbliche Blüte.			
» <i>formosus</i>	—30	2.50	—
Juni. Höhe 75 cm, gelblichgrün.			
» <i>minus</i>	—30	2.50	—
Höhe etwa 60 cm, Belaubung ähnlich <i>Th. adiantifolium</i> , nur üp- piger. Blüten grünlich. Mai—Juni.			
» <i>praestans</i>	—30	—	—
Akeleiblätrig. Blüten in Form wie <i>Th. dipterocarpum</i> , aber ganz grünlichgelb. Höhe 1 m. Juni.			
Thermopsis , Papilionaceen.			
<i>fabacea</i>	—30	2.50	—
An <i>Lupinus</i> erinnernde Staude, schön gelblühend. Höhe 50—80 cm. Mai—Juni. Kriechwurzeln.			
Thymus , Thymian, Quendel. Labiaten.			
<i>citriodorus</i>	—30	2.50	—
Bis 30 cm hohes, aromatisch duftendes Gewächs mit kleiner Be- laubung und lilafarbigen, kleinen Blüthen im Sommer.			
» <i>variegatus</i>	—35	3.—	28.—
Schöne, gelbbunte Einfassungspflanze, in der Art wie vorige.			
<i>lanuginosus, B.</i>	—30	2.50	20.—
Weisswollig behaart, nach den <i>Th. Serpyllum</i> -Arten blühende, rosa Abart. Polsterbildend. Juli.			
<i>Serpyllum albus, B.</i>	—30	2.50	20.—
Polsterbildend, sehr schön weissblühend. Juni.			
» <i>carneus, B.</i>	—30	2.50	20.—
Polsterbildend, lilafarbig. Juni.			
» <i>coccineus, B.</i>	—30	2.50	20.—
Polsterbildend, dunkelkarmin, Juni, dunkelste Art.			
Tiarella , an <i>Heuchera</i> erinnernd. Saxifragaceen.			
<i>purpurea</i>	—35	—	—
Blüte grünlich mit lachsrotem Schein.			
» <i>marmorata</i>	—35	3.—	—
Blütenstiele hoch, Blumen kastanienbraun.			
Tradescantia , Dreimasterblume. Commelinaceen.			
<i>virginiana</i>	—35	3.—	—
Sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Belaubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erscheinen von Mai ab. Höhe 50—75 cm.			
» <i>alba</i>	—35	3.—	—
Reinweissblühende Form.			
Trautvetteria , Ranunculaceen.			
<i>palmata</i>	—40	—	—
Grosses Laub und bis 25 cm hohe, doldentraubige Blütenstände, weiss im Juli.			
Trifolium , Klee. Papilionaceen.			
<i>repens atropurpureum</i>	—25	2.—	15.—
Blätter schön schwärzlichbraunrot, Blüten weiss. Höhe 10 bis 15 cm. Blätter 4—5 zählig, sehr gut, kriechend.			

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Triosteum , Fieberkraut, Drillingssteinchen. Caprifoliaceen.			
<i>pinnatifidum</i>	— 50	—	—
Reichlich 50 cm hohe Staude mit grossen, buchtig gelappten, stark borstig behaarten Blättern. Die im Sommer reifenden, weissen, kugeligen Früchte sind sehrzierend.			
Tritoma , Kniphofia, Raketenblume. Liliaceen.			
<i>hybrida Express, B.</i>	— 45	4.—	35.—
Prächtig hell- bis dunkelorange Blütenstände von Juni an. Sehr reichblühend.			
» <i>recurvata, B.</i>	— 50	—	—
Spät, orange blühend.			
» <i>Uvaria glaucescens, B.</i>	— 50	4.50	—
Blüte rötlichorange.			
Trollius , Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceen.			
<i>asiaticus roseus</i>	— 50	—	—
<i>dschungaricus</i>	— 50	—	—
Tracht wie <i>T. europaeus</i> , Blätter weniger geschlitzt, Blüten halb- offen, orangegelb.			
<i>europaeus</i>	— 40	3.50	30.—
Schön hellgoldgelbe Blumen, mittelgross, reichblühend. 50 cm hoch. Mai.			
» <i>giganteus</i>	— 50	—	—
Grossblumig, tiefdottergelb. 60 cm hoch. Mai.			
» <i>Orange Globe</i>	— 50	4.—	35.—
Blüte sehr gross, kugelig, dunkelorange. Mai.			
<i>Goldquelle</i>	— 50	4.—	35.—
Prächtig goldgelbe Kugeln. Mai.			
<i>humilis</i>	— 40	3.50	30.—
Tiefdottergelb, 50 cm hoch. Mai.			
<i>hybridus Earlist of All</i>	— 40	3.50	—
Mittelgross, kugelig, hellorange. Mitte April. 50—60 cm.			
» <i>Goliath</i>	— 50	—	—
Früh, im April, dunkelorange.			
» <i>Helios</i>	— 50	—	—
Rein gelb.			
<i>Hybriden gemischt; Sämlinge</i>	— 30	2.50	20.—
Goldgelbe und orange Töne.			
<i>laxus (T. americanus)</i>	— 50	—	—
Blüten nur 5 Sepalen, hellgelb, kugelig gewölbt. Mai—Juni.			
<i>Ledebouri</i>	— 40	3.50	30.—
Reizende Sorte, 60—90 cm hoch, orangegelb. Mitte bis Ende Juni.			
<i>Salamander</i>	— 50	4.—	35.—
Wohl dunkelste aller Sorten, leuchtend tieforange. Mai.			
Tropaeolum , Kapuzinerkresse. Tropaeolaceen.			
<i>speciosum</i>	— 40	3.50	—
Rankend, mit zierlicher Belaubung und sehrzierenden, fein- geschlitzten, scharlachroten Blumen. August—September. In son- niger Lage weithin leuchtend.			
Tunica , Felsennelke. Caryophyllaceen.			
<i>Saxifraga</i>	— 30	2.50	20.—
Reizende Alpenpflanze, mit linealen Blättern und etwa 25 cm hohen, lockeren Blütenständen, besetzt mit zahlreichen, zartrosa Blüthen.			
Uvularia , Zäpfchenkraut, Trauerglockenblume. Liliaceen.			
<i>grandiflora</i>	— 50	—	—
Nordamerikanische, harte Staude mit länglichen Blättern und endständigen, nickenden, glockigen Blüten im Mai. Höhe etwa 30 cm.			
Valeriana , Baldrian. Valerianaceen.			
<i>rotundifolia</i>	— 35	3.—	—
Niedrige, nur etwa 5—10 cm hohe Form, Blüthen blasserötlich. Mai.			

Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceen.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
densiflorum Blätter gelbfülig, Blüten kupfergelb, Juni bis Herbst, Höhe 75–100 cm.	—35	3.—	25.—
pannosum Weissfülig, Blüten gelb, 1,5 m hoch, Juli–August. Oft nur zweijährig.	—40	3.50	—
phoeniceum , B. Mit schönen, braunvioletten Blumen an meterhohen Trieben, von Mai bis August blühend.	—30	2.50	20.—

Veronica, Ehrenpreis **B.** Scrophulariaceen.

amethystina (<i>V. latifolia</i>) Höhe 40 cm, Blüentrauben in den Blattwinkeln. Juni, lilablau.	—35	3.—	25.—
elegans (<i>V. longifolia rosea</i>) Rosa blühend. Juni–Juli.	—40	3.50	—
gentianoides variegata Sehr früh im Mai blühend, Höhe 30–50 cm, durch das weiss- bunte Laub beachtenswert. Zu Einfassungen.	—25	2.—	18.—
latifolia Royal Blue Sehr gut, dunkelblau, Höhe 25 cm, Ende Mai.	—30	2.50	20.—
longifolia Bis 50 cm hoch, Juli, lila Blüten, Blätter spitz, unterseits behaart.	—25	2.—	18.—
Prenja (<i>V. austriaca</i>) Etwa 30 cm hoch, Blüten gross, blau. Ende Mai bis Juni.	—30	2.50	20.—
prostrata Kleines, niederes Pflänzchen, 3 cm hoch, blaue Blütchen im Mai.	—30	2.50	20.—
rupestris Höhe 10 cm, prächtige, niederliegende Form von <i>Veronica Teu-</i> <i>crium</i> . Ende Mai.	—30	2.50	20.—
saxatilis (<i>V. fruticans</i>) Höhe etwa 15 cm, Blüten azurblau mit dunklerem Schlund. Mai.	—30	2.50	20.—
spicata (<i>V. crassifolia</i>) Blütenstände dicht, himmelblau, 20–40 cm hoch.	—40	—	—
Teucrium Höhe etwa 30 cm, Blätter sitzend, ei- bis herzförmig, Blüten gross, blau, achselständig. Mai.	—30	2.50	20.—

Veronica, siehe auch Laubhölzer.**Vinca**, Sinngrün. Apocynaceen.

major maculata Grossblättrige und sehr grossblumige, hellblaue Form. Blätter schön gefleckt.	—40	3.50	30.—
minor Bekanntes, hübsches Immergrün mit violetten Blüten für schattige Stellen als Rasenersatz, blüht im Mai.	—25	2.—	15.—
» alba Weissblühende Form des vorigen.	—40	—	—
» rosea plena Dunkelrosa gefüllte Abart.	—40	—	—

Viola, Veilchen. Violaceen.

cornuta Blütenfülle Sehr grossblumig, helllila.	—30	2.50	20.—
» G. Wermig (<i>atropurpurea</i>), 1000 St. M. 180.—, mit Topfballen Unermüdlich blühendes, herrlich dunkelpurpurblaues Horn- veilchen von köstlichem Duft. Sehr wirkungsvoll.	—30	2.50	20.—
» hybrida Hansa (Perle von Vierlanden) . . mit Topfballen Sehr grossblumig, herrlich dunkelblau, ausserordentlich reich- blühend, gut über dem Laube.	—40	3.50	30.—
» hybrida Spion Kop mit Topfballen Sehr schön, dunkelpurpurrot.	—35	3.—	25.—
» lutea Leuchtend gelb.	—30	2.50	20.—
» nivea Blendend schneeweiss.	—30	2.50	20.—
» Papilio Sehr lebhaftes, blauweisses Hornveilchen, an Schmetterlinge er- innernd. Echte Hornveilchenform.	—25	2.—	18.—

Viola (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
cornuta sulfurea	—30	2.50	20.—
Schwefelgelb.			
cucullata grandiflora	—30	2.50	20.—
Blaues Pfingstveilchen, 15—20 cm hoch, Blüten geruchlos.			
gracilis Lord Nelsonmit Topfballen	—35	3.—	25.—
Sehr grossblumig, tief purpurviolett, reichblühend von März bis August.			
obliqua striata	—30	2.50	20.—
Blaue Weiss gestreiftes Veilchen im Mai. Höhe bis 25 cm.			
odorata , wohlriechendes Veilchen in nachstehenden Sorten:			
» Admiral Avellan	—30	—	—
Grosse Belaubung, Blüten gross, purpurrot, den ganzen Sommer hindurch.			
» alba	—30	2.50	20.—
Weissblühend.			
» Ascania	—30	2.50	20.—
» Brandiana	—30	—	—
» Hedwig Bernock	—30	2.50	—
» Kaiserin Auguste Viktoria	—30	2.50	—
Mittelgross, auffallend reichblühend im Frühjahr und im Herbst.			
» Königin Charlotte	—25	2.—	15.—
Blüht beinahe das ganze Jahr hindurch. Die mittelgrossen, leuchtend dunkelblauen Blumen stehen fast aufrecht.			
» Perle	—30	2.50	—
» Rose de Bruneau	—30	2.50	—
» The Czar	—30	2.50	—

Wahlenbergia *Mariesi*, siehe *Platycodon*.**Waldsteinia**, *Rosaceae*.

geoides	—40	—	—
Blüht im Mai, gelb. Höhe 20 cm.			
trifoliata	—30	2.50	20.—
Gelbbühend. Mai. Höhe 15—20 cm, infolge der Reichblütigkeit sehr gut.			

Wulfenia, *Kuhtritt*. *Scrophulariaceae*.

carinthiaca	—50	—	—
Schöne, blaue Blütenähren. Mai. Höhe 15 cm.			

Yucca, *Palmenlilie*. *Liliaceae*.

filamentosa	—60	5.50	50.—
starke Pflanzen	1.—	9.—	—
Sehr ornamentale Pflanzen mit graugrünen Blättern und prächtigen, meterhohen Blütenständen, dicht besetzt mit grossen, elfenbeinweissen Glocken.			

Freiland - Farne.*Filices*.**Aspidium** *R. Brown*. *Schildfarn*, *Punktfarn*.

acrostichoides Schwarz	2.—	—	—
aculeatum setosum viviparum G. Capelle	—60	5.—	40.—
Immergrüner Farn, mit zierlich geteilten Wedeln.			
Barnesi	—75	—	—
Boothi Tuckerm.	—50	4.—	—
Sehr selten anzutreffende Hybride von aufrechtem Wuchs. Kreuzung zwischen <i>Aspid. spinulosum</i> und <i>cordatum</i> .			
dilatatum Swartz	—80	—	—
Sehr eleganter Farn, mit grossen, breiten, weitausladenden Wedeln, die sehr fein eingeschnitten sind. Gedeiht in jeder Lage.			
» lepidotum Moore (<i>Asp. dilatatum gracile</i>)	1.—	—	—
Schlankwachsende, sehr graziöse Form.			

Aspidium (Fortsetzung):**dryopteris Asherson.**

Kleiner, schattenliebender Buchenfarn mit dreiteiligen, wagrecht abstehenden Wedeln. Höhe 10—20 cm.

filix mas Swartz

extra starke Pflanzen

Eine der bekanntesten Arten unseres Kontinents. Rhizome und Blattmittellippe sind mit langen, glatten, goldbraun durchschimmernden Schuppen besetzt. Wedel 50—120 cm lang.

Die nachfolgenden Formen entwickeln oft eigentümlich gestaltete, wunderbare Pflanzenbildungen.

» **mas crenatum Milde**

extra starke Pflanzen

» » **cristatum Swartz**» » **daedaleum Hort.**

extra starke Pflanzen

» » » **cristatum Hort.**

extra starke Pflanzen

» » **dolomiticum Christ, Capelle**

Kleiner, etwa 15 cm hoher, zierlicher Farn.

» » **erosum crenatum G. Capelle**

extra starke Pflanzen

» » **furcans Moore**

extra starke Pflanzen

» » **furcatum Moore**

extra starke Pflanzen

» » **interruptum Hort.**» » **paleaceum Mett.**

extra starke Pflanzen

» » **propinquum crispum R. Br.**

extra starke Pflanzen

» » **squamulosum Hort.**» » **subintegrum Doell.**

extra starke Pflanzen

lobatum Swartz

Eine der schönsten, immergrünen Farne. Wedel etwas grob gefiedert, von ca. 50 cm Länge.

noveboracense Desv.

Zierliche Pflanze von heller Farbe. Liebt Feuchtigkeit und moorigen Boden, verträgt aber Sonne.

phegopteris Asherson

Eigentümlicher, sehr zierlicher und wenig verbreiteter Farn, mit 40—50 cm langen Wedeln. Einer der ältesten Farne unter den lebenden Arten.

remotum A. Braun

Sehr seltene, abweichende Art mit feinen, dünnen, zierlich aufgerichteten Wedeln.

spinulosum Milde» **Chanteriae G. Capelle**

Hübscher, grosser, schlanker Farn, von elegantem und leichtem Bau, für schattige Lagen passend.

thelypteris Linné.

Sumpf- oder nahezu Wasserfarn. Wedel lebhaft grün, weich, in die Länge gezogen, lang gestielt.

Asplenium, Streifenfarn, Milzfarn.**Trichomanes Linné**, Haarfarn

Wintergrüner Mauerfarn.

Athyrium, Frauenfarn.**alpestre Luerssen**

Zierlicher, steif aufrecht wachsender, 50—60 cm hoher Farn für sonnige Abhänge. Sehr empfehlenswert.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
dryopteris Asherson.	—50	4.—	—
filix mas Swartz	—40	3.50	30.—
extra starke Pflanzen	—50	4.50	40.—
» mas crenatum Milde	—40	3.50	30.—
extra starke Pflanzen	—50	4.50	40.—
» » cristatum Swartz	—75	—	—
» » daedaleum Hort.	—60	5.—	—
extra starke Pflanzen	—70	6.—	—
» » » cristatum Hort.	—60	5.—	—
extra starke Pflanzen	—70	6.—	—
» » dolomiticum Christ, Capelle	—50	4.50	40.—
» » erosum crenatum G. Capelle	—45	4.—	35.—
extra starke Pflanzen	—60	5.—	—
» » furcans Moore	—45	4.—	—
extra starke Pflanzen	—60	5.—	40.—
» » furcatum Moore	—45	4.—	—
extra starke Pflanzen	—60	5.—	—
» » interruptum Hort.	—50	—	—
» » paleaceum Mett.	—45	4.—	35.—
extra starke Pflanzen	—60	5.—	40.—
» » propinquum crispum R. Br.	—75	7.—	—
extra starke Pflanzen	1.—	9.—	—
» » squamulosum Hort.	—75	—	—
» » subintegrum Doell.	—60	5.—	45.—
extra starke Pflanzen	—75	7.—	—
lobatum Swartz	1.25	—	—
noveboracense Desv.	—40	3.50	30.—
phegopteris Asherson	—40	3.50	—
remotum A. Braun	—50	4.50	—
spinulosum Milde	—50	—	—
» Chanteriae G. Capelle	—60	5.—	—
thelypteris Linné.	—50	4.50	40.—
Asplenium	—75	—	—
Trichomanes Linné	—60	5.—	—

Athyrium (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
filix foemina Roth	—60	5.—	—
Einer der schönsten und sicherlich am feinsten geschlitzten Farne unserer Heimat. Wedel hellgrün, leicht gebaut, 60–80 cm hoch. Diese Art besitzt eine überaus grosse Anzahl Varietäten mit eigenartig schönen, zierlichen Bildungen, wovon ich nachfolgend eine besonders gute Auslese anbiete.			
» foemina bisdaedaleum cristatum Hort.	—80	—	—
» » bisfalcatum Hort.	—80	7.—	—
» » bisfurcatum Hort.	—80	—	—
» » cristatum purpureum	1.—	—	—
» » daedaleum coronatum cristatum nanum Hort. ...	—60	5.—	—
» » diviso multifidum Hort.	—80	7.—	—
» » erosum minus Hort. Einfassungsfarn.....	—40	3.50	30.—
» » furcans Hort.	—80	—	—
» » furcatum cristatum Hort.	1.—	—	—
» » graminicon Hort.	—80	7.—	—
» » monstrosum Hort.	—80	7.—	—
» » multidentatum purpureum Hort.	—80	7.—	—
» » plumosum multifidum	1.50	—	—
» » Pritchardi cristatum Hort.	—80	—	—
» » Pseudo Victoriae Hort.	—80	7.—	—
» » Stansfieldi Hort.	—80	7.—	—
thelypteroides Michaux.	—60	5.—	—
Besonders bemerkenswert durch die Zierlichkeit und Eleganz ihrer Wedel, 50–60 cm lang, von gelblichgrüner Farbe, aufrecht und zierlich handförmig zurückfallend.			
Blechnum Linné , Rippenfarn.			
Spicant Desv.	—40	3.50	30.—
Immergrüner, schöne, grüne Rosetten bildender Farn, mit hahnenfederartigen, fruchtbaren Wedeln. Liebt sandigen Lehm.			
Cystopteris Bernhardi , Blasenfarn.			
Kleine, sehr zierliche Wedel bildend. Pflanzen selbst rasenbildend, schön für kleine Felsbepflanzungen, nur im Sommer grün, vertragen grosse Dürre.			
fragilis Bernh.	—80	—	—
regia Luerssen	—80	—	—
Dicksonia (Dennstaedtia).			
punctilobula Hook. Einfassungsfarn.....	—40	3.50	30.—
Mittelhoch, freudig grün, während des Sommers fortwährend neue Wedel bildend, äusserst zierlich und sehr zu empfehlen.			
Lomaria.			
alpina Sprengel	—50	4.50	—
Onoclea Linné , Sumpffarn.			
sensibilis Linné	—50	4.50	—
Mittelhoher Farn mit kräftigen Wedeln, die fruchttragenden sind zierlicher als die unfruchtbaren. Liebt etwas Feuchtigkeit.			
Osmunda , Traubenfarn, Rispenfarn.			
regalis cristata Linné , Königsfarn..... starke Pflanzen	5.—	—	—
» gracilis Hook. » »	5.—	—	—
Polypodium Linné , Tüpfelfarn.			
cambricum pulcherrimum Stansfield (Polyp. cornubiense)...	—70	6.50	60.—
Prächtiger, etwa 15 cm hoch werdender Farn mit Winterlaub von feiner Zerteilung.			
falcatum Hort.	—50	—	—
vulgare Linné , gemeiner Tüpfelfarn.....	—40	3.50	30.—
Einer der bekanntesten heimischen Farne mit fiederspaltigem, lanzettlichem Laub, zur Dekorierung schattiger Lagen. Höhe 10–15 cm, immergrün.			
Scolopendrium , Hirschzunge.			
officinatum Swartz	—40	3.—	25.—

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Selaginella Spring. Kleine, moosartige Pflanzen, für schattige Lagen, lieben etwas Feuchtigkeit.			
Douglasi Spr.	—25	2.—	—
helvetica Spr.	—25	2.—	15.—
Struthiopteris , Straussfarn.			
germanica Willdenow	—50	4.—	—
extra starke Pflanzen	—75	7.—	—
pennsylvanica Willdenow	1.50	—	—
extra starke Pflanzen	2.—	—	—
Woodsia , Hüllfarn, Wimperfarn.			
ilvensis R. Brown	—80	—	—

Farn-Sortimente.

10 Farne in	10 guten Sorten meiner Wahl M.	4.—
100 „ „ 10—20 „ „ „ „ „		35.—
10 Farne in	10 Sort., besond. schöne Zusammenstell. M.	6.—
100 „ „ 10—20 „ „ „ „ „		50.—

Ziergräser.

Arrhenatherum , bunter Glatthafer.			
bulbosum variegatum	—40	3.—	25.—
Etwa 30 cm hohe Büsche mit feiner, silberbunter Belaubung.			
Arundo , Pfahlrohr. Gramineen.			
Donax	—75	—	—
Bis 4 m hohe, schmuckvolle Graminee aus Südeuropa, mit kurzen, dicken Rhizomen und rispigen Blütenständen.			
» variegata	1.—	—	—
Prachtvolles Ziergras mit grosser, langer, lebhaft weissbunter Belaubung.			
Carex , Rietgras, Segge. Cyperaceen.			
acuta variegata	—50	4.50	—
Gelb gestreift.			
Elymus , Haargras. Gramineen.			
glaucifolia	—60	5.—	—
Blauweiss bereift.			
Eulalia , Eulalie. Gramineen.			
japonica (Miscanthus sinensis)	—75	—	—
Sehr dekoratives Blattwerk, herrliche Blütenstände, zahlreiche, graziös hängende, seidenartig behaarte Ähren in doldenartigem Straus vereinigt.			
» gracillima univittata	—75	—	—
Tracht zierlich, Blätter schmaler, dunkelgrün mit weissem Mittelnerv.			
» zebrina	—75	—	—
Blätter mit regelmässig verteilten, hellgelben Querstreifen.			
Festuca , Schwingel. Gramineen.			
alpina	—30	2.50	—
Glyceria , Süssgras.			
spectabilis variegata	—50	4.50	—
Höhe 1 m, prächtig weiss und grün längsgestreift			
Imperata , Eulalie. Gramineen.			
sacchariflora	—75	7.—	—
Höhe über 1 m, Blätter lineal, rotgeadert, Blütenrispen Juli-August.			
Phalaris , Glanzgras. Gramineen.			
arundinacea aureo-picta	—40	3.—	25.—
1 bis 2 m hohes Ufergras, raubblättrig.			
Scirpus , Binse. Cyperaceen.			
eriphorus	—60	—	—

Stauden-Zusammenstellungen.

Treibstauden:

Anchusa myosotidiflora
Anemone silvestris
Aquilegia, in Sorten
Arabis alpina plena
Aster alpinus, in Sorten
Astilbe Arendsi, zum Spät-
 treiben.
Astilbe hybrida, in Sorten
Bergenia hybrida
Centaurea montana, in
 Sorten.
Convallaria majalis
Dianthus plumarius, in
 Sorten.
Dielytra spectabilis
Doronicum, in Sorten

Epimedium, in Sorten
Euphorbia polychroma
Filipendula, siehe *Spiraea*
Funkia, in Sorten
Galanthus nivalis
Gentiana acaulis
Geum, in Sorten
Helleborus, in Sorten
Hepatica, in Sorten
Hesperis matronalis plena
Iberis, in Sorten
Iris pumila, in Sorten
Leucanthemum, in Sorten
Lilium, in Sorten

Lupinus, in Sorten
Lychnis viscaria splendens
plena
Orobis vernus
Phlox canadensis, in Sorten
Polemonium, in Sorten
Primula, in Sorten
Pulmonaria, in Sorten
Ranunculus aconitifolius
plenus
Spiraea filipendula
 » *filipendula plena*
Thalictrum adiantifolium
Trollius, in Sorten
Viola odorata, in Sorten

Stauden für Rasenersatz und Polsterstauden.

Name	Auf 1 qm werden benötigt Stück	Bemerkungen
<i>Acaena</i> , in Sorten.....	10	Grüne und graue Polsterrasen mit inter- essanten Früchten.
<i>Achillea aurea</i>	16	Graugrün mit lebhaftgelben Blüten.
<i>Ajuga reptans atropurpurea</i> ...	10	Halbschatten, nicht zu feucht.
» <i>reptans multicoloris</i>	10	Halbschatten, nicht zu feucht.
<i>Antennaria tomentosa</i>	16	Trockene, sonnige Lage, graue Polster für Böschungen.
<i>Asarum europaeum</i>	16	Immergrün, schattig und kühl.
<i>Aubrietia</i> , in Sorten.....	20	Wintergrün, sonnig, trocken.
<i>Brunella</i> , in Sorten.....	12	Sehr dichte Bodendecke.
<i>Campanula Portenschlagiana</i> ..	16	Sonnige Lage.
<i>Cerastium Biebersteini</i>	16	Silberweiße Polster, sonnige Lage.
» <i>tomentosum</i>	12	Ähnlich der vorigen, jedoch höher.
<i>Chrysanthemum (Pyrethrum)</i>		
<i>Tschihatschewi</i>	12	Trockene, sonnige Lage.
<i>Convallaria majalis grandiflora</i>	25	Bekannte, grossblumige Maiblume.
<i>Dianthus caesius</i>	25	Blaugraue Polster, wintergrün, sonnig.
» <i>deltoides Brillant</i>	12	Lockerrasig, sonnige Lage.
» <i>suavis</i>	25	Duftige Nelkenpolster.
<i>Epimedium</i> , in Sorten.....	12	Schattig, humose Stellen.
<i>Festuca alpina</i>	12	Felsengras, sonnige Lage.
<i>Glechoma hederacea</i>	10	Wuchert stark, üppig, frischgrün.
<i>Gypsophila libanotica</i>	12	Üppiger rosa Blütenrasen.
» <i>repens</i>	16	Etwas höher als vorige.
<i>Hepatica angulosa</i>	20	Humose, schattige Lage.
» <i>triloba</i>	20	Humose, schattige Lage, etwas heikler als vorige.
<i>Hieracium</i> , in Sorten.....	16	Ausgezeichnet zum Verwildern im Park.
<i>Houstonia serpyllifolia</i>	16	Zierlich lichtgrüner Rasen, Halbschatten.

Stauden für Rasenersatz und Polsterstauden (Fortsetzung):

Name	Auf 1 qm werden benötigt Stück	Bemerkungen
<i>Iberis sempervirens</i>	12	Graue Polster, sonnige Lage.
<i>Linaria cymbalaria</i>	12	Sonnige Lage, armen Boden.
» <i>pallida</i>	16	Üppig wachsend, für Geröllstellen.
<i>Mertensia primuloides</i>	16	Frischgrüne Polster.
<i>Omphalodes verna</i>	16	Üppiger, harter Wachser.
<i>Phlox amoena</i>	16	Frischgrüne, dichte Rasen.
» <i>setacea</i> , in Sorten	12	Herrliche Blütenpolster.
» <i>stellata</i> , in Sorten	12	Etwas heikler als vorige.
<i>Primula juliae</i>	20	Sehr dichte Polster, effektvoller Blüher.
<i>Pulmonaria</i> , in Sorten	12	Allerfrüheste Blütendecke.
<i>Sagina</i> , siehe <i>Spergula</i>	—	
<i>Saxifraga</i> , in Sorten	20	Lockere Rasen, schattige Lage.
<i>Sedum</i> , in Sorten	20	Trockene Lagen, Schatten und Sonne
<i>Spergula pilifera</i> (<i>Sagina</i> <i>subulata</i>)	25	Ganz nieder, moosartig.
<i>Stachys lanata</i>	12	Weissfilzig, für trockene, sonnige Lage.
<i>Thymus lanuginosus</i>	20	Sehr dichte, graugrüne Polster.
» <i>Serpyllum</i> -Formen	20	Für magere, trockene, sonnige Hänge.
<i>Trifolium repens atropur-</i> <i>pureum</i>	16	Blutroter Klee, sehr wüchsig, sonnige Lage.
<i>Tunica Saxifraga</i>	16	Lockerer Alpenrasen.
<i>Veronica prostrata</i>	20	Dichter, blauer Blütenrasen.
» <i>rupestris</i>	16	„Enzianrasen“ von bester Wirkung.
<i>Vinca minor</i>	16	Erstklassig, für Schatten.
<i>Viola cornuta</i> G. Wermig	12	Wirkungsvoller Veilchentepich.
<i>Waldsteinia geoides</i>	12	Üppiger Wachser, Halbschatten.

Stauden die besonders geeignet sind zur Bepflanzung
von Plattenwegen.

○ bedeutet Verwendung in Sonne.

● bedeutet Verwendung im Schatten.

<i>Acaena</i> , in Sorten ○	<i>Epimedium lilacinum</i> ●	<i>Pyrethrum Tschihatschewi</i> ○
<i>Achillea aurea</i> ○	» <i>niveum</i> ●	<i>Sagina subulata</i> ○●
<i>Ajuga reptans</i> u. Formen ○●	<i>Gentiana acaulis</i> ○	<i>Saxifraga</i> -Hybriden ○
<i>Androsace laggeri</i> ○	<i>Glechoma hederacea</i> ○●	<i>Sedum</i> -Arten ○●
<i>Antennaria tomentosa</i> ○	<i>Gypsophila libanotica</i> ○	<i>Sempervivum</i> -Arten ○
<i>Armeria lauchiana</i> ○	» <i>repens monstrosa</i> ○	<i>Silene acaulis excapa</i> ○
» <i>leucocephala</i> ○	<i>Hepatica</i> , in Sorten ●	<i>Spergula pilifera</i> ○●
» <i>maritima</i> ○	<i>Houstonia serpyllifolia</i> ○	<i>Thymus lanuginosus</i> ○
<i>Aubrietia</i> , in Sorten ○	<i>Linaria pallida</i> ○	» <i>Serpyllum</i> -Arten ○
<i>Campanula portenschlagiana</i> ○	<i>Phlox amoena</i> ○	<i>Tunica Saxifraga</i> ○
<i>Corydalis lutea</i> ○●	» <i>setacea</i> (frondosa)	<i>Veronica</i> , in Sorten ○
<i>Dianthus caesius</i> ○	u. Formen ○	<i>Vinca minor</i> ●
» <i>deltoides</i> Brillant ○	<i>Phlox stellaria</i> ○	<i>Waldsteinia trifoliata</i> ○●
» <i>suavis</i> ○	<i>Primula juliae</i> ○	<i>Wulfenia carinthiaca</i> ●

Farne:

<i>Athyrium f. f. daedaleum coronatum</i>	<i>Polypodium cambricum pulcherrimum</i> ●
<i>cristatum nanum</i> ●	» <i>vulgare</i> ●
<i>Lomaria alpina</i> ●	<i>Selaginella</i> -Arten ●

Schatten-Stauden.

Höhe: n = niedrig = bis 25 cm; m = mittel = bis 60 cm; h = hoch = über 75 cm.

Blütezeit: VF = Vorfrühling; F = Frühling; S = Sommer; H = Herbst.

Die mit * versehenen Stauden sind auch für besonders schattige und ungünstige Stellen zu verwenden.

Name	Höhe	Blütezeit	Name	Höhe	Blütezeit
<i>Aconitum</i> , in Sorten	h	S	<i>Geum</i> , in Sorten	n—m	F—S
<i>Actaea spicata</i>	m	S	<i>Gillenia trifoliata</i>	m	S
<i>Ajuga reptans</i> , in Sorten	n	F	* <i>Hacquetia epipactis</i>	n	VF
<i>Anchusa myosotidiflora</i>	n—m	F	* <i>Helleborus foetidus</i>	m	VF
<i>Androsace primuloides</i>	n	F	* » <i>Hybriden</i>	m	F—S
<i>Anemone japonica</i>	m—h	S—H	* » <i>niger</i>	n	H—F
* » <i>nemorosa</i>	n	VF	<i>Hemerocallis</i> , in Sorten	m—h	S
* » <i>pennsylvanica</i>	m	S	* <i>Hepatica</i> , in Sorten	n	F
* » <i>silvestris</i>	m	F—S	<i>Heuchera</i> , in Sorten	n	F—S
<i>Anthericum</i> , in Sorten	m	S	<i>Hypericum calycinum</i>	n	S—H
<i>Arrhenatherum bulbosum</i>	n	S	<i>Lilium</i> , in Sorten	m—h	S—H
* <i>Asarum europaeum</i>	n	F	<i>Lithospermum prostratum</i>	n	F—H
* <i>Asperula odorata</i>	n	F	<i>Lysimachia clethroides</i>	h	S—H
<i>Astilbe</i> , in Sorten	n—m	S—H	<i>Megasea</i> , in Sorten	n	F
* <i>Astrantia major</i>	h	S	<i>Mertensia</i> , in Sorten	n	S
<i>Calluna vulgaris</i> , in Sorten	n	S—H	<i>Meum athamanticum</i>	m	S
<i>Campanula glomerata</i>			<i>Muscari botryoides</i>	n	F
<i>superba</i>	m	F—S	<i>Omphalodes verna</i>	n	F
» <i>latifolia</i>	h	S	* <i>Orobus</i> , in Sorten	n—m	F—S
» <i>macrantha alba</i>	m	S	<i>Pachysandra terminalis</i>	n	S
» <i>persicifolia</i>	m	S	<i>Phlox divaricata</i>	n	F
<i>Calceolaria polycorrhiza</i>	n	S	<i>Primula</i> , in Sorten	n—m	VF—S
* <i>Carex acuta variegata</i>	h	S	<i>Pulmonaria</i> , in Sorten	n—m	VF—F
<i>Cimicifuga</i> , in Sorten	h	S—H	<i>Pirola rotundifolia</i>	n	S
* <i>Convallaria majalis</i>	n	F	<i>Ramondia</i> , in Sorten	n	S
* <i>Polygonatum</i>	m	F—S	<i>Ranunculus</i> , in Sorten	n—m	F—S
* <i>Cortusa Matthioli</i>	n	F	<i>Rodgersia</i> , in Sorten	m—h	S
<i>Corydalis</i> , in Sorten	n—m	F—S	<i>Saxifraga</i> , in Sorten	n	VF—S
<i>Cyclamen</i> , in Sorten	n	F—S	<i>Sedum</i> , in Sorten	n	S
<i>Cypripedium Calceolus</i>	n	F—S	<i>Senecio</i> , in Sorten	h	S—H
<i>Dictamnus</i> , in Sorten	m	S	* <i>Shortia uniflora grandiflora</i>	n	F—S
<i>Dielytra eximia</i>	n	F—H	<i>Soldanella alpina</i>	n	F—S
» <i>formosa</i>	n	F—H	<i>Solidago</i> , in Sorten	n—h	S—H
» <i>spectabilis</i>	m	F	<i>Spiraea</i> , in Sorten	m—h	S
* <i>Digitalis</i> , in Sorten	h	S	<i>Stenanthium robustum</i>	h	S—H
<i>Dodecatheon</i> , in Sorten	n	F—S	<i>Symphitum</i> , in Sorten	m—h	S
<i>Doronicum Columnae</i>	m	F	<i>Synthliris reniformis</i>	n	VF
<i>Dryas octopetala</i>	n	F—S	<i>Thalictrum</i> , in Sorten	n—h	S
* <i>Epimedium</i> , in Sorten	n	F	<i>Tiarella</i> , in Sorten	m	F—S
<i>Eranthis hiemalis</i>	n	F	<i>Uvularia grandiflora</i>	m	F
<i>Erica</i> , in Sorten	n	F	* <i>Vinca minor</i>	n	F
<i>Erythronium Dens canis</i>	n	F	<i>Viola cucullata grandiflora</i>	n	F—S
<i>Eupatorium</i> , in Sorten	h	S	» <i>cornuta</i> G. Wermig.	n	F—H
* <i>Farne</i>	n—m		» <i>odorata</i>		
* <i>Funkia</i> , in Sorten	n—m	S	<i>Königin Charlotte</i>	n	Fu.H
* <i>Galanthus nivalis</i>	n	VF	<i>Waldsteinia geoides</i>	n	F
* <i>Galax aphylla</i>	n	F	<i>Wulfenia carinthiaca</i>	n	S
<i>Geranium platypetalum</i>	m	F—S			

Rosen

in den bekanntesten älteren und besten neueren Sorten.

„Das Rosenbuch“ siehe vorletzte Umschlagseite.

Rosenfreunde

seien hingewiesen auf den „Verein Deutscher Rosenfreunde“ mit dem grosszügigen Rosar in Sangerhausen in Thüringen und der Monatsschrift „Rosen-Zeitung“, Verlag A. Schneider, Sangerhausen. Nähere Auskunft erteilt bereitwilligst Prof. E. Gnau, Sangerhausen in Thüringen.

Hochstämme auf kräftigen Waldstämmen.

In Sorten nach meiner Wahl, mit starken Kronen, I. Qualität, aus allen Klassen sortiert:

Stammhöhe ca. 100—140 cm pro St. M. 2.75

10 „ „ 25.—

100 „ „ 220.—

Mittelstämme, ca. 75—100 cm Stammhöhe
pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 150.—

Hochstämmige Trauerrosen.

Sortenverzeichnis siehe Seite 230.

Stammhöhe ca. 160—200 cm pro St. M. 4.—

10 „ „ 38.—

Niedrige Rosen.

Schöne, besonders kräftige Qualität.

I. Gruppe	pro St. M.	—50,	10 St. M.	4.—,	100 St. M.	35.—
II.	„	„	„	—60,	10 „	5.—, 100 „ 40.—
III.	„	„	„	—70,	10 „	6.—, 100 „ 50.—

Der geneigte Leser wird beim Studium nachfolgender Sortimentslisten feststellen, dass ich stets bemüht bin, meine Rosensammlung alljährlich zu prüfen und mit dem Besten vom Neuen zu ergänzen, so dass auch bei mir überlassener Sortenwahl nur erstklassige Rosen zum Versand kommen. Andere als hier aufgeführte Sorten werden von mir nicht geliefert.

Polyantha-Rosen	siehe Seite 225	Moos-Rosen	siehe Seite 226—227
Centifolien-	„	Rugosa-	„
Gestreifte	„	Schling-	„
Kapuziner-	„	Park-	„
	226		227—228
	226		228—229
	226		230—232

Trauerrosen siehe Seite 230.

Rosen-Sortenverzeichnis.

Die Buchstaben in Spalte „Form“ bedeuten: H = Hochstammrose; n = niedrige oder Buschrose.
 Die Buchstaben in Spalte „Klasse“ bedeuten: B = Bourbonrose; M = Monatsrose;
 R = Remontantrose; T = Teerose; TH = Teehybride.

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preisgruppe
n	Adam Messerich (<i>P. Lambert</i> 1920/21) Prächtig reinrosa, fast gefüllt, von Frühling bis Herbst blühend, ganz hart, nie verblauend.	B	I
n	Admiral Ward (<i>Pernet-Ducher</i> 1915) Dunkelrot mitschwarzlichrot, sehr starkwüchsig und reichblühend.	TH	I
Hn	Admiration (<i>Sam Mc. Gredy & Son</i> 1922) Blumen gross, von hochedlem Bau, cremefarbig mit kupfrigorange, zuweilen rot gestreift oder schattiert.	TH	II
Hn	Adolf Kärger (<i>Kordes</i> 1918) Rein dunkelgelb, im Verblühen heller, Laub gross, sattgrün, krankheitsfrei.	TH	I
Hn	Adolf Koschel (<i>Kordes</i> 1918) Satt ockergelb, blutrot überhaucht und schattiert, sehr schön duftend und haltbar, lang und steif gestielt, Laub gesund. Schnitt- und Treibrose.	TH	I
H	Alexander Hill Gray (<i>A. Dickson & Sons</i> 1911) Blumen gross, gelbweiss wie „Kaiserin“, gefüllt, sehr wüchsig, gesundes Laub, willig blühend, langstielig.	T	I
Hn	Alfred Colomb (<i>Lacharme</i> 1865/66) Blumen gross, leuchtend karminrot, gefüllt, wohlriechende Schnittrose.	R	I
Hn	Amélie de Béthune (<i>Pernet-Ducher</i> 1923) Blumen rötlich korallenrosa mit Karmin schattiert, aufrecht, starkwachsend, Belaubung gut und gesund.	TH	III
Hn	America (<i>E. G. Hill & Co.</i> 1923) Blumen von ausserordentlich schönem Bau, haltbar, herrliche rosa Farbe mit silbrigem Schein. Pflanze mässig wachsend. Hervorragende Treibrose.	TH	III
n	Angèle Pernet (<i>Pernet-Ducher</i> 1924) Blumen ziemlich gut gefüllt, leicht aufblühend, prachtvoll rötlich-orange mit chromgelb schattiert und berandet. Pflanze wüchsig und gesund belaubt.	TH	III
Hn	Ariel (<i>Bees Ltd.</i> 1921) Blumen gross, leicht gefüllt, haltbar, öfter mehrere an einem Stiel, orangegelb, rötlichzinnober schattiert, duftend.	TH	II
n	Arthur R. Goodwin (<i>Pernet-Ducher</i> 1909) Blumen mittelgross, schön, vorzüglich gefüllt, goldgelb, rosa schattiert. Wüchsig, hart und reichblühend.	TH	I
n	Augustus Hartmann (<i>Ben Cant</i> 1914) Blumen recht gross, gefüllt, geranienrot. Kräftiger, aufrechter Wuchs, hellgrünes Laub.	TH	I
Hn	Avoca (<i>A. Dickson & Sons</i> 1908) Blumen genügend gefüllt, gross, spitz, dunkelblutrot, duftend.	R	I
n	Bertha von Suttner (<i>Verschuren</i> 1917) Hellgelb mit etwas Rosa, spitze Knospe.	TH	I
Hn	Betty Uprichard (<i>A. Dickson & Sons</i> 1922) Blumen gut gefüllt, aussen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, lange kräftige Stiele und gesundes Laub.	TH	III
n	Bolkoburg (<i>Dr. Krüger</i> 1917) Blumen mittelgross, leuchtend scharlachkarminrot, rotes Laub, kräftig, Wuchs gedungen, reichblühend.	TH	I
Hn	British Queen (<i>Sam Mc. Gredy</i> 1912) Blumen sehr gross, gefüllt, herrlicher Bau, blendend reinweiss ohne jeden Nebenton, buschig, Laub zierlich, sehr blühwillig.	TH	II
Hn	Captain Christy (<i>Lacharme</i> 1873) Blumen sehr gross, gefüllt, langsam öffnend, hellrosa, gesund belaubt, reichblühend. Zum Frühlitreiben.	R	II
Hn	Château de Clos Vougeot (<i>Pernet-Ducher</i> 1908) Blumen gefüllt, schwärzlichrot, beim Verblühen in Schwarz-samtigpurpur übergehend. Farbe nie verbrennend. Nur spärlich bestachelt.	TH	II

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preisgruppe
Rosen-Sorten (Fortsetzung):			
n	Cheerful (<i>Sam Mc. Gredy & Son 1915</i>) Blumen gefüllt, sehr schön gebaut, krabbrot bis orangerot, Wuchs stark, aufrecht, Pflanze sehr blühbar und vollständig gesund.	TH	I
Hn	Christine (<i>Sam Mc. Gredy & Son 1918</i>) Blumen von sattem, reinem Goldgelb, Pflanze buschig, viel verzweigt, dankbar und voll blühend.	TH	II
Hn	Christine Prior (<i>Sam Mc. Gredy & Son 1924</i>) Blumen dunkelrosa mit gelbem und pfirsichfarbigem Anhauch. Pflanze wüchsig, aufrecht, reichblühend.	TH	III
H	Cissie Easlea (<i>Pernet-Ducher 1913</i>) Blumen gefüllt, rundlich spitz, safrangelb mit orange, Laub gesund, glänzend. Feste Stiele.	TH	I
n	Cleveland (<i>Al. Dickson 1916</i>) Blumen herrlich gebaut, gefüllt, kupfrig, gelb und rötlich getönt, Pflanze buschig mit kräftigen Trieben, gut blühend.	TH	I
Hn	Colonel Oswald Fitzgerald (<i>Al. Dickson 1917</i>) Blumen gefüllt, gut gebaut, voll erblüht noch besonders reizvoll, feurig scharlachrot mit schwärzlichen Schattierungen. Stets blühend, mit gesundem, prächtig glänzendem Laub. Herrliche Gruppenrose.	TH	I
Hn	Columbia (<i>E. G. Hill 1920</i>) Blumen gross, vollgefüllt, gesundes Laub. Wertvolle rosa Treibrose.	TH	II
Hn	Commonwealth (<i>Montgomery & Co. 1923</i>) Blumen sehr gross, kräftig karminrosa, haltbare Farbe. Pflanze mit gesundem, starkem und aufrechtem Wuchs. Auffallende Treib- und Schnittsorte.	TH	III
Hn	Constance (<i>Pernet-Ducher 1915</i>) Blumen sonnengelb, aussen kapuzinerrothraun getönt. Hellgrün glänzendes Laub. Auffallend.	TH	II
Hn	Covent Garden (<i>B. R. Cant & Sons 1919</i>) Blumen sehr gross, lange, kräftige Stiele, ausgezeichnet geformt, gut gefüllt, lebhaft dunkelkarmoisinrot, schwärzlich gefleckt.	TH	I
n	C. V. Haworth (<i>A. Dickson & Sons 1916</i>) Blumen ziemlich gross, gefüllt, schwarzrot, geöffnet noch sehr schön, gesundes, kräftiges Laub.	TH	I
n	David Gilmore (<i>Hugh Dickson Ltd. 1923</i>) Blumen scharlachrot, gute Schnitt- und Gartenrose.	TH	II
n	Dean Hole (<i>A. Dickson & Sons 1904</i>) Blumen sehr gross, edel, gefüllt, rein seidenartig rosa.	TH	I
Hn	Dernburg (<i>Dr. Krüger 1916/17</i>) Blumen gross, sehr gut gefüllt, ausgezeichnet gebaut, lange haltbar, aussen kräftig karminrosa, innen weiss. Herbstblüher.	TH	I
Hn	Diadem (<i>Sam Mc. Gredy 1922</i>) Blumen gross, gefüllt, kupfrig, ähnlich „Mme. Ed. Herriot“. Wuchs kräftig, aufrecht, mit durchaus edler Einzelblume.	TH	II
n	Ducher (<i>Ducher 1870</i>) Blumen becherförmig, halbgefüllt, mittelgross, reinweiss, sehr reichblühend, gute Topf- und Treibrose.	M	I
Hn	Edith Cavell (<i>Chaplin Brothers 1918</i>) Blumen gross, reinweiss mit leichtem Schwefelton.	TH	II
Hn	Eduard Behrens (<i>W. Kordes' Söhne 1921</i>) Blumen gross bis sehr gross, rein blutrot, feurigrot durchleuchtet, nie blauend oder verbrennend, Petalenränder zurückgebogen.	TH	II
Hn	Edward Bohane (<i>H. Dickson 1915</i>) Blumen gross, haltbar, brennend scharlachrot, weitleuchtende Farbe.	R	I
n	Edward Mawley (<i>Sam Mc. Gredy 1911</i>) Blumen sehr gross, gefüllt, schwärzlich schattiertes Karminrot, stark duftend.	TH	I
Hn	Elizabeth Cullen (<i>A. Dickson & Sons 1921</i>) Blumen gross bis sehr gross, feurig-scharlachrot mit samtartig schwärzlicher Schattierung. Gute Form, Pflanze wüchsig, äusserst blühwillig. Schnitt- und Gartenrose.	TH	II
Hn	Elsie Beckwith (<i>George Beckwith & Sons 1922</i>) Blumen mittelgross, auf steilen, langen Stielen, angenehm leuchtend rosa, sehr reichblühende Treib- und Schnittrose.	TH	III

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preis- gruppe
Rosen-Sorten (Fortsetzung):			
Hn	Elvira Aramayo (<i>Looymans</i> 1922) Blumen in der Art wie „Mad. Edouard Herriot“ in Farbe, doch mehr leuchtender kupfrigrot und besser gefüllt. Pflanze aufrecht, gesund und ausserordentlich reichblühend.	TH	III
Hn	Etoile de Hollande (<i>A. H. Verschuren</i> 1919) Blumen gross, edel geformt, sehr haltbar, schön duftend, dunkelbis blutrot, herrliche Farbe; Pflanze vollständig krankheitsfrei, ungeheuer reichblühende Schnitt- und Gruppenrose.	TH	II
Hn	Eugen Fürst (<i>Souper & Notting</i> 1876) Blumen gross, haltbar, gefüllt, dunkelblutrot. Herbstblüher.	R	I
n	Farbenkönigin (<i>Hinner</i> 1902) Blumen gross, rundlich gefüllt, leuchtend rosarot, Knospe lang, sehr reichblühend.	TH	I
n	Fisher and Holmes (<i>E. Verdier</i> 1866) Blumen mittelgross, gefüllt, willig aufblühend, spitz, leuchtend scharlachrot, Massenschnitt- und Treibrose.	R	I
Hn	Frank W. Dunlop (<i>John H. Dunlop</i> 1919) Blumen in der Art der „Mrs. Ch. Russell“, kräftig rosarot, sehr gross, von idealer Form, lange haltend.	TH	II
Hn	Frau Ida Münch (<i>Münch & Hauffe</i> 1917) Blumen gut mittelgross, langgestielt, edel, stets aufblühend, haltbar, hellzitronengelb bis schwefelgelb. Gesunde Schnittrose.	R	I
Hn	Frau Karl Druschki (<i>P. Lambert</i> 1901) Blumen sehr gross, edler Bau, haltbar, gefüllt, blendend reinweiss, Knospe leicht rosa überhaucht. Weibrose für Schnitt und Treiberei.	R	II
Hn	Freiburg II (<i>Dr. Krüger</i> 1917) Blumen gross, gut gefüllt, edel, haltbar, langgestielt, innen weisslichrosa, aussen pfirsichrosa. Reichblühende Schnitt- und Gruppenrose mit bestem Herbstflor.	TH	II
n	Fürst Leopold IV. zu Lippe (<i>Kiese & Co.</i> 1918) Blumen gross, gefüllt, auf sehr langen Stielen, samtig blutrot, stark und aufrecht wachsend.	R	I
Hn	General Jacqueminot (<i>Roussel</i> 1853) Blumen halbgefüllt, haltbar, wetterfest, blendend feurigrot, aufrecht, starkwachsend.	R	I
Hn	General Mac Arthur (<i>J. G. Hill</i> 1905) Blumen gut gefüllt, haltbar, leuchtend blutrot, hervorragende Gruppen- und Schnittrose.	TH	II
n	General Smuts (<i>G. A. van Rossem</i> 1922) Blumen kirschrot mit Korallenrot. Gute Gruppenrose, spitze Knospen, starker, aufrechter Wuchs.	TH	II
Hn	General Superior Arnold Janssen (<i>Leenders</i> 1912) Blumen gross, herrlich geformt, gefüllt, haltbar, langgestielt, karminorangerot bis rosa, willig aufblühend, Laub gesund, rot gerandet und mit rotem Mittelnerv.	TH	II
Hn	Georg Arends (<i>Hinner</i> 1910) Blumen gross, spitz, haltbar, rein zentifolienrosa, langgestielt, duftend. Laub schön und gesund.	R	I
Hn	George Dickson (<i>A. Dickson & Sons</i> 1913) Blumen riesig gross, gefüllt, dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung.	R	I
Hn	Gladys Holland (<i>Sam Mc. Gredy & Sons</i> 1916) Blumen sehr gross, voll gefüllt, stets aufblühend, haltbar, leicht rosa, orange und gelb getönt, reichblühend. Laub gesund.	TH	I
Hn	Gloire de Dijon (<i>Jacotot</i> 1853) Blumen gross, gefüllt, goldgelb, rosa schattiert, willig öffnend, köstlicher Duft, rankend, hart.	T	I
Hn	Gloire de Hollande (<i>H. A. Verschuren</i> 1919) Blumen sehr gross, gut gefüllt, tadellose Form, gut haltbar, stets öffnend, schwärzlich schattiert rot, starker, vielverzweigter, aufrechter Wuchs. Prachtrose.	TH	II
Hn	Golden Emblem (<i>Sam Mc. Gredy & Sons</i> 1917) Blumen sehr gross, ausgezeichnet gefüllt, von tadellosem Bau, rein zitronen-sonnengelb. Stets dankbarer Blüher.	TH	II
Hn	Golden Ophelia (<i>B. R. Cant & Sons</i> 1918) Blumen von hochedler Becherform, meist einzeln auf sehr langen Stielen, ganz rein goldgelb, auch im Herbst dankbar blühend.	TH	II

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preisgruppe
	Rosen-Sorten (Fortsetzung):		
H n	Gorgeous (<i>H. Dickson</i> 1916) Blumen sehr gross, gut gefüllt, dunkel orange-gelb, kupfriggelb angehaucht mit kupferroten Adern, wertvolle, haltbare Blume.	TH	II
H n	Gruss an Teplitz (<i>Geschwind</i> 1898) Blumen in Büscheln, mittelgross, feurig scharlachzinnoberrötlich, Laub gesund, rötlich. Weithin leuchtende Gruppenrose von köstlichem Duft.	TH	I
n	Gruss an Zweibrücken (<i>P. Lambert</i> 1916) Blumen gross, breite Petalen, rein dunkelrot, stets einzeln, langgestielt, kräftig, schön belaubt, krankheitsfrei.	TH	I
n	Gustav Grünerwald (<i>P. Lambert</i> 1903) Blumen gut gefüllt, Knospe spitz, gut öffnend, leuchtend karminrosa, innen gelblich, nach aussen heller, Laub gesund, lederartig, glänzend dunkelgrün.	TH	I
H n	Hadley-Rose (<i>E. G. Hill</i> 1914) Blumen sehr gross, edel, vorzüglich gefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, stets öffnend, haltbar, duftend, Wuchs stark, langtriebzig, Laub gross, krankheitsfrei.	TH	II
H n	Harry Kirk (<i>A. Dickson & Sons</i> 1908) Blumen recht gross, halbgefüllt, rein hellgelb, haltbar, starkstielig, Pflanze stark bewehrt, grosses Laub.	TH	I
H n	Hawthorn Scarlet (<i>A. Dickson & Sons</i> 1920) Blumen halbgefüllt, Art wie „Red Letter Day“ feurig-scharlach, überreich blühend.	TH	III
H n	H. E. Richardson (<i>H. Dickson</i> 1914) Blumen mittelgross, halbgefüllt, brennendrot, schwarz schattiert, ausserordentlich feurige Farbe, sehr blühbar, haltbar, auf guten Stielen, Pflanze stark, Laub gesund, auf leichten Böden überreich blühend.	R	I
H n	Hermann Neuhoﬀ (<i>Herm. Neuhoﬀ</i> 1923) Blumen gross, edel, auf kräftigen, langen Stielen, samtartig, schwärzlich schattiertes Dunkelrot, auffallend angenehmer Duft, Laub rötlich und gesund.	TH	III
n	Hermosa (<i>Marchesau</i> 1840) Leuchtend rosa, sehr reichblühend.	M	I
H	Herzogin Marie Antoinette (<i>Jacobs</i> 1911) Blumen ausgezeichnet gebaut, gefüllt, satt goldiggelb, haltbar, duftend, Pflanze wüchsig, reichblühend. Vorzügliche Hochstammrose.	TH	I
n	Horace Vernet (<i>Guillot</i> 1867) Blumen recht gross, fest gefüllt, schön gebaut, gut aufblühend, karminrot, dunkelrot schattiert, haltbar.	R	I
n	Hortulanus Budde (<i>H. A. Verschuren</i> 1919) Blumen recht gross, gefüllt, unerreicht feurig-orangerot, gelblich getönt, gut aufblühend, haltbar, sehr reichblühende Beetrose.	TH	I
H n	Hortulanus Fiet (<i>H. A. Verschuren</i> 1919) Blumen sehr gross, goldgelb, ohne jeden Nebenton, haltbar, langgestielt, starkwachsend, herrlich glänzendes Laub, Schnitt- und Gruppenrose.	TH	I
H n	Hugh Dickson (<i>H. Dickson</i> 1905) Blumen gross, gefüllt, gut geformt, leuchtend feurigrot, stark wachsend, gesundes Laub, dankbar blühend.	R	I
n	J. F. Barrie (<i>Piper</i> 1914) Blumen rein sonnengelb, ohne jeden Nebenton, empfehlenswerte Gruppensorte. Feiner Kontrast zum Laub.	TH	I
H n	J. G. Glassford (<i>H. Dickson</i> 1921) Blumen riesig-gross, Art wie „George Dickson“, gefüllt, haltbar, schwärzlichrot, duftend, fast an jedem Trieb blühend.	R	II
H n	Jonkheer J. L. Mock (<i>Leenders</i> 1909) Blumen gross, gefüllt, aussen karminrosa, innen weiss, gut duftend, einzeln, langgestielt, edel, farbenfest, schönes rotgerandetes Laub.	TH	I
n	Jules Tabart (<i>Barbier</i> 1925) Blumen schön, sehr gross, gefüllt, rosa mit silbrig lachsartigem Schein und korallig kupfernem Zentrum. Kräftig wachsende Rose mit grosser Belaubung. Knospe lang, rosa mit chinesischem, lachsartigem Anflug.	TH	III
n	Juwel (<i>Hinner</i> 1910) Blumen sehr gross, schön gebaut, rahmweiss, auf festem Stiel, duftend.	TH	I

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preis- gruppe
	Rosen-Sorten (Fortsetzung):		
n	Kaiserin Auguste Victoria (<i>Lambert</i> 1890) Blumen gross bis sehr gross, dicht gefüllt, rahmweiss, nach der Mitte zu etwas dunkler, sehr wohlriechend.	TH	II
H n	K. of K. (<i>Kitchener of Karthoum</i>) (<i>A. Dickson & Sons</i> 1917) ... Blumen halbgefüllt, samtartig scharlachrot.	TH	I
n	Kynast (<i>Dr. Krüger</i> 1917) Blumen gross, gefüllt, langstielig, glühend dunkelrot mit samtartigem Schein, haltbar.	TH	I
H n	Lady Ashtown (<i>A. Dickson & Sons</i> 1895) Blumen sehr gross, silbrigrosa auf gelbem Grunde, edel gebaut, sehr blühbar.	TH	I
H n	Lady Greenall (<i>A. Dickson & Sons</i> 1911) Blumen sehr gross, gefüllt, gut gebaut, safranorange-gelb, auf langem, kräftigem Stiel, haltbar, Laub rötlich, gesund. Reichblühende Schnittrrose.	TH	I
H n	Lady Hillingdon (<i>Lowe & Shawyer</i> 1910) Blumen gross, gefüllt, haltbar, langstielig, dunkelorange-gelb, gesund, reichblühend das ganze Jahr hindurch, schönes rotes Laub.	T	II
H n	Lady Inchequin (<i>Al. Dickson</i> 1922) Blumen gross, Knospe gross und spitz, gut gefüllt, leuchtend kirschrot, orange schattiert, seltene, auffallende Farbe.	TH	II
n	La France (<i>Guillot</i> 1868) Blumen gross, gefüllt, silbrigrosa mit Fleischfarben, haltbar, typische Form, kräftig, reichblühend.	TH	II
H n	Laurent Carlé (<i>Pernet-Ducher</i> 1907) Blumen sehr gross, Knospe lang, ziemlich gefüllt, schön gebaut, glänzend scharlachkarmin, einzeln, langstielig. Prima Schnitt- und Gruppenrose.	TH	II
n	Le Progrès (<i>Pernet-Ducher</i> 1904) Blumen recht gross, gefüllt, haltbar, rein goldgelb ohne Nebenfärben, ausserordentlich reichblühend, wirkungsvoll. Wuchsgedungen.	TH	I
n	Leuchtfleur (<i>H. Kiese</i> 1909) Blumen gross, gefüllt, leuchtend blutrot, herrlicher Geruch, 40—45 cm hoch, den ganzen Sommer mit Blüten bedeckt.	M	I
H n	Lieutenant Chauré (<i>Pernet-Ducher</i> 1910) Blumen recht gross, ziemlich gefüllt, dunkelblutrot, nicht blauend, gut gestielt, Laub gesund. Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.	TH	I
H n	Lillian Moore (<i>H. Dickson</i> 1917) Blumen gross, gut gefüllt und haltbar, offen noch sehr schön, dunkelgelb. Wuchs gedungen, reichblühend, Laub ganz gesund.	TH	I
H n	Lord Charlemont (<i>Sam Mc. Gredy & Sons</i> 1922) Blumen gross, vorzüglich geformt, haltbar, leuchtend blutrot bis karminrot, nie verblauend oder verbrennend. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.	TH	III
H n	Los Angeles (<i>Howard & Smith</i> 1918) Blumen sehr gross, rosige-feuerrot mit korallenroten und goldgelben Schattierungen im Grunde, köstlich duftend.	TH	III
n	Louise Baldwin (<i>Sam Mc. Gredy</i> 1919) Blumen lebhaft orange-gelb, zartaprikosengelb nuanciert.	TH	I
n	Louise Catherine Breslau (<i>Pernet-Ducher</i> 1912) Blumen sehr gross, sehr gut gefüllt, haltbar, gut aufblühend, rein kupferrotgelb, ganz aparte Farbe, schönes, kräftiges, hellgrünes Laub, willig blühend.	TH	II
H n	Louise Criner (<i>C. Chambord</i> 1919) Blumen ganz reinweiss mit rahmfarbener Mitte.	TH	II
H n	Ludwig Möller (<i>Kiese & Co.</i> 1915) Blumen gross bis sehr gross, edel, gut gefüllt, rein dunkelgelb, nicht verblauend, gut aufblühend, gesundes, grosses, glänzendes Laub.	R	I
n	Lui-se Lilia (<i>Lambert</i> 1913) Blumen ziemlich gross, gut gebaut, haltbar, gefüllt, schwärzlich-blutrot, nie verblauend oder verbrennend, Pflanze blühwillig, Laub schön und krankheitsfrei, auffallend scharfgezähnt und zugespitzt.	TH	I
H	Lyon-Rose (<i>Pernet-Ducher</i> 1908) Blumen gross, gut gefüllt, Knospe rund, korallenrot auf langen, kräftigen Stielen, Blume kugelförmig, breite Petalen, chromgelb, Mitte korallenrot oder lachsfarben, Rand krebssrot. Auffallend, duftend, reichblühend.	TH	I
H n	Mabel Morse (<i>Sam Mc. Gredy & Son</i> 1922) Blumen gross, eiförmig in der Art wie „Golden Emblem“, jedoch ganz rein sonnengelb ohne Nebenschattierungen, Pflanze wüchsig, aufrecht, gesundes Laub, auffallende Farbensönheit.	TH	II

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preisgruppe
Rosen-Sorten (Fortsetzung):			
H	Madame Abel Chatenay (<i>Pernet-Ducher</i> 1895) Blumen gut gefüllt, karminrosa, mattzinnoberfarben und salmfarben schattiert. Gruppen- und Schnittrrose.	TH	I
Hn	Madame Alexandre Dreux (<i>Souper & Notting</i> 1921) Blumen mittelhoch, goldgelb mit rot, Pflanze starkwüchsig.	TH	II
Hn	Madame Butterfly (<i>E. G. Hill & Co.</i> 1918) Blumen gross, edel, kräftig, gross mit aprikosen und goldgelben Tönen.	TH	II
Hn	Madame Caroline Testout (<i>Pernet-Ducher</i> 1890) Blumen gross, gefüllt, seidenartig fleischfarbig, Mitte feuriger, Rand rosa umsäumt. Vorzügliche Treibsorte. Prachtrose.	TH	I
n	Madame Charles Lutand (<i>Pernet-Ducher</i> 1912) Blumen gross, recht gefüllt, sehr haltbar, orange-gelb, rötlich schattiert, gesund.	TH	I
n	Madame Colette Martinet (<i>Pernet-Ducher</i> 1915) Blumen mittelhoch, gefüllt, tief goldgelb mit orange-gelben Schattierungen. Pflanze gesund, willig blühend, ziemlich niedrig im Wuchs, für Schnitt und Gruppen.	TH	I
Hn	Madame Edouard Herriot (<i>Pernet-Ducher</i> 1914) „The Daily-Mail-Rose.“ Blumen halbgefüllt, becherförmig, haltbar, selbst vollständig geöffnet noch sehr schön, kupfer- oder tangerot. Wuchs kräftig, gesund, frosthart, sehr reichblühend.	TH	II
Hn	Madame Jules Bouché (<i>Croibier</i> 1910) Blumen mittelhoch bis gross, gefüllt, sehr haltbar, blendend reinweiss, zuweilen auf kupfergelbem Grund, reichblühend, langstielig. Schnitt- und Treibrose.	TH	II
Hn	Madame Jules Grolez (<i>Guillot</i> 1887) Blumen gross, gefüllt, sehr gut gebaut, lebhaft chinesisch-rosa bis leuchtend kirschrot, Laub rot, für Gruppen und Schnitt.	TH	I
n	Madame Léon Pain (<i>Guillot</i> 1897) Blumen edel, spitz, gefüllt, sehr haltbar, karmin- bis hellrosa auf braunem und goldgelbem Grunde, sehr reichblühend, Laub rot. Guter Herbstblüher.	TH	I
Hn	Madame Maurice de Luze (<i>Pernet-Ducher</i> 1904) Blumen sehr gross, gefüllt, Petalen breit, Knospe schön, sehr kräftig karminrosa ohne Nebenfarben, reichblühend. Ausstellungs- und Schnittrrose.	TH	I
Hn	Madame Ravary (<i>Pernet-Ducher</i> 1900) Blumen mittelhoch, halbgefüllt, leicht aufblühend, orange-gelb, gesund und reichblühend das ganze Jahr. Hervorragende Gruppenrose für Massenwirkung.	TH	I
Hn	Madame Segond Weber (<i>Souper & Notting</i> 1908) Blumen becherförmig gefüllt, ganz offen noch sehr schön, lachsrosa, das ganze Jahr über vollblühend. Gruppen- und Treibrose.	TH	I
n	Madame Victor Verdier (<i>E. Verdier</i> 1863) Blumen recht gross, gefüllt, gut aufblühend, glänzend kirsch-rosarot, duftend.	R	I
n	Maman Cochet (<i>Sc. Cochet</i> 1892) Blumen fleischfarbig-rosa, hellkarmin verwaschen, mit salmfarbig nankinggelb vermischt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig, von edlem Bau.	T	II
Hn	Maréchal Niel (<i>Pradel</i> 1864) Blumen sehr gross, typisch edler Bau, gefüllt, köstlich duftend, leuchtend schwefelgelb, in heissen, sonnigen Lagen leicht kupfrig, Laub gross, glänzend hellgrün, wüchsig. Winterschutz!	T	II
Hn	Margret Dickson Hamill (<i>A. Dickson & Sons</i> 1915) Blumen gross, gefüllt, aufrecht auf langem, steifem Stiel, dunkel-orange-gelb, gut nachblühend, schön rötlich und gesund belaubt.	TH	I
Hn	Marie Adélaïde (<i>Souper & Notting</i> 1913) Blumen gross, gefüllt, vorzüglich gebaut, dunkelorange-gelb, ocker-gelb durchleuchtet, sehr reichblühend, gut gestielt, gesund.	TH	I
Hn	Marie Baumann (<i>Baumann</i> 1864) Blumen gross, rundlich, haltbar, willig aufblühend, dunkelrot, reichblühend, gesund.	R	I
n	Marie van Houtte (<i>Ducher</i> 1872) Blumen sehr gross, edel, gefüllt, haltbar, langsam doch gut aufblühend, gelblich weiss, Ränder der Petalen lebhaft rosa, duftend, reichblühend, wertvolle Schnittrrose.	T	II
Hn	Melody (<i>A. Dickson & Sons</i> 1911) Prächtige Rose, safran- bis niegelb, sehr wüchsig, schön bereifte, kräftige Stiele.	TH	II

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preisgruppe
	Rosen-Sorten (Fortsetzung):		
Hn	Miss C. E. van Rossem (<i>H. A. Verschuren</i> 1919) Blumen überaus zahlreich das ganze Jahr hindurch, schwärzlich-rot, Laub vollständig krankheitsfrei, Gruppensorte.	TH	II
Hn	Miss Willmott (<i>Sam Mc. Gredy & Sons</i> 1907) Blumen gross, perlmutterweiss, im Grunde zitronengelb, die umgelegten Petalen leicht rosa überhaucht, Laub gross, dunkelgrün, kräftiger Wuchs.	TH	II
Hn	Mrs. Aaron Ward (<i>Pernet-Ducher</i> 1907) Blumen mittelgross bis gross, haltbar, dunkelgelb, fleischweiss beleuchtet, reichblühend, besonders noch im Herbst. Gruppen- und Topfroze.	TH	I
Hn	Mrs. Beckwith (<i>Pernet-Ducher</i> 1922) Blumen rein goldgelb, ohne Nebenton, sehr lang und stark gestielt, gefüllt, sehr haltbar.	TH	III
Hn	Mrs. Calvin Coolidge (<i>F. R. Pierson</i> 1924) Blumen ziemlich gross, haltbar, dunkelgoldgelb, in orangegelb übergehend, im Verblühen heller werdend. Guter, aufrechter Wuchs, langgestielte Blumen, Laub krankheitsfrei.	TH	III
Hn	Mrs. Charles Lamplough (<i>Sam Mc. Gredy</i> 1920) Blumen gross, sehr edel, milchweiss, wüchsig. Sehr wertvolle Gruppen-, Schnitt- und Treibrose.	TH	III
Hn	Mrs. Charles Russell (<i>Waban Rose Conservatories</i> 1913) Blumen sehr gross, sehr gut gefüllt, langsam aufblühend, über 14 Tage haltend, nie verregnend oder verbrennend, nie Farbe verlierend, kräftig karminrosarot oder hellrot ohne Nebenton, duftend, gesund, kräftige, einblumige Stiele. Für Haustreiberei.	TH	I
Hn	Mrs. Courtney Page (<i>Sam Mc. Gredy & Sons</i> 1923) Blumen ziemlich gross, genügend gefüllt, von vorzüglicher Form, orangerot mit karmin, Pflanze wüchsig und willig blühend.	TH	III
n	Mrs. Edward Powell (<i>Bernaix</i> 1910) Blumen halbgefüllt, haltbar, rein meteorrot, sehr leuchtend. Pflanze vollständig gesund, wüchsig, reichblühend.	TH	I
Hn	Mrs. George Shawyer (<i>Lowe & Shawyer</i> 1911) Blumen sehr gross, gut gefüllt, glänzend hellrosa bis karmin, willig erblühend, reichblühende Treibrose von edler Form.	TH	II
Hn	Mrs. Henry Bowles (<i>Chaplin Brothers</i> 1921) Blumen hochedel, rein korallenrosa, gut gestielt, wertvolle Farbe.	TH	II
Hn	Mrs. Henry Morse (<i>Sam Mc. Gredy</i> 1919) Blumen gross, haltbar, auf langen Stielen, rosa, zinnoberrot schattiert.	TH	I
Hn	Mrs. Henry Winnet (<i>Dunlop</i> 1919) Blumen gross, leuchtend scharlachrot, gut gefüllt.	TH	III
Hn	Mrs. Herbert (<i>Stevens Sam Mc. Gredy</i> 1910) Blumen langgestreckt, halbgefüllt, doch gut haltbar, blendend reinweiss, langstielig, reichblühend.	TH	II
Hn	Mrs. John Laing (<i>Bennet</i> 1888) Blumen gross, edel, gute Stiele, hellrosarot, willig blühend, Schnitt- und Treibrose.	R	II
n	Mrs. Joseph Hill (<i>Pernet-Ducher</i> 1904) Blumen sehr gross, gefüllt, von guter Form, Knospe lang, lachsrosa, gelblich schattiert, kupfrig-orangerosa Mitte, reichblühend, duftend. Wuchs gut.	TH	I
Hn	Mrs. S. K. Rindge (<i>Howard & Smith</i> 1920) Blumen sehr gross, nicht zu sehr gefüllt, in der Knospe lange haltbar, rein sonnengelb ohne jeden Nebenton. Pflanze ungemein reichblühend, vollständig krankheitsfrei. Herbstschnittrose.	TH	II
Hn	Mrs. Wemyss Quin (<i>A. Dickson & Sons</i> 1914) Blumen mittelgross, gut gebaut, Knospe fest, rundlich, rein sonnengelb, lange Triebe mit glänzend braunem Laub.	TH	I
Hn	Mrs. William C. Egan (<i>Howard & Smith</i> 1922) Blumen gross, edel, seidenartig silbrigrosa, aussen meist etwas dunkler, Treib- und Schnittrrose.	TH	II
Hn	Nelly Verschuren (<i>H. A. Verschuren</i> 1908) Blumen sehr gross, hochedel, lichtgelb bis sonnengelb, bei dunklem Laub.	TH	II
Hn	Ophelia (<i>Paul & Son</i> 1912) Blumen gefüllt, zartfleischweiss, rot angehaucht, haltbar, gut durchblühend, wüchsig und gesund im Laub.	TH	II

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preisgruppe
Rosen-Sorten (Fortsetzung):			
H n	Padre (<i>B. R. Cant</i> 1920) Blumen ziemlich gross, kupfrigrosa, aussen goldgelb durchleuchtet, Wuchs kräftig.	TH	II
n	Paula Clegg (<i>Kiese & Co.</i> 1912) Blumen ziemlich gross, haltbar, gefüllt, auf schönen Stielen, reichblühend, blutrot bis schwärzlichrot, schönes Laub.	R	I
H n	Paul Neyron (<i>Levet</i> 1869) Blumen riesig gross, gutgefüllt, gut öffnend, lange, steife Stiele, auch voll erblüht noch sehr schön, rein rosenrot, Wuchs stark, Laub gesund.	R	I
H n	Pharisäer (<i>Hinner</i> 1901) Blumen nur halbgefüllt, gross, gut öffnend, haltbar, fleischrosa, weisslich durchflossen, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, langgestielt. Junges Laub rot.	TH	II
H n	Président Chérioux (<i>Pernet-Ducher</i> 1922) Blumen gross und haltbar, krabbenrot mit korallenroter Mitte auf goldgelbem Grund. Pflanze starkwachsend, aufrecht, Laub gesund.	TH	II
H n	Preussen (<i>M. Löbner</i> 1920) Blumen gross bis sehr gross, vorzüglich gefüllt, edel, rein dunkelrot ohne Nebenfarben, nie verblauend oder verbrennend, Wuchs stark, Belaubung grün, gesund. Treibrose.	TH	II
H n	Prince Camille de Rohan (<i>E. Verdier</i> 1861) Blumen gefüllt, voll erblüht noch sehr schön, schwarzrot mit samtartigem Schein, eine der schwärzesten Rosen, sehr reichblühend.	R	I
H n	Prince de Bulgarie (<i>Pernet-Ducher</i> 1901) Blumen gross, langsam und sicher aufblühend, sehr haltbar, fleischweiss, karminrot schattiert, zuweilen mehr goldgelbe Töne dabei, stets schöne Farbe, reichblühend, mit gesundem Laub.	TH	I
n	Radiance (<i>Cook</i> 1909) Blumen halbgefüllt bis gutgefüllt, aussen karminrosa, innen weisslichrosa, gut aufblühend, haltbar, langstielig, gesundes Laub. Starkwüchsige Schnittrose besonders für Herbst.	TH	I
n	Raymond (<i>Pernet-Ducher</i> 1917) Blumen ziemlich gross, vollgefüllt, kupfrig- und rötlichorange, haltbar, geöffnet besonders schön, gesund belaubt, Beetrose.	TH	I
H	Rayon d'or (<i>Pernet-Ducher</i> 1910) Blumen im ersten Flor sehr gross und sehr gefüllt, später mittelgross, leicht aufblühend, voll erblüht noch prächtig, rein satt sonnen-gelb, an den äusseren Petalen kapuzinerbraunrot. Laub herrlich glänzend.	TH	I
n	Red Cross (<i>A. Dickson & Sons</i> 1916) Blumen leuchtend blutrot, sehr feurig, nie blauend oder verbrennend. Wuchs kräftig. Blüten leicht halbgefüllt.	TH	I
H n	Red Letter Day (<i>A. Dickson & Sons</i> 1914) Blumen leicht aufblühend, halbgefüllt, Knospe besonders im Herbst sehr schön, feurig blutrot, schwärzlich schattiert, haltbar, langstielig, voll erblüht sehr schön, mattrotes, bereiftes Laub.	TH	I
H n	Red Star (<i>H. A. Verschuren & Sons</i> 1919) Blumen enorm gross, offen fast 15 cm Durchmesser, genügend gefüllt, haltbar, auffallend leuchtend feuerrot. Pflanze gesund und blühwillig.	TH	II
n	Reims (<i>Barbier & Cie.</i> 1923) Blumen gross bis sehr gross, Petalen breit, Blume vom Aussehen einer Kamelie. Fleischfarbigrosa, am Rande gelb, Zentrum nanking, lebhaft feurig schattiert oder aprikosenkupfrig, sehr blühwillig, Wuchs kräftig, hart. Schnitt- und Gruppenrose.	TH	III
n	Reine Marie-Henriette (<i>Levet</i> 1879) Blumen gross, gefüllt, herrlich kirschrot, ausserordentlich wüchsig und früh- und reichblühend.	T	I
H n	Reinhard Bäder (<i>W. Kordes</i> 1918) Blumen riesengross, gutgestielt. Rayon-d'or-farbene Druschki.	TH	I
n	Rodophile Gravereaux (<i>Pernet-Ducher</i> 1905/06) Blumen einfach, schön karminrosa mit gelbem Stern in der Mitte beim Aufblühen, später weiss werdend, lange und reichblühende Säulenrose.	TH	I
n	Roger Lambelin (<i>Vve. Schwartz</i> 1891) Blumen mittelgross, fast gefüllt, samtartig, karmin-johannisbeerrot, rein weiss und hellrosa gefleckt. Eigentümliche Sorte.	R	I
H n	Rose Premier (<i>E. G. Hill & Co.</i> 1919) Blumen becherförmig, sehr edel gebaut, sehr gut gefüllt, auf guten Stielen, rein karminrosa bis dunkelrosa, reichblühend und krankheitsfrei.	TH	II

Form	Name, Züchter, Einführungsjahr und Beschreibung	Klasse	Preisgruppe
	Rosen-Sorten (Fortsetzung):		
H n	Ruth (<i>J. H. Pemberton</i> 1921) Blumen sehr gross, haltbar, satt goldgelb, leuchtend rot gestreift, Wuchs stark und gesund.	TH	II
H n	Sachsengruss (<i>Hoyer und Klemm</i> 1912) Blumen riesig, genügend gefüllt, sehr haltbar, langgestielt, zart fleischfarbigrosa auf weissem Grunde. Pflanze glattholzlig mit schönem Laub.	R	II
n	Schön-Ingeborg (<i>H. Kiese</i> 1922) Blumen gross, langgestreckt, zart pfirsichrosa, Mitte frisch leuchtend rosa, langstielig, Wuchs kräftig, Laub gross.	R	II
n	Senorita Carmen Sert (<i>Pernet-Ducher</i> 1916) Blumen gutgefüllt, schön gebaut, orangegelb mit kupfrigem Schein, haltbar, Belaubung gesund.	TH	I
H n	Sensation (<i>Joseph H. Hill & Co.</i> 1924) Blumen sehr gross, sehr gut gefüllt, gut öffnend, auf langen, kräftigen Stielen, scharlachkarmesinrot mit kastanienbraun und schwärzlich schattiert, in der Mitte dunkler und leuchtender. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend.	TH	III
H n	Souvenir de Claudius Pernet (<i>Pernet-Ducher</i> 1921) Blumen gross, vollgefüllt, haltbar, leuchtend „Rayon-d'or“-gelb, langstielig, Belaubung glänzend, gesund, Wuchs stark. Schnitt-, Treib- und Gartenrose.	TH	II
H n	Souvenir de Georges Beckwith (<i>Pernet-Ducher</i> 1920) Blumen gross, gutgefüllt, spitz, langsam und sicher aufblühend, sehr starke Stiele, krebserot, chromgelb nuanciert, Knospe krabbenrosa, orangegelb getönt, gut remontierend.	TH	II
H n	Souvenir de H. A. Verschuren (<i>H. A. Verschuren & Sons</i> 1922) ... Blumen sehr gross, auf sehr langen, starken Stielen, goldgelb, orange getönt, von guter Form und Haltung.	TH	III
n	Souvenir de la Malmaison (<i>Beluze</i> 1844) Blumen sehr gross, flach, sehr gefüllt, blassfleischfarbig, rötlich umsäumt, sehr duftig, Pflanze stark.	B	I
H n	Sovereign (<i>B. R. Cant & Son</i> 1922) Blumen kräftig goldgelb innen, aussen dunkelorange. Reichblühend, Laub gesund.	TH	III
H n	Sunburst (<i>Pernet-Ducher</i> 1911) Blumen recht gross, sehr gut gefüllt, herrlicher Bau, gut gestielt, sonnengelb, aussen heller, besonders in der aufbrechenden Mitte von herrlicher Farbe.	TH	I
H n	Sunstar (<i>A. Dickson</i> 1921) Blumen goldgelb, scharlachrot schattiert und gestreift.	TH	II
H n	Templar (<i>The Montgomery Compagny</i> 1924) Blumen gross, auf kräftigen Stielen aufrecht getragen, haltbar, stark duftend, gefüllt, von rein roter Farbe, Laub gesund.	TH	III
H n	The Queen Alexandra-Rose (<i>Sam. Mc. Gredy & Sons</i> 1918) Blumen kapuzinerrot, altgoid an der Rückseite der Petalen, im Grunde orange.	TH	II
H n	Toison d'or (<i>Pernet-Ducher</i> 1921) Blumen gross, edel, rein orangegelb, starkwachsend, reichblühend, Laub gesund.	TH	II
H n	Ulrich Brunner fils (<i>A. Levet</i> 1882) Blumen gross, willig aufblühend, kirschrot, langstielig, bekannte, wertvolle Treibrose.	R	II
H n	Una Wallace (<i>Sam. Mc. Gredy & Sons</i> 1921) Blumen hochedel, langstielig, weit leuchtend, kräftigrosa. Schnittrose.	TH	II
H n	Van Houtte (<i>Lacharme</i> 1864) Blumen dicht gefüllt, amarantfeuerrot, samtig schwarzkarmin schattiert	R	I
H n	W. C. Gount (<i>A. Dickson & Sons</i> 1917) Blumen mittelgross, gefüllt, haltbar, schwärzlichrot, sehr vollblühend.	TH	II
H n	W. E. Wallace (<i>H. Dickson</i> 1921) Blumen dunkelgelb und orangegelb, Gruppenrose.	TH	II
H n	Wilhelm Kordes (<i>Kordes' Söhne</i> 1922) Blumen gefüllt, hochedel, gut gestielt, kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde, im Verblühen mehr in Goldgelb mit Rot gestreift übergehend.	TH	III
n	Willowmere (<i>Pernet-Ducher</i> 1913) Blumen gross bis sehr gross, gut aufblühend, rosa, kupfrig- und goldgelb getönt, zuweilen reinrosa, sehr dankbar blühende Treibrose.	TH	I

Polyantha-Rosen.**Vielblumige Rosen**

(Die mit H bezeichneten Sorten sind auch hochstämmig veredelt vorrätig.)

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 45.—.**Hochstämme pro St. M. 2.75.****Ännchen Müller** (*J. C. Schmidt* 1907) H.

Einzelblüten gross, Dolden sehr gross, leuchtend korallenrosa, mässig gefüllt, 40—50 cm hoch.

Eblouissant (*Turbat & Cie.* 1918) H.

Feurig karminrot mit dunkler Schattierung, gedrunen, doch stark wachsend, sehr reichblühend.

Ellen Poulsen (*Poulsen* 1911).

Dolden kirschrot, gefüllt, ähnlich „Dorothy Perkins“, schöne, glänzende Belaubung.

Else Poulsen (*D. T. Poulsen* 1924). **Neuheit!** pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—.

Blumen in dichten Dolden, halbgefüllt, sehr gross, zartrosa, sehr haltbar.

Eva Teschendorff (*Teschendorff* 1923) H.

Schneeweisser Sport von „Echo“.

Frau Dr. Erreth (*Geduldig* 1916).

Blumen in Büscheln, gross, gut gebaut, gefüllt, dunkelgelb, im Verblühen heller, sehr reichblühend.

Frau Rudolf Schmidt (*R. Schmidt* 1919).

Blumen in lockeren Sträussen, feurig blutrot, schönste Farbe dieser Art, gesund, kräftig, bringt nie fehlerhafte Blüten.

George Elger (*Turbat & Cie.* 1912).

Blüten in Büscheln, hellgelb bis safrangelb. Winterschutz!

Gruss an Aachen (*Geduldig* 1909).

Grossblumige Polyantha-Hybride. Blumen riesig, bis 15 cm Durchmesser, gefüllt, Knospe herrlich dunkelgelb mit blutrot schattiert, Blume goldgelb, zuweilen weiss, vollständig geöffnet reinweiss. Blüht unaufhörlich, gesund und gut gebaut.

Jessie (*Merryweather* 1909).

Blumen in lockeren Sträussen, leuchtend rot, gefüllt, unaufhörlich blühend, Laub gesund.

Joseph Guy (*Nonin* 1921).

Blumen gross, ähnlich „Rödhätte“, scharlachrot, sehr haltbar, unermüdlich in grossen Dolden blühend.

Katharina Zeimet (*Lambert* 1901).

Blüten in Dolden, reinweiss ohne Nebenton, gutgefüllt, Laub gesund, wüchsig, unaufhörlich blühend.

Kirsten Poulsen (*D. T. Poulsen* 1924). **Neuheit!** pro St. M. —.80, 10 St. M. 7.—.

Blumen ganz einfach, gross, purpurrot, haltbar.

Lady Reading (*C. van Kleef & Co.* 1921).

Blumen leuchtend rot, rote „Ellen Poulsen“, mit gleichen, guten Eigenschaften.

Louise Walter (*Walter* 1909) H.

Blumen porzellanweiss, rosa geädert, dankbar blühend. Für Gruppen und Topftreiberei.

Madame Taft (*Levasseur* 1910).

Blüten in schönen Dolden, leuchtend rubinrot, reichblühend, gesund.

Marie Pâvic (*Alégatière* 1888).

Blumen gross, gefüllt, haltbar, weiss mit rosigem Hauch. Pflanze gesund, reichblühend.

Merveille des Rouges (*Dubeuil* 1910).

Blumen blendend samtig karminrot, Laub glänzend, sehr widerstandsfähig, meltauftreif, niedrig, prächtig zu Einfassungen.

Mrs. W. Cutbush (*Cutbush* 1907).

Blumen klein, gefüllt, in Dolden von 15—25 Blumen während des ganzen Jahres, zart rosa mit lachsfarbenem Schein, für Gruppen und Topfkultur.

Orléans-Rose (*Levasseur* 1909).

Blumen geranienrot, nach dem Rande karminrot, mit weissem Zentrum, grosse Dolden, straffe Stiele, grösser und lockerer als „Mad. Norbert Levasseur“. Wuchs kräftig, gesund, Belaubung hellgrün, 50—70 cm hoch.

Rödhätte = Rotkäppchen (*Poulsen* 1911).

Blumen sehr gross für die Art, mächtige Dolden, sehr haltbar, halbgefüllt, leuchtend rot. Pflanze kräftig, Laub schön, für Gruppen.

Rösel Dach (*L. Walter* 1907).

Blumen dicht gefüllt, gut über dem Laub, glänzend kirschrosa, nach aussen heller, Wuchs niedrig, gleichmässig.

Siegesperle (*Kiese* 1915).

Blumen rahmweiss, Wuchs und Blühwilligkeit wie „Louise Walter“. Einzelblüten pänienförmig, sehr geeignet für Binderei, gute Schnitt- und Gruppensorte.

Zentifolien-Rosen.**Rosa centifolia**

pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—.

Centifolia, gewöhnliche.

Rosa blühend.

Rose des Peintres.

Blumen rosa, Zentrum dunkler, sehr gross, gefüllt, duftig, Pflanze kräftig.

Unica (Unique blanche, White Provence) (Grimwood 1778).

Blumen mittelgross, gefüllt, milchweiss, schalenförmig, duftig.

Gestreifte Rosen (wurzelecht).**Rosa provincialis**

pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—.

Bella des Jardins (Guillot fils 1873).

Blumen purpurrot mit weiss gestreift, gross, gefüllt.

Charles Quint.

Blumen weiss bandiert, lilarosa gestreift.

Georges Vibert (Robert 1853).

Blumen purpur mit etwas violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt.

Kapuziner-Rosen.**Rosa lutea**

pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—.

Austrian Yellow (Gérard 1896).

Blumen reingelb.

Gottfried Keller (Dr. Müller 1902).

Holz, Wuchs und Laub = Lutea, gut remontierend, Blumen einfach, 7—10 Petalen, innen aprikosengelb bis goldgelb, aussen dunkelgelb, Rand heller, als Knospe besonders schön, duftend.

Harrisoni (Harrison 1830).

Blumen mittelgross, halbgefüllt, tief goldgelb, blüht früh und reich, dicht mit kleinen Stacheln besetzt.

Jaune bicolor = Wiener Rose, türkische Rose.

Blumen kapuzinergelb, Zentrum karmin oder kapuzinerbraun, mittelgross, einfach, Pflanze kräftig.

Lutea (Miller 1768).

Holz braun, mit meist geraden Stacheln, Blumen einfach gelb, winterhart

Parkfeuer (Lambert 1906) Lutea-Hybride.

Strauch vollständig winterhart, wird 4 m hoch und breit, Blumen mittelgross, einfach, glühend, glänzend scharlachrot.

Persian Yellow (Willock 1883) = Rosa persica lutea.

Blumen mittelgross, kugelförmig, halbgefüllt, dunkelgoldgelb, duftlos, Pflanze stark, hart, sehr leuchtend und reichblühend

Soleil d'Or (Pernet Ducher 1897) Lutea-Hybride.

Blumen gross, gefüllt, sehr wohlriechend, orange-goldgelb, kapuzinerrot schattiert. Strauch kräftig und vollständig winterhart.

Star of Persia (Rev. J. H. Pemberton 1919).

Blumen sattgelb mit tief goldgelben Staubgefässen, halbgefüllt, mit festen Petalen, hart, Pflanze mittelgross.

von Scharnhorst (J. Lambert 1921) Lutea-Hybride.

Blumen halbgefüllt, hellgoldgelb bis schwefelgelb, remontierend und vollblühend das ganze Jahr.

Moosrosen.**Rosa centifolia muscosa und Rosa muscosa bifera**

pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—.

Blanche Moreau (Moreau-Robert 1881) R. musc. bif.

Öfter blühend, Blumen reinweiss, gross, gefüllt, Knospe spitz, willig blühend, Pflanze sehr stark, büschelblühend, hart.

Cristata (Kirche 1827) (=Château de Napoléon).

Blumen gross, gefüllt, kugelförmig, rosa, Kelch kammförmig, sehr duftig, stark bemooste Rose.

Moosrosen (Fortsetzung):

- Deuil de Paul Fontaine** (*Fontaine* 1874) R. musc. bif.
Blumen gross, gefüllt, willig aufblühend, dunkelpurpur, feuerrot schattiert, Pflanze stark, remontiert stark.
- Docteur Marjolin** (*Robert & Moreau* 1860).
Blumen lebhaft rot.
- Eugénie Guinoisseau** (*B. Guinoisseau* 1864) R. musc. bif.
Blumen gross, gefüllt, kirschrot in Violett purpur übergehend. Remontierend.
- François de Salignac** (*Robert* 1854).
Blumen amarantrot mit rosa.
- Impératrice Eugénie** (*Guillot* 1856) R. musc. bif.
Blumen mittelgross, gefüllt, leuchtend rosa, Pflanze kräftig, remontierend.
- Julie de Mersan** (*Thomas* 1854).
Blumen schön purpurrosa.
- Madame Moreau** (*Moreau-Robert* 1873) R. musc. bif.
Blumen sehr gross, sehr gefüllt, zinnober, weiss gestrichelt, Pflanze stark, remontierend.
- Marbrée double.**
Blumen purpurviolett.
- Maréchal d'Avoust** (*Robert*).
Blumen lebhaft rot
- Marie de Blois** (*Robert* 1852).
Blumen bilarosa.
- Mousseline** (*Moreau-Robert* 1882) R. musc. bif.
Blumen gross, kugelförmig, willig blühend, leicht rosaweiss in Reinweiss übergehend. Remontierend.
- Mousseux anciens.**
Alte Moosrose.
- Mousseux Salet** (*Lacharme* 1854).
Blumen sehr gross, rosa, schön bemoost, remontiert schwach, Pflanze wüchsig, immerblühend.
- Nathalie** (*Vibert* 1849).
Blumen dunkelrosenrot.
- Nuit de Young** (*Laffay* 1845).
Blumen kastanienbraun bis purpurrot.
- Parmentier** (*Robert* 1851).
Blumen gefüllt, hellrosa.
- Reine des Mousseuses** (*Robert & Moreau*).
Blumen gefüllt, inkarnat, fleischfarbig.
- Soeur Marthe** (*Vibert* 1848).
Blumen rosa, Mitte dunkler.
- William Lobb** (*Laffay* 1856) = *Duchesse d'Istria* (*Portemer* 1856).
Blumen mittelgross, karmin-azurbläulich, gefüllt. Pflanze kräftig, Doldenblüher.

Rosa-rugosa-Hybriden.**Japanische Rose**

pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—.

- alba Hort.**
Blumen einfach, weiss, reichblühend, trägt noch grössere Früchte als die Stammform.
- Bergers Erfolg** (*Garteninspektor Berger*)
Blumen einfach, leuchtend rot, haltbar, Pflanze sehr blühwillig und wirkungsvoll.
- Carmen** (*Lambert* 1906).
Wuchs stark, dicht bestachelt, dunkelgrün, gesund, Blumen einfach, gross, leuchtend dunkelblutrot, remontiert bis zum Oktober, winterhart, Höhe bis 2 m.
- Conrad Ferdinand Meyer** (*D. Müller, Weingarten* 1900).
Vollständig winterhart, sehr stark bestachelt, remontierend, Blumen sehr gross, 10–12 cm Durchmesser, stark gefüllt, rein silbrigrosa, herrlicher Wohlgeruch.
- Kaiserin des Nordens** (*Regel*) = *Rosa rugosa rubra plena*.
Blumen gross, gefüllt, violett purpur, Pflanze stark, vollkommen winterhart.
- Madame Georges Bruant** (*Bruant* 1888).
Blumen gross, halbgefüllt, glänzend weiss, sehr duftend, langknospig, Pflanze sehr stark, doldig, reichblühend bis zum Frost, hart.
- Madame René Gravereaux** (*Gravereaux* 1907).
Blumen sehr gross, kelchförmig, sehr duftend, zartrosa, leicht violett angehaucht, Grund etwas gelblich, junges Laub rot, Knospe sehr dick, blüht den ganzen Sommer.
- Nova Zembla** (*Mees* 1906).
Blumen gefüllt, reinweiss, schöne Form, duftend, hart, starkwüchsig.
- Regeliana violacea.**
Blumen schön, lebhaft violett, winterhart, gefüllt.

Rosa-rugosa-Hybriden (Fortsetzung):**Roseaie de l'Hay** (Cochet-Cochet 1902).Blumen gross, fast gefüllt, dunkelrot, sehr duftend, Pflanze sehr stark, frühblühend.
rubra plena, siehe „Kaiserin des Nordens“.**Schneelicht** (Geschwind 1896).

Rankende Rugosa-Hybride. Blumen einfach, reinweiss, in Büscheln, reichblühend, sehr starker Wuchs.

Schneezwerg (Lambert 1912).

Blumen klein, in Dolden, blendend weiss, remontiert gut.

Souvenir de Philémon Cochet (Cochet-Cochet 1900).

Blumen sehr gross, gefüllt, weiss, im Zentrum leicht fleischfarben getönt, Pflanze sehr stark.

» **de Pierre Leperdrieux** (Cochet-Cochet 1895).

Blumen gross, gefüllt, weinrot.

» **de Yeddo** (Morlet 1874).

Blumen gutgefüllt, leuchtend karmin, hübsch gebaut, dankbar blühend, winterhart.

Schlingrosen.**Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben. Extra-Qualität:**
pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 45.—.**Aglaja** (P. Lambert 1896).Blumen in grossen Trauben, hellgelb, später rahmweiss, ziemlich gefüllt, teeartiger Duft.
Eine der „drei Grazien“.**Albertine** (Barbier & Cie. 1921).

Blumen gross, gefüllt, edelrosenähnlich, kupfriggelb.

Alice Garnier (Fauque & Fils 1907), Wichur.

Knospen und Blumen klein, sehr gefüllt, lebhaft rosa, gelb durchleuchtet, Rand hellrosa. Im Aufblühen Zentrum kupfrig, im Verblühen rosa bis weiss.

American Pillar (Conard & Cie. 1901), Wichur.

Einfache, sehr grosse, rein rosarote Blüten in grossen Dolden, Blumen 6–10 cm Durchmesser, prächtig gelbe Staubfäden, Laub glänzend.

Aviateur Blériot (Fauque & Fils 1910), Wichur.

Blumen edelrosenähnlich, gefüllt, tief safrangelb, in Dolden, Laub glänzend.

Carmine Pillar (G. Paul 1896), Wichur.

Einfache, sehr grosse, leuchtend karminrote Blumen in grossen Dolden. Starkwachsend, mit prächtigem Laubwerk, frühblühend.

Climbing-Arten, siehe unter „Rankende“.**Coronation** (Turner 1913), Wichur.

Leuchtende Dolden, karmin- oder scharlachrot, gefüllt, haltbare Blumen.

Crimson Rambler (Ch. Turner 1894).

Von Japan stammend, dort unter dem Namen „Soukara Ibara“ = „Kirschrose“ bekannt. Riesige, kirschrote Blütendolden, sehr stark rankend. Empfindlich gegen Meitau.

» **Rambler**, immerblühend (Gebr. Schultheiss 1909) = **Rambler Remontant** = **Flower of Fairfield** (Ludorf 1908).

Eine immerblühende „Crimson Rambler“. Gleicht der Stammsorte, nur mehr heller und leuchtender.

Danaë (Pemperton 1913).

Edelrosenähnlich, gefüllt, tief goldgelb, immerblühend.

Dorothy Perkins (Perkins 1902), Wichur.

Riesige Dolden, kirschrot-lachsrosa, gefüllt, Blumen sehr duftend, haltbar, sehr stark wachsend.

Elsie (Paul & Sons 1910), Wichur.

Blumen fleischfarbig, Mitte nelkenfarbig und dunkelrosa, sehr gross, hübsche Rosettenform aussergewöhnlich grosse Sträusse, lange in guter Form haltend, stark rankend.

Excellenz Kuntze (Lambert 1909).

Schwefelgelbe bis dunkelgelbe Dolden, kleinblumig, gefüllt, duftend, gut remontierend.

Excelsa (Walsh 1910), Wichur.

Sehr grosse Dolden, leuchtend dunkelblutrot, gefüllt, gute Treibrose.

Fragezeichen (Böttner 1910).

Sehr grosse Blumen, sattrosa mit helleren Schattierungen, grosse Dolden, gefüllt, reichblühend.

Fräulein Octavia Hesse (Herm. A. Hesse 1910), Wichur.

Edelrosenähnlich wie „Kaiserin“, sehr gross, weiss mit gelbem Schein, sehr stark rankend, herrliches Laub, köstlich duftend, Knospen besonders schön.

François Guillot (Barbier & Co. 1907), Wichur.

Reichblühend, Knospen gelblichweiss, 8–10 cm Durchmesser, milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb, manchmal halbgefüllt.

Frau Lina Strassheim (Strassheim 1907).

Grosse, schöne, feste, aufrechte Dolden, lange haltend, lachsrot und rosa, gefüllte Ramblerart, Säulenrose.

Fritz Reuter (Lambert 1913).

Blumen in Dolden, violettrosa mit gelbem Schein.

Schlingrosen (Fortsetzung):**Gartenstadt Liegnitz (Lambert 1911).**

Blumen in Dolden, purpurrot, als Einzelpflanze wie für Hecken.

Geisha (Geschwind-Lambert 1913).

Blumen sehr gross, gefüllt, leuchtend blutrot, einzeln oder zu dreien sehr reichlich erscheinend.

Grossherzogin Eleonore von Hessen (Strassheim 1907).

Blumen blutrot, mittelgross, gefüllt, Pflanzen sehr stark, Wuchs gedrungener als „Crimson Rambler“, grosse, aufrechte Dolden, später in Weinrot übergehend.

Gruss an Freundorf (Praskac 1903) Wichur.

Grosse Dolden, locker gebaut, gefüllt, haltbar, reichlich erscheinend, dunkelrot mit schwarzer Schattierung. Schwärzlichste der Wichuraiana-Klasse. Pflanze stark und gesund.

Helene (P. Lambert 1898).

Triebe von 4 m Länge, Blüten rein zart violettrosa auf karminrotem Grunde, 20—50 Blumen auf einem Büschel. Laub ähnlich „Crimson Rambler“. Frühblühend.

Hiawatha (H. Walsh 1906), Wichur.

Blumen einfach, blutrot mit heller Mitte, leuchtend, in Dolden, sehr schön, Wuchs kräftig.

Ida Klemm (Walter 1907).

Weisse Rambler. Grosse, dichtgebaute Rispe schneeweisser Blumen von langer Dauer, stark wachsend, gänzlich hart und sehr reichblühend.

Jacotte (Barbier & Cie. 1921).

Blüten in Büscheln von 4—10 Blumen, Knospen gelborange, mit kupfrigroter Tönung. Blumen gross, halbgefüllt, sahmkupfrig leuchtend auf safrangelbem Grund.

Jean Guichard (Barbier & Co. 1907), Wichur.

Knospen zinnoberrot und gelbrot, Blumen 7—8 cm Durchmesser, gefüllt, lachskarminrot.

Lady Gay (H. Walsh 1905).

Blumen kirschrosa, in fast weiss übergehend, Laub sehr reichlich, lederartig, dunkelgrün, hart, wüchsig.

Leuchstern (J. C. Schmidt 1899).

Blumen einfach, klein, leuchtend rosa mit grossem, weissem Auge, in Dolden. Wuchs und Belaubung wie „Crimson Rambler“, winterhart.

Madame Sancy de Parabère (Bonnet 1875).

Blumen mittelgross, rosa, Edelrosen ähnlich, gefüllt, leuchtend, glattholzlig, stachellos, reichblühend.

Minnehaha (Walsh 1913), Wichur.

Blumen in sehr grossen Dolden, gutgefüllt, leuchtend rosenrot, Pflanze äusserst stark rankend.

Mrs. F. W. Flight (Cutbush 1907).

Wuchs stark, ziemlich aufrecht, Blumen halbgefüllt, 4 cm Durchmesser, zu 20—30 in einer Dolde, glänzend rein nelkenrosa mit weisser Mitte. Sehr rankend und reichblühend.

Nymphe (Türke 1910).

Wuchs ziemlich stark, Laub wie „Maréchal Niel“, Blumen in Büscheln oder einzeln, duftend, reinweiss, runde Form, ähnlich einem Schneeball.

Paul's Scarlet Climber (W. Paul 1917), Wichur.

Pflanze sehr stark aufrechrackend, hart, gesund, Blüten halbgefüllt, feurig scharlachrot, nie blauend.

Purpurtraum (Kayser & Seibert 1921), Wichur.

Belaubung glänzend grün, Blumen gross, halbgefüllt, dunkelpurpurn, in mächtigen Dolden. Dunkelste aller Rankrosen.

Rankende Château de Clos Vougeot (H. Morse 1920).

Rankende Form der bekannten, schwarzroten Teehybridrose gleichen Namens.

Rubin (J. C. Schmidt 1899).

Braunrotes, stark bedornes Holz, dunkle, braungesäumte, unterseits rötlich schimmernde Belaubung, Blüten in lockeren Dolden, etwas grösser als „Crimson Rambler“, leuchtend rubinrot, vollkommen winterhart, ausserordentlich unempfindlich gegen Pilzkrankheiten.

Sodenia (Weigand 1911), Wichur.

Blumen in grossen Dolden, karminrot mit heller Aderung, haltbar, wüchsig, reichblühend.

Tausendschön (J. C. Schmidt 1907).

Blumen in grossen, lockeren Dolden, halbgefüllt, balsaminenartige, zartrosa Blumen, im Verblühen leicht karminrosa Tönung.

Trier (Lambert 1904).

Blumen in Dolden, halbgefüllt, rahmweiss, gelb getönt mit gelben Staubfäden, Pflanze stark, immerblühend.

Veilchenblau (J. C. Schmidt 1909).

Im Aufblühen rein rötlichlila oder veilchenblau, im Verblühen lila oder stahlblau, haltbar, kräftiger Wuchs, glänzend grüne Belaubung, wenig Bestachelung.

Wartburg (Kiese & Co. 1910).

Blumen gut gefüllt, gedrehte Petalen, karminrosa, Grösse wie „Crimson Rambler“, in grossen Dolden, reichblühend, Wuchs kräftig, Laub dunkelgrün, Triebe dornelos.

White Dorothy (B. R. Cant 1909), Wichur.

Blumen in Dolden, gefüllt, weiss, bisweilen mattrosa schattiert.

Trauerrosen.

Stammhöhe ca. 160—200 cm, pro St. M. 4.—, 10 St. M. 38.—,
in nachstehenden Sorten. Beschreibung siehe unter Schlingrosen.

Aglaja
Albertine
American Pillar
Crimson Rambler
» immerblühend
Danaë
Dorothy Perkins

Excelsa
Fragezeichen
Frl. Octavia Hesse
Hiawatha
Jacotte
Lady Gay
Minnehaha

Paul's Scarlet Climber
Purpurtraum
Rubin
Sodenia
Tausendschön
Whithe Dorothy

Niedrige botanische und Parkrosen.

Pro Stück M. —.70, 10 Stück M. 6.—, 100 Stück M. 50.—.

alba Madame Plantier (*Plantier* 1836).

Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, flach, Pflanze sehr stark, reichblühend.

alpina L.

Alpen-Zimtrose. Ziemlich starkwachsender Strauch, Blüte tiefpurpurkarmin mit weissem Zentrum, Staubblätter gelb, kranzförmig, Blüte 4—5 cm Durchmesser. Juni—Juli.

amblyotis Meyer, siehe *Rosa cinnamomea oxyodon*.

Beggeriana Schrenk, *R. anserinifolia*.

Breite Sträucher, sehr dornenreich, Blüten einfach, weiss, Laub, kleinblättrig graugrün.

Bergrose von Colorado.

Widerstandsfähige Rose, fast dornenlos, aber bis in die Spitze hinein mit dornenähnlichen Haaren besetzt, angenehm duftend.

californica fl. pl., siehe „Theano“.

canina caucasica.

Starkwachsend, im Erblühen herrlich rosarot, später blasser, Blüten zu zweien.

cinnamomea dahurica.

Mässig stark wachsend, mit schwachem, rotbraunem, kaum bewehrtem Holz. Belaubung frischgrün, 5—7 cm lang, 3—4paarig. Blumen einzeln, 1 cm gestielt, 3—4 cm Durchmesser, von leuchtend tiefkarminroter Färbung mit weisser Mitte. Staubfäden kurz.

» **oxyodon**, *R. amblyotis* Meyer.

Hochwachsender, reichblühender Strauch mit rotbraunem, schwach bewehrtem Holz. Blatt etwa 10 cm lang. Stiel mit roten Drüsenhaaren. Blumen zu zweien, 12 mm gestielt, Stiel mit feinen Stacheln und Drüsenhaaren besetzt, 6 cm Durchmesser, hellrosa mit dunkler Aderung, Anfang Juni.

coruscans Lk.

Schöne, harte Rose aus Turkestan.

damascena Madame Hardy.

Blume reinweiss, zuweilen mit grünem Zentrum, gross, flach, gefüllt.

» **mundi selfcoloured**.

Halbgefüllt, karmin.

Davidii Crépin (Wilson No. 1063).

Strauch bis 4 m Höhe, Blüten rosa, Juni.

» **var. elongata** Rehd & Wils. (Wilson No. 1126).

Busch 3 m hoch, blüht etwas spärlicher, Früchte länger.

Fargesii.

Ähnlich „Rosa Moyesi“, jedoch Blätter glänzend tiefdunkelgrün, Triebe braunrot, Blumen einfach becherförmig, samtig leuchtend dunkelkarminrot, leicht gekräuselt, Staubfäden bilden einen sehr zierenden Kranz, altgold. Früchte 4—7 cm lang, flaschenförmig, lebhaft scharlachrot, sehr zierend.

ferox Lindl.

Niedrige Rose des Kaukasus mit feiner Belaubung. Die grossen, bis 4 cm breiten, einfachen, weissen Blumen erscheinen von Juni bis August.

gallica Linné.

Essig- oder Apothekerrose, bis 1 m hoch, Zweige dicht bestachelt, Blüten einzeln, rotpurpurn, im Juni.

» **byzantina**.

Ölrose.

» **chlorocarpa**.

Ölrose.

Parkrosen (Fortsetzung):**gallica conditorum Dieck.**

Olrose.

» **grandiflora**

Starkwachsende Olrose, Wuchs leicht übergeneigt, Blumen einzeln oder zu mehreren, flach, 5petalig, 6–7 cm Durchmesser, leuchtend hell-tiefkarminrot.

Giraldii Crépín.

Kleine, lilarosa Blüten, einfach, sehr reichblühend.

gymnocarpa Nutt.

Bildet einen dichten, feinblättrigen, kleinen Strauch mit etwa 3 cm breiten, rosafarbenen Blüten im Juni.

Hugonis Hemsley.

Wertvoller Frühblüher, gelb, bis 1,5 m, Mai–Juni.

Jundzilli Bess.

Starkwachsend, Laub bis 7 cm gross, meist 2paarig gefiedert, scharf gesägt. Blumen einzeln, 10–12 mm gestielt, Kelch zurückgeschlagen, Blume 6 cm Durchmesser, schalenförmig, zart reinrosa mit heller, fast weisser Mitte, Staubbeutel ockergelb, bis 10 mm gestielt, kranzförmig, Frucht orangerot, länglich.

kamtschatica Vent. = R. rugosa kamtschatica Vent.

Strauch bis 2 m hoch, Holz dunkelbraun, wenig bewehrt, Blatt 5–7 cm lang, Blumen einzeln, 12–15 mm gestielt, 4–5 cm Durchmesser, purpurkarmin, Ende Mai–Juni.

laxa Retzius 1803.

Hell- bis graugrün belaubte Rose, wertvoll zur Unterlagenzucht. Sehr wüchsig.

lucida Ehrh. (caroliniana).

Hübsche Wildrose mit glänzend grüner Belaubung, rosa Blüten, reichblühend.

lutea-Hybriden, siehe gesonderte Zusammenstellung.**macrantha.**

Herzlich grossblumig, fast weisse Art, von bester Wirkung im Park, Blütezeit Juni–Juli.

macrophylla rubro-staminea.**manca Green.**

Wuchs niedrig, Laub glänzend, lackartig, einfach, reichblühend, weiss, Früchte sehr zierend.

micrantha Smith.

Bildet sehr hohe, dichte Sträucher mit überhängenden Zweigen, Blumen schön rosa, im Juni.

microphylla Roxburgh.

Blume einfach, rosa, Knospe eigenartig geformt, Pflanze sehr stark, birkenrindige Rose, Laub vielteilig, eigenartig schöne Art.

moschata Herm.

Bedeckt sich im Juni mit schwach halbgefüllten, hellrosafarbenen Blüten.

» **Duponti.**

Grossblumig weiss, einfachblühend.

Moyesii Hemsl. & Wils.

Prächtige Parkrose, Belaubung zierlich, lichtgrün, Triebe gelblichgrün, Blattstiele rot, Blüten einfach, platt tellerförmig, 10 cm Durchmesser, tiefsamtig scharlachrot, einzeln an kurzen Trieben, Blütenblätter fleischig, sehr reichblühend. Juni–Juli.

multibracteata Hemsl. & Wils.In Trauben blühend, rot, Früchte orangerot, bei schwachen Exemplaren einblütig, dann grosse Ähnlichkeit mit *R. Willmottiae*.**multiflora Thunb.**

Sehr reichblühende Art, kleine, weisse Blüten in pyramidalen Rispen.

nitida Willd.

Rotstachelige Rose, Blumen lebhaft dunkelrosenrot, bis 5 cm Durchmesser. Juni.

nutkana Presl.

Aufrechter Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht und im Juni reichen Flor grosser, rosafarbener Blüten bringt.

omeiensis var. atrosanguinea.

Besonders dunkelroter Austrieb.

» **var. polyphylla.**

Schön frischgrün belaubt.

omissa Déséglise.

Blume weinrot, halbgefüllt, etwas weiss gestreift. Juni. 4 cm Durchmesser.

pimpinellifolia Stanwelliana perpetual.» **xanthina var. Allard.**

Sehr widerstandsfähige Art, grosse, zahlreiche Blumen, leuchtend dunkelgelb.

pisocarpa A. Gray.

Kräftig wachsende, amerikanische Art, welche im Juni mit zahlreichen, rosafarbenen Blüten bedeckt ist. Blüten meist zu vierten, Staubgefässe kranzförmig.

Parkrosen (Fortsetzung):**rubiginosa** Bradwardine.» **Lady Penzance.**

Kupfriggelb, einfach wie Jaune bicolor.

» **Lucie Ashton.**

Strauch hoch- und starkwachsend, dunkelgrün, Blumen zu mehreren, 4–5 cm Durchmesser, oft zweireihig, frischrosa mit weisser Mitte, Frucht scharlachrot.

» **magnifica** Hesse.

Kräftig wachsend, buschig, bis 2 m hoch, dunkelgrün glänzende Belaubung, stark bewehrt, stark duftend. Blüten stark halbgefüllt, leuchtend karminrot mit goldgelben Staubfäden. Flor überreich von Anfang Juni bis Ende Juli.

» **Refulgence** (Paul & Sons 1908).

Blumen enorm gross, halbgefüllt, leuchtend blutrot, wüchsig, reichblühend.

rugosa-Hybriden, siehe gesonderte Zusammenstellung.**sericea pteracantha** Franchet.

Sehr interessante Form mit grossen, breiten, roten Stacheln am roten Holz. Wegen der auffallenden Bestachelung „Stacheldrahtrose“ genannt.

stylosa Desvoux.

Sparriger und schwachklimmender Strauch. Blüten weiss bis blassrosa im Juni und Juli. Frucht meist rundlich, eiförmig, scharlachrot.

Sweginzowii Koehne.

Bis 3 m hoch, Blumen rosa im Juni.

Theano Schmitt = **R. californica** fl. pl. Hort.

Wunderschöne, effektvolle Einzelpflanze oder für Trupps auf dem Rasen, winterhart, Blumen klein, leuchtend rosa, gefüllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, lange haltend. Dolden bis 100 Blüten.

Watsoniana Crépin.

Pflanze rankend, mit eigenartigen, langgeschlitzten Blättern. Auffallend, Blumen klein, hellrosa.

Willmottiae Hemsl.

Sehr schön niedrig bleibende Rose mit feinen, zierlichen Blättern. Blumen fleischfarbig, rosarot, sehr reichblühend und früh, von Mitte Mai an.

Woodsi Lindl.

Nordamerikanische Art von kräftigem Wuchs und reichem Blütenflor im Juni. Blumen rosa, einzeln, 4–5 cm Durchmesser, Blätter sattgrün, scharfgesägt.

Die kraftvolle Wirkung aller Rosen

in der Landschaft sollte den Gartengestalter von heute viel mehr dazu bestimmen, die Rosen nicht nur im Rosengarten zu verwenden, sondern diese üppigen Blüher überall in Park und Garten anzupflanzen, wo sie an Stelle eines Zierstrauches diesen sicherlich voll und ganz ersetzen werden. Gerade die Mannigfaltigkeit der niedrigen botanischen und Parkrosen ist so recht dazu berufen, Gestaltungs- und Farbenfreudigkeit in die Gärten zu tragen, so dass jeder, der diese Rosen erst einmal wahrhaft kennt, nicht mehr von ihnen lassen kann. Ungeahnte Bilder zaubern sie hervor mit ihrem vielgestaltigen Laub, dem lebhaften, köstlich duftenden Blütenkleide und dem üppigen Schmuck des Gelb und Rot ihres Fruchtbehangs im Herbst.

Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde Band III.

„Unsere Freiland-Nadelhölzer“ siehe vorletzte Umschlagseite.

Zusammenstellung rauchharter Koniferen für Industriegegenden siehe Seite 249.

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Abies Lk. Weiss- oder Edeltanne. (Abietineae.)				
alba , siehe <i>Abies pectinata</i> .				
amabilis Forbes. Liebliche Weisstanne	30—40	6.—	—	—
Sehr seltene, harte Weisstanne von herrlichem Bau, mit blaugrüner Benadelung. Voll beästet bis zur Erde.				
balsamea Mill. Balsamtanne	30—40	2.50	—	—
Eine durch alle nördlichen Staaten Nordamerikas weitverbreitete, raschwachsende Tannenart von schmal- pyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Be- nadelung.				
» argentea Hort.	40—55	6.—	—	—
Eine Form mit weissgespitzten Nadeln.				
cephalonica Lk. Cephalonische Weisstanne	30—40	5.—	—	—
Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland von streng pyramidalem, dichtem, starrem Wuchs. Nadeln glänzend dunkelgrün, dolchförmig.				
» var. Reginae Amaliae (<i>Abies peloponnesiaca</i> <i>Haage</i>). Zahme Tanne der Griechen	40—55 55—70	6.— 8.—	— —	— —
Im Peloponnes, zumal in den Gebirgen Arkadiens vorkommend. Baum schlanker und hochstämmiger als die Art.				
concolor Lindl. & Gord. Blaufarbige Weisstanne ..	30—40 40—55 55—70	7.50 10.— 12.—	70.— 80.— 100.—	— — —
Stammt aus den kalifornischen Gebirgen und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart.				
» (Colorado)	30—40	7.50	70.—	—
Besonders widerstandsfähige Standortsform aus Colorado.				
Fraseri Lindl. Frasers Balsamtanne	30—40	6.—	—	—
Wenig verbreitete, amerikanische Art, mit feinen Nadeln und von schlank kegelförmigem oder säulenför- migem Wuchse.				
lasiocarpa Engelm. & Sarg. (<i>A. Lowiana der eng-</i> <i>lischen Gärten</i>)	40—55	10.—	80.—	—
Wuchs ziemlich schmal und steifer als bei <i>A. concolor</i> . Die langen Nadeln sind nach oben gekrümmt und hier- durch leicht von <i>A. concolor</i> zu unterscheiden.				
magnifica Murr.	20—30	5.—	—	—
In Kalifornien heimischer, schlank- und hoch- wachsender Baum. Die dicht quirlständigen, kurzen Äste sind mit dicken, viereckigen, stumpfspitzen Nadeln besetzt, die schön blaugrün gefärbt sind. Eine der schönsten Tannen.				
nobilis Lindl. Edle Weiss- oder Silbertanne	20—30 30—40	3.— 4.—	— —	— —
Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die weiteste Ver- breitung.				
» argentea Hort.	40—55	12.—	—	—
Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.				
» glauca Hort.	30—40	6.—	—	—
Prächtig dunkelblau gefärbte Form.				

Abies (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Nordmanniana Lk. Nordmannstanne	30—40	3.—	25.—	—
Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, gehört unstreitig zu den edelsten und dekorativsten Koniferen.				
» pendula Hort.	30—40	5.—	—	—
Form mit stark herabhängenden Zweigen. In grösseren Exemplaren sehr dekorativ.				
pectinata D. C. (A. alba Mill.) Weiss- oder Edeltanne	40—55	1.50	12.—	100.—
Gemeine Weisstanne, als wertvoller Park- und Forst- baum allgemein geschätzt.				
» pendula Hort. Hänge- oder Trauertanne	40—55	5.—	—	—
Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.				
» pyramidalis Carr.	30—40	4.—	—	—
Interessante Säulenform, vom Wuchse der italie- nischen Pappel.				
Pinsapo glauca Hort. Blaugrüne, spanische Tanne	30—40	8.—	75.—	—
Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.				
	40—55	10.—	90.—	—
umbilicata Mayr.	20—30	2.—	15.—	120.—
Japanische, sehr schöne Tanne, die in der Heimat bis 40 m hoch wird. Die bis zu 2½ cm langen Nadeln sind oberseits hellgrün, unterseits hübsch silberigweiss.				
	30—40	3.—	25.—	—
Araucaria Juss. (Araucarieae.) Schmucktanne.				
imbricata Pav. (araucana.) Affenbaum	20—30	6.—	50.—	—
Eigentümlicher, bizarr aussehender Baum Chiles, dessen schlangenähnliche, bogig hängende Äste und Zweige mit scharfspitzen, dunkelgrünen Blättchen dicht dach- ziegelförmig besetzt sind.				
Cedrus Lk. Zeder (Abietineae).				
atlantica Manetti, Atlas-Zeder	30—40	4.—	35.—	—
Schöner Baum aus Nordafrika von stets pyrami- dalem Wuchse.				
» glauca Hort.	40—55	10.—	—	—
Ausserst dekorative Form mit ganz ausgeprägt blau- grüner bis stahlblauer Färbung.				
Deodara Loud. Himalaya-Zeder	30—40	4.—	35.—	—
Erwächst zu einem bis 50 m hohen, schönen Baum mit voll pyramidalen Krone und in der Jugend leicht bogenförmig überhängenden Ästen und Zweigen.				
	40—55	5.—	45.—	—
» aurea Hort.	40—55	8.—	—	—
Prächtig goldgelb gefärbt. Sehr empfehlenswert.				
	55—70	10.—	—	—
» robusta Hort.	20—30	5.—	—	—
Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen, dicht mit starken, fast doppelt so langen Nadeln als bei der Art besetzt.				
» verticillata glauca Hort.	20—30	5.—	—	—
Schöne, gedungen und üppig wachsende Form, deren Blattstellung an den Langtrieben quirlförmig angeordnet ist. Durch die blaue Färbung ausserordentlich schön.				
Cephalotaxus Sieb. et Zucc. Kopfeibe (Taxaceae).				
drupacea Sieb. & Zucc.	85—100	8.—	—	—
Ein bis 10 m hoher Baum mit quirlförmig aus- gebreiteten Ästen, nicht überhängend.				
Fortunei Hook. Fortunes Kopfeibe	85—100	8.—	—	—
Hier ein breitwüchsiger Strauch mit langen, platten, hellgelblichgrünen Nadeln.				
pedunculata fastigiata Carr. (Syn. Podocarpus korai- ana Sieb.)	100—120	12.—	—	—
Bildet ganz regelmässig und schön geformte, breite Säulen, die mit glänzend grünen, lederartigen Nadeln dicht besetzt sind.				

Chamaecyparis <i>Spach.</i> Lebensbaum - Zypresse (Cupressineae).	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lawsoniana <i>Parl.</i> Lawsons Zypresse	40—55	1.50	10.—	80.—
Eine allgemein beliebte und weitverbreitete Konifere, die unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht.	55—70	2.—	15.—	120.—
	70—85	3.—	20.—	150.—
	85—100	4.—	35.—	300.—
» Alumii <i>Hort.</i>	30—40	1.—	8.—	75.—
Unstreitig die wertvollste, blaue Säulenform.	40—55	2.—	18.—	150.—
	55—70	3.—	25.—	200.—
	70—85	3.50	30.—	250.—
	100—120	6.—	50.—	—
» argenteo-variegata nova <i>Hort.</i>	30—40	3.—	—	—
Sehr schön silberbunt bezweigt.	55—70	5.—	—	—
» Bowleri pendula <i>Hort.</i>	30—40	3.—	—	—
Bräunlichgrüne Hängeform mit lockerer Bezweigung.	55—70	5.—	—	—
» coerulea <i>Hort.</i>	55—70	4.—	—	—
Breitpyramidal, mit blaugrüner Bezweigung.				
» Darlyensis <i>Hort.</i>	40—55	3.—	—	—
Schöne, goldbunte, höchst elegante Form mit leicht überhängenden Zweigspitzen.				
» Depkeni <i>Depken</i>	85—100	6.—	—	—
Reizende Form mit leicht überhängender, feiner Be- zweigung von matt gelblichweisser Färbung.	120—140	8.—	—	—
» erecta alba <i>Keessen</i>	55—70	5.—	—	—
Wächst zu dichtgeschlossenen, schlanken Pflanzen heran, bei kräftigem Wuchs und ausserordentlich schöner, silbriger Belaubung.	85—100	6.—	—	—
» erecta filiformis <i>Neumann</i>	30—40	3.—	—	—
Eine dunkelgrüne Säulenform mit fadenförmigen, überhängenden Zweigspitzen.	40—55	4.—	—	—
» erecta filiformis glauca <i>Hort.</i>	30—40	3.—	25.—	—
Empfehlenswerte, blaue Form.				
» erecta viridis <i>Hort.</i>	30—40	1.—	8.—	75.—
Wertvolle, schöne Form von schlankem Wuchs mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigem Grün.	40—55	2.—	18.—	150.—
	55—70	3.—	25.—	200.—
	70—85	4.—	35.—	—
» filiformis <i>Hort.</i>	25—30	4.—	—	—
Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.	30—40	6.—	—	—
» Forsteckiana <i>Hort.</i>	15—20	5.—	40.—	—
Eine ganz kurz- und dichtgeknäult-zweigige Zwergform.				
» Fraseri <i>Hort.</i>	30—40	1.—	8.—	75.—
Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulen- förmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.	40—55	2.—	18.—	150.—
	55—70	3.—	25.—	200.—
	70—85	4.—	35.—	300.—
» glauca <i>Hort.</i>	70—85	4.—	35.—	300.—
Wertvolle, leicht bezweigte Form von zeitweise ganz stahlblauer Färbung.	85—100	6.—	55.—	—
» glauca argentea <i>Hort.</i>	55—70	4.—	35.—	—
Färbung wie Triumph von Boskoop, wächst jedoch streng pyramidal.	70—85	5.—	45.—	—
	85—100	6.—	55.—	—
» glauca elegans <i>Hort.</i>	40—55	2.—	18.—	—
Wuchs schmal pyramidal.	55—70	3.—	25.—	—
» glauca Veitch <i>Hort.</i>	55—70	4.—	—	—
Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweig- spitzen aber leicht hängend, ausgeprägt stahlblau.	85—100	6.—	55.—	—
» intertexta <i>Hort.</i>	55—70	5.—	40.—	—
Form mit weitgestellten, im Bogen schwer über- hängenden Zweigen. Schöne, auffallende und dekorative Form.	70—85	6.—	55.—	—

Chamaecyparis (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lawsoniana Krameri Hort.	30—40	3.—	—	—
Breite, dichtgeschlossene Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	40—55	5.—	—	—
» lutea Hort.	30—40	3.—	25.—	—
Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung.	40—55	4.—	30.—	—
	55—70	5.—	40.—	—
» minima glauca Hort. 20—30 cm breit	20—30	3.—	25.—	—
Dichtgedrängte, zwergige Kugel, von dunkelblaugrüner Färbung.				
» monumentalis nova Hort.	30—40	1.—	8.—	75.—
Sehr wertvolle, hellblaue Säulenform.	40—55	2.—	18.—	150.—
	55—70	3.—	25.—	200.—
	70—85	4.—	35.—	—
	85—100	6.—	55.—	—
» nana argenteo-variegata Hort.	30—40	3.—	25.—	—
Zierliche, dichtwachsende Form mit silberweißen Zweigspitzen.	55—70	5.—	—	—
» nana compacta Hort.	20—25	3.—	25.—	—
Empfehlenswerte Zwerg-Kugelform.				
» Olbrichi Hort.	30—40	2.—	15.—	—
Schöne Form von schlankem Wuchs und feiner Bezweigung.	55—70	4.—	—	—
» patula Hort.	40—55	3.—	—	—
Bräunlich dunkelgrüne Form; die Seitenzweige breiten sich kandelaberartig aus und bilden neue Köpfe.	55—70	4.—	—	—
» pendula Hort.	70—85	5.—	—	—
Schöne Form mit lang überhängender Bezweigung.				
» pendula vera Hesse	30—40	2.—	—	—
Sehr schöne und wertvolle Hängeform von üppigem Wuchs und mit langen, schlaff herabhängenden Ästen.	40—55	3.—	—	—
» pulcherrima Hort.	30—40	2.—	—	—
Locker zweigige Form mit weiss schimmernden Nadeln.	70—85	5.—	—	—
» pyramidalis alba Hort.	30—40	4.—	—	—
Eine schlank aufstrebende Form, welche weisse Zweigspitzen trägt und zuzeiten ganz silberweiss schimmert.	55—70	6.—	—	—
» pyramidalis glauca Hort.	30—40	2.—	—	—
Schöne, schlank aufwärtsstrebende Säulenform von lebhaft blaugrüner Färbung.				
» robusta Hort.	30—40	2.—	—	—
Widerstandsfähige Form von dichtem, säulenförmigem Wuchs und dunkelgrüner Bezweigung.	85—100	6.—	—	—
» robusta glauca Hort.	40—55	3.—	—	—
Üppig wachsende, breit-säulenförmige Pflanze von tiefblaugrüner Färbung.	70—85	5.—	—	—
» Rosenthali P. Smith & Cie.	55—70	4.—	35.—	—
Säulenförmig aufstrebende, saftig hellgrüne, zierlich leichtbezweigte, dekorative Form.	70—85	5.—	45.—	—
	85—100	6.—	55.—	—
» Schongariensis Hort.	55—70	4.—	—	—
Eine aparte, stahlgrün gefärbte Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker gestellten Zweigen.	70—85	5.—	—	—
» Silver Queen Hort.	40—55	3.—	28.—	—
Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung.	55—70	4.—	35.—	320.—
	70—85	5.—	45.—	—
	100—120	7.50	—	—
» Smithi Hort.	40—55	3.—	—	—
Wuchs breit, pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.	85—100	6.—	—	—
» Stewardtii Hort.	40—55	3.—	25.—	—
Neuere, intensiv gelb gefärbte Form, die säulenförmigen Wuchs zeigt.	50—70	4.—	35.—	—
» sulfurea Hort.	30—40	2.—	—	—
Schöne, pyramidal wachsende, graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.				

Chamaecyparis (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lawsoniana tamariscifolia Hort.	30—40	5.—	—	—
Niedrig bleibende Form, die in Wuchs und Aussehen Juniperus tamariscifolia ähnelt. Eignet sich besonders für Felspartien.	40—55	8.—	—	—
» Triumph von Boskoop Hort.	55—70	5.—	40.—	—
Unstreitig mit die schönste, blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.				
» versicolor J. Conink	40—55	3.—	—	—
Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattie- rungen schimmernde Form, welche ausserdem besonders winterhart ist.	70—85	5.—	—	—
» Westermanni Hort.	40—55	4.—	35.—	—
Pyramidale, dicht, aber dabei leicht und zierlich be- zweigte, goldgelb schimmernde Form.	55—70	5.—	45.—	—
» Wisselii (conica) Hort.	55—70	4.—	35.—	—
Interessante Säulenform mit aufrechten und an- liegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig an- liegender Belaubung.	70—85	5.—	45.—	—
» Youngii Hort.	55—70	4.—	35.—	—
Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen.	70—85	5.—	45.—	—
nutkaënsis Spach. Syn. <i>Thuyopsis borealis Hort.</i> ,				
Nutka Zypresse	30—40	1.50	12.—	—
Zierliche, winterharte Konifere aus dem nordwest- lichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30—40 m erreichen soll.				
» argenteo-variegata Hort.	30—40	2.50	—	—
Empfehlenswerte, silberbunte Spielart.				
» compacta Hort.	40—55	2.50	20.—	—
Schöne, gedrungene, dichtbuschige Form, eine zier- liche, blaugüne Kugel bildend.	55—70	4.—	35.—	—
	70—85	5.—	45.—	—
» glauca Hort.	30—40	2.50	—	—
Eine hübsche Form mit ausgeprägt blaugrüner Fär- bung. Die stärkeren Zweige hängen meist schwer über.				
» glauca aureo-variegata Hort.	30—40	2.50	—	—
Recht beständige, goldbunte, schöne Form.				
» lutea Hort.	30—40	2.50	—	—
Eine goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	100—120	12.—	—	—
» nana compacta Hort.	30—40	4.—	—	—
Schöne, kompakt wachsende Zwergform.				
» pendula	30—40	3.—	—	—
Schöne, hängende Form.				
» viridis Hort.	30—40	1.—	8.—	75.—
Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenförmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.	40—55	2.50	20.—	—
	55—70	4.—	35.—	—
	70—85	5.—	45.—	—
	100—120	8.—	—	—
obtusula Hort.	10—15	2.—	—	—
Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen.	55—70	10.—	—	—
» aurea Hort.	30—40	3.—	—	—
Eine der schönsten, goldfarbenen Koniferen, die fast das ganze Jahr die goldene Färbung behält. Wuchs elegant. Pflanze sehr hart.				
» aurea gracilis Hort.	30—40	3.—	—	—
Pyramidale, sehr zierliche Form mit leicht überhängen- den, goldig schimmernden Zweigen.				
» compacta Hort.	55—70	12.—	—	—
Bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrungenem, rundlichem Wuchs.				
» Crippsii Hort.	30—40	3.—	—	—
Unterscheidet sich von obtusa aurea durch weniger hängenden und mehr dichten Wuchs. Farbe hellschwefel- gelb bis dunkelgoldgelb.				
» lycopodioides coralliformis Hort.	20—30	3.—	—	—
Interessante Form mit korallenförmig sich ver- gabelnden Gliedern.				

Chamaecyparis (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
obtusa magnifica Hort.	140—160	20.—	—	—
Von breitem, buschigem Wuchs mit dicklichen, üppi- gen, frischgrün glänzenden Zweigen.				
» Mariesi Hort.	10—15	3.—	—	—
Schlank aufwachsende Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben.				
» nana aurea Hort.	20—30	3.—	—	—
Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwerg- form, mit fächerförmig sich ausbreitenden Zweigen von goldgelber Färbung.				
» tetragona aurea Hort.	10—15	3.—	—	—
Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit ab- stehenden, kurzen, monströsen, oft hahnenkammförmig gedrängten Zweigen.				
pisifera Sieb & Zucc. Erbsenfrüchtige Zypresse	85—100	5.—	45.—	—
Von sehr schöner, lockerer Bauart mit leicht über- hängenden, unten weissgezeichneten Zweigen.				
» argenteo-variegata Hort.	40—55 85—100	3.— 6.—	— —	— —
Harte, weissbunte Form.				
» aurea Hort.	40—55 55—70 70—85 100—120 120—140 140—160	3.— 3.— 4.— 6.— 8.— 12.—	18.— 25.— 35.— — — —	— — — — — —
Eine rein goldgelbe Varietät, mit der normalen Zweigform der Stammart.				
» filifera Hort.	40—55	4.—	35.—	—
Dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängenden Zweigen.				
» filifera aurea Hort.	20—30 40—55	3.— 8.—	— —	— —
breit und hoch Zierliche, niedrige Spielart der vorigen, deren faden- förmige Bezweigung goldgelb gefärbt ist.				
» filifera aureo-variegata Hort.	20—30 55—70 85—100	3.— 10.— 15.—	— — —	— — —
Sehr schöne, goldbunte Form.				
» filifera nana Hesse	20—30	5.—	40.—	—
hoch und breit Eine grüne, dichtbuschige Zwergform mit faden- förmigen Zweigen.				
» lutea Hort.	40—55	2.50	20.—	—
Hellgelbe Bezweigung.				
» nana aureo-variegata Hort.	20—30 70—85	3.— 12.—	— —	— —
hoch und breit Eine ganz niedrigbleibende, dichtbezweigte, gold- bunte Kugelform.				
» plumosa Hort.	55—70	3.—	25.—	—
Wertvolle, dunkelgrüne, harte Form von gedrun- genem Wuchs. Die einzelnen Zweige gleichen gekräuselten Straussenfedern.				
» plumosa aurea Hort.	40—55	2.—	18.—	—
Schön goldgelb gefärbt.				
» plumosa flavescens Hort.	20—25	3.—	—	—
Bildet einen breiten, ganz dicht bezweigten Kegel mit gelblichweissen Zweigspitzen.				
» plumosa nana aurea Hort.	30—40 40—55	2.— 3.—	18.— 25.—	— —
Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugelform.				
» squarrosa Beissn. & Hochst.	40—55 55—70 70—85	2.— 3.— 4.—	18.— 25.— 35.—	— — —
Bildet buschige, zierliche, pyramidale Pflanzen mit leichter, an den Spitzen überhängender Bezweigung von prächtiger, silbergrauer Färbung.				
» sulfurea Hesse	40—55 85—100	2.— 6.—	18.— —	— —
Schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hell- schwefelgelber, leuchtender Färbung.				

Cryptomeria Don. Cryptomerie (Taxodiaceae).

japonica Don. Japanische Cryptomerie
Schöner, bis 40 m hoher Baum. Tracht breit pyramidal, Verästelung spiralig.

» **araucarioides Hort.**
Bildet breite, bis unten bezweigte Pyramiden, hat in der Verzweigung Ähnlichkeit mit *Araucaria excelsa*.

» **Lobbi Hort.**
Eine hübsche Form von schönem, gedrunenem Wuchs und frischer, grüner Färbung.

» **monstrosa Hort.**
Buschig wachsende, monströse Form.

» **pungens Hort.**
Sehr schöne, blaugrün gefärbte Varietät.

» **selaginoides Hort.**
Mit langen, dicklichen Zweigen und anliegenden Nadeln.

Juniperus L. Wacholder. (Cupressineae.)

chinensis argenteo-variegata Hort.
Diese schöne Form bildet einen dichten Kegel, bei welchem manche Zweigspitzen ganz weiss erscheinen.

» **Pfitzeriana Späth**
Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagrecht abstehenden Ästen, an welchen eine feine, leichte, graugrüne Verzweigung zierlich nickend sich ausbreitet.

» **procumbens aurea Hort.** (*japonica aurea*)
Schöne Form mit langen und übergebogenen, ziemlich unregelmässig gestellten Ästen, deren junge Triebe goldgelb gefärbt sind.

communis cracovica Hort.
Raschwüchsig, aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyramiden.

» **hibernica Gord.** Irländischer Wacholder
Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner, blaugrüner Färbung.

» **hibernica excelsa pyramidalis Hort.**
Von etwas breiterem Wuchs als *J. hibernica*.

» **suecica Loud.** Schwedischer Wacholder
Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich-eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen. Vollständig winterhart.

» **von Nord China Hort.**
Unterscheidet sich von dem schwedischen Wacholder nur durch etwas längere, sehr langgespitzte und auf der Blattunterseite auffallend glänzend grüne Blätter.

recurva densa Carr.
Buschige, dunkelgrüne Zwergform mit kurzen, sehr dichtstehenden Zweigen.

Sabina L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum
Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.

» **tamariscifolia Ait.** (*J. Sabina mas.*) ca. 30 cm breit
Bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber sehr breit gehend. Für Felsen sehr geeignet.

Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
85—100	5.—	45.—	—
30—40	4.—	—	—
30—40 55—70 85—100	4.— 6.— 8.—	— — —	— — —
40—55	6.—	—	—
30—40	4.—	—	—
15—20 30—40	4.— 5.—	— —	— —
40—55	4.—	—	—
20—30 40—55 70—85	2.— 3.— 6.—	18.— 28.— —	— — —
40—55	10.—	—	—
30—40 85—100	2.— 7.50	18.— 70.—	— —
30—40 40—55 55—70 70—85	2.— 3.— 4.— 5.—	18.— 28.— 38.— 48.—	150.— 250.— 350.— 450.—
30—40 40—55 55—70 70—85 85—100 100—120	2.— 3.— 4.— 5.— 7.50 10.—	18.— 28.— 38.— 48.— 70.— —	150.— 250.— 350.— 450.— — —
30—40 40—55 55—70 70—85 85—100	2.— 3.— 4.— 5.— 7.50	18.— 28.— 38.— 48.— 70.—	150.— 250.— 350.— 450.— —
30—40	2.50	20.—	—
30—40	10.—	—	—
20—30 30—40 40—55	1.50 2.— 3.—	12.— 18.— 28.—	100.— 150.— 250.—
20—30	3.—	28.—	—

Juniperus (Fortsetzung):

virginiana L. Virginischer Sadebaum
Bildet in der Jugend schöne, dichtgeschlossene, grau-
grün bezweigte Pyramiden.

» **glauca Carr.**
Üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner
Färbung.

» **pseudocupressus Hort.**
Von schlankem, säulenförmigem Wuchs, mit auf-
strebenden Ästen und von grau- bis blaugrüner Färbung.

» **Schotti Hort.**
Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich
durch schönes, frisches Grün auszeichnet.

Larix Lk. Lärche (Abietineae).

europaea D. C. Gemeine Lärche
Geschätzter Park- und Forstbaum.
Hervorragend zu Hecken!

kurilensis Mayr.
Sehr schnell- und starkwachsende Art mit üppiger
Belaubung.

leptolepis Murr. Japanische Lärche
Schöner, bis gegen 30 m Höhe erreichender Baum
von schöner, blaugrüner Färbung.
Hervorragend zu Hecken!

Libocedrus Endl. Flusszeder.

decurrens Torr. Kalifornische Flusszeder
Von schlankem, schmal-pyramidalem Wuchs mit ab-
stehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.

Picea Lk. Fichte, Rottanne (Abietineae).

ajanensis Fisch. Ajanfichte
Im Wuchs der *P. excelsa* ähnlich, jedoch zierlicher.
Nadeln unterseits auffallend blauweiss bereift.

alba Lk. Nordamerikanische Weissfichte
Ein bis 25 m Höhe erreichender, nordamerikanischer
Baum von pyramidalem Wuchs und mehr oder weniger
blaugrüner Färbung.

» **coerulea hudsonica Hort.**
Blaugefärbte Form mit sehr dichtstehenden Nadeln.
Die jüngeren Zweige sind langwagerecht ausgestreckt,
während die älteren mässig hängen.

asperata Mast.
Gemeine, vierkantnadelige Fichte von Nordwest
Szechuan, wo ausgedehnte Waldungen dieser Art vor-
kommen. Der Baum zeigt hier einen regelmässigen
Wuchs und ist durch die bläulichgraue Benadelung sehr
zierend.

Breweriana Watson. Brewers Fichte
Siehe Abbildung!
Dekoratив auffallende Art. Äste schlank, wagerecht.
Seitentriebe dünn, oft bis 2 m lang, schlaf senkrecht
herabhängend. Dunkelgrüne Benadelung. Meine 3 m
hohen Mutterpflanzen haben die strengste Kälte vorzüg-
lich überstanden und zeigen auch die charakteristische,
hängende Tracht.

excelsa Lk. Fichte oder Rottanne
Bekannte, einheimische Art.

Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
40—55	2.—	18.—	150.—
70—85	4.50	40.—	—
85—100	5.—	45.—	—
100—120	6.—	55.—	—
40—55	4.—	35.—	—
85—100	8.—	75.—	—
100—120	10.—	90.—	—
40—55	4.—	—	—
40—55	4.—	—	—
85—100	8.—	—	—
100—120	10.—	—	—
100—125	1.50	12.—	100.—
125—150	2.—	18.—	150.—
150—200	2.50	22.—	200.—
200—250	3.—	25.—	—
160—180	3.—	—	—
150—200	3.—	28.—	200.—
200—250	4.—	35.—	300.—
40—55	4.—	35.—	—
40—55	3.—	28.—	250.—
55—70	4.—	—	—
85—100	6.—	55.—	—
100—120	8.—	75.—	—
120—140	10.—	95.—	—
40—55	1.50	10.—	80.—
55—70	2.—	15.—	120.—
70—85	2.50	20.—	150.—
85—100	3.—	25.—	—
30—40	3.—	—	—
40—55	5.—	—	—
30—40	3.—	—	—
140—160	20.—	—	—
160—180	25.—	—	—
180—200	30.—	—	—
30—40	5.—	40.—	375.—
70—85	10.—	—	—
85—100	12.—	—	—
100—120	15.—	—	—
120—140	18.—	—	—
40—55	1.—	8.—	60.—
55—70	1.50	10.—	80.—

Picea (Fortsetzung):

excelsa acrocona <i>Th. M. Fries</i>	40—55	3.—	—	—
Interessante Form mit merkwürdiger Bildungsabweichung des Zapfens.				
» alpestris Brügger . Alpenfichte	40—55	3.—	25.—	—
Von gedrungenem, pyramidalem Wuchs, mit weitgestellten Ästen, kurzer, steifer Bezweigung und derben, vierkantigen, bläulich bereiften Nadeln.				
» argenteo-spicata Hesse	30—40	2.—	18.—	—
Eine sehr schöne Form mit weissen Triebspitzen, besonders beim Austreiben wirkungsvoll.				
» aurea Carr.	40—55	3.—	25.—	—
Form mit schöner, goldgelber Zweigfärbung.				
» cincinnata Hesse . Lockenfichte	40—55	3.—	25.—	—
Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal stehend, die kleineren Äste und die Zweige herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige Verzweigungen von 4—6 cm Länge bildend.				
» Clanbrasiliana Carr.	85—100	10.—	—	—
Eine rundliche oder kegelförmige, ganz gedrungene, sehr kurz und dicht bezweigte Zwergform.				
» columnaris Carr . Säulenfichte	40—55	3.—	28.—	250.—
Eine starkwachsende Form, welche mit kurzen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Säule bildet.				
	55—70	4.—	35.—	—
	120—140	6.—	55.—	—
	140—160	7.—	65.—	—
	160—180	9.—	80.—	—
	180—200	10.—	90.—	—
» compacta Hort.	55—70	6.—	—	—
Zierliche Form von dichtem, rundlichem Wuchs.				
	85—100	8.—	—	—
	100—120	10.—	90.—	—
	120—140	12.—	100.—	—
» conica Carr . Kegelfichte	30—40	2.—	18.—	—
Bildet mit den aufstrebenden, sehr dichtstehenden Ästen und dünnen Zweigen einen gedrungenen Kegel.				
» Cranstonii Carr. (Syn. <i>P. exc. Dicksoni</i>)	55—70	4.—	—	—
Höchst eigentümliche Form, die nur aus einem aufrechten Schaft mit wenigen, seitlichen Verzweigungen besteht.				
	70—85	5.—	—	—
» cupressina Thomas . Zypressenfichte	30—40	2.—	18.—	—
In der Tracht einer geschlossenen, etwas breiten Säulenzypresse ähnlich, wirkt in der Landschaft wie eine breite Pyramidenpappel.				
	40—55	3.—	28.—	—
» Ellwangeriana Hort.	30—40 cm breit	20—30	4.—	38.—
breite Pflanzen {		55—70	6.—	55.—
		70—85	8.—	—
		140—160	15.—	—
Schöne Form von breitem, gedrungenem Wuchs mit feiner, dichter Bezweigung und feinen, kleinen, spitzigen Nadeln.				
» eremita Carr. (Syn. <i>P. exc. crassifolia</i>)	30—40	2.—	18.—	—
Üppig wachsende Form von schmal pyramidalem Wuchs. Die zahlreichen Äste sind schief aufwärts gerichtet und kurz bezweigt.				
» Finedonensis Hort.	40—55	3.—	28.—	—
Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.				
» Gregoriana Hort.				
breite Pflanzen {		20—30	3.—	—
		30—40	5.—	—
		55—70	10.—	—
Eine auffallend gedrungene, sehr empfehlenswerte Zwergform.				

Picea (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
likiangensis	40—55	5.—	—	—
Baum aus Südwest-China, der bis 25 m hoch wird. Triebe hellgelbgrau, spärlich behaart. Nadeln scharf gekielt. In der Tracht leichter als <i>Picea asperata</i> .				
nigra Doumetti Carr.	30—40	3.—	25.—	200.—
Schlanke, dichtverzweigte Kegelform mit blaugrüner Benadelung.				
» Mariana Hort.	30—40	3.—	25.—	200.—
Als jüngere Pflanze von Doumetti nicht zu unter- scheiden, bildet aber breitere, dichte Pyramiden.				
	40—55	4.—	35.—	300.—
	55—70	5.—	45.—	400.—
Omorica Pančić. Omorikafichte	30—40	3.—	28.—	250.—
Stattlicher, schmal pyramidal, fast säulenförmiger Baum. Benadelung tiefdunkelgrün mit weisser Unter- seite.				
	40—55	4.—	35.—	300.—
	55—70	6.—	55.—	500.—
	70—85	7.—	65.—	600.—
	85—100	10.—	95.—	—
» pendula Hort.	30—40	3.—	25.—	—
Schön hängende Form, sonst mit denselben Eigen- schaften als die Art.				
	40—55	5.—	45.—	—
orientalis Lk. & Carr. Morgenländische Fichte ...	40—55	4.—	35.—	—
Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glänzend bronzierten, dunkelgrünen, kurzen Nadeln.				
	55—70	5.—	45.—	—
» aureo-spicata Hesse	40—55	5.—	45.—	—
Wirkungsvolle Form mit goldgelb gefärbten, jungen Trieben. Später dunkelgrün werdend.				
» nutans Niemetz	40—55	5.—	—	—
Schöne Form mit elegant überhängenden Zweigen.				
	55—70	6.—	55.—	—
polita Carr. Torano- oder Tigerschwanzfichte	30—40	3.—	28.—	—
Schöner Baum von kegelförmigem Wuchs. Auf- fallend durch die dunkelgrünen, dolchartig spitzen Nadeln und die grossen, braunroten, kugeligen Knospen.				
pungens Engelm. Stech- oder Blaufichte	30—40	2.—	18.—	—
Junge Bäume sind von schönem, regelmässigpyrami- dalem Wuchs, mit steifer Bezweigung.				
» argentea Hort.	55—70	7.—	65.—	—
Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzuweisen hat.				
» glauca Hort.	30—40	3.—	—	—
Hervorragend schöne, blaugefärbte Form.				
» » pendula Hort.	55—70	8.—	—	—
Schön silberweiss gefärbte Form von hängendem Wuchs.				
» Kosteri Hort.	30—40	3.—	28.—	250.—
Prächtig graublau gefärbte Form von schön ge- schlossenem Wuchs. Die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln.				
	40—55	5.—	48.—	450.—
	55—70	7.—	65.—	620.—
	70—85	10.—	—	—
	85—100	12.—	—	—
retroflexa Masters	140—160	10.—	—	—
Eine breitwachsende, chinesische Art; dem allge- meinen Aussehen nach ähnelt sie <i>Picea polita</i> .				
rubra Lk. Nordamerikanische Rotfichte	20—25	3.—	—	—
Hat auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit mit der gemeinen Fichte, ist aber in allen Teilen kleiner und treibt auch im Frühjahr später aus wie diese.				
Schrenkiana Fisch. & May	55—70	5.—	—	—
Hoher Baum mit überhängenden Ästen und Zweigen, in der Tracht an <i>Picea Morinda</i> erinnernd.				
sitkaënsis Carr. (<i>P. sitchensis</i>)	40—55	1.50	10.—	80.—
Bis 60 m hoher Baum von streng pyramidalem Wuchs.				
	55—70	2.—	15.—	120.—
	70—85	2.25	20.—	150.—
	100—120	2.50	22.—	180.—
Watsoniana Masters	30—40	5.—	—	—
Im westlichen China, an der Grenze von Tibet von Wilson entdeckt. Im allgemeinen Aussehen erinnert diese neue Fichte an <i>Picea Schrenkiana</i> .				

Pinus Linné. Kiefer (Abietineae).

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
austriaca , siehe <i>Laricio austriaca</i> .				
Banksiana Lamb. Banks-Kiefer	40—55	2.—	18.—	—
Spitz kegelförmiger Wuchs mit aufrechten Ästen.	55—70	3.—	28.—	—
Bekannter Forstbaum.	70—85	4.—	35.—	—
Cembra L. Zürbelkiefer	20—25	2.—	18.—	—
Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmal pyramidalem oder eiförmigem Wuchs. Gedeiht in allen Lagen.				
nana Hort.	10—15	3.—	—	—
Zwergform, ähnlich <i>Pinus pumila</i> , jedoch von dieser durch viel grössere und schwerere Früchte verschieden.	85—100	15.—	—	—
cembroides Zucc.	20—30	3.—	—	—
Erwächst zu kleinem Baum mit ausgebreiteter Krone. Die kurze und steife, scharfspitze Benadelung ist von freudiggrüner Färbung.				
contorta Murrayana Engelm. Drehkiefer	30—40	2.—	18.—	—
Schöne, gedrunken und pyramidal aufwachsende, harte Kiefer, welche nicht gross wird. Frischgrüne, glänzende Benadelung.	40—55	3.—	25.—	—
	55—70	4.—	35.—	—
densiflora pumila Hort.	20—30	3.—	—	—
Empfehlenswerte Zwergform.				
edulis Engelm.	20—30	3.—	—	—
Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner, blau- grüner Benadelung.				
excelsa Wall. Tränenkiefer	30—40	2.50	20.—	180.—
Die lang herunterhängenden, blaugrünen Nadeln geben dem Baum einen eigenartigen Reiz.				
flexilis James. Nevada-Zürbelkiefer	30—40	3.—	—	—
Interessante, langsam wachsende Art, die sich hier widerstandsfähig zeigte und daher Verbreitung verdient.				
Jeffreyi Murr. Jeffreys Kiefer	20—30	2.—	18.—	—
Prächtige, sehr dekorative Art, wovon die jungen Triebe durch die bläuliche Färbung neben der blau- grünen Benadelung besonderszierend sind.	30—40	3.—	25.—	—
	40—55	4.—	35.—	—
koraiensis Sieb. et Zucc. Koreakiefer	100—120	8.—	—	—
Eine der <i>P. Cembra</i> ähnliche, sehr langsam wachsende Art von dichtem, rundlichem Wuchs und bläulich schim- mernder Benadelung.				
Laricio Poir. Schwarzkiefer	20—30	2.—	18.—	—
Ein bis 40 m hoher Baum mit pyramidalen Krone, gelblichen Zweigen und dunkelgrüner Benadelung.	30—40	3.—	25.—	—
» austriaca Endl. (<i>Pinus austriaca Hoess</i>). Öster- reichische Schwarzkiefer	30—40	2.—	18.—	150.—
Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breit eiförmiger Krone.	40—55	3.—	25.—	200.—
	55—70	4.—	35.—	300.—
	70—85	5.—	45.—	—
montana Mill. Krummholzkiefer	20—30	1.50	12.—	100.—
Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerich- teten Ästen.	30—40	2.—	18.—	150.—
	40—55	3.—	25.—	200.—
	55—70	4.—	35.—	—
» uncinata. Hakenkiefer	30—40	2.—	18.—	150.—
Von der Stammart durch mehr aufrechten Wuchs und üppigere, blaugrüne Nadeln unterschieden.				
parviflora S. & Z.	20—30	2.—	—	—
Prächtige Art, bis etwa 20 m hoch werdend. Aste dicht und horizontal gestellt, pyramidal wachsend. Eine sehr schöne Kiefer.	85—100	6.—	—	—
pentaphylla Mayr. Japanische Weymouthskiefer ...	20—30	2.—	—	—
Sehr dekorative, schöne, wertvolle Kiefer, von japani- schen Gärtnern viel zu künstlichen Zwergen herangezogen.	120—140	10.—	—	—
Peuce Gris. Ramelische Weymouthskiefer	20—30	2.—	—	—
Ganz harte, langsam wachsende Kiefer, von ge- prägtem, spitzpyramidalem Wuchs.				

Pinus (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
ponderosa Dougl. Gelbkiefer.....	30—40	3.—	25.—	—
Eine schöne, üppige, dekorative Kiefer mit dunkelgrüner Benadelung.	40—55	4.—	35.—	—
	55—70	5.—	45.—	—
Strobus L. Weymouthskiefer.....	40—55	1.50	12.—	100.—
Schätzbarer Forst- und Parkbaum.	55—70	2.—	18.—	150.—
	70—85	2.50	20.—	180.—
	85—100	3.—	25.—	—
	100—120	4.—	35.—	—
» nivea Hort.	20—30	3.—	—	—
Form mit ausgebreiteten, oft übergebogenen Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blau-weißen Längslinien treten so stark hervor, dass die Blätter oft silberweiss erscheinen.				
Thunbergi Parl. Thunbergs Kiefer.....	40—55	4.—	35.—	—
Wächst als anspruchlosester Baum im Dünenlande. In der Tracht unserer Schwarzkiefer ähnlich.	55—70	5.—	45.—	—
tuberculata Gord.	55—70	6.—	—	—
Seltene Art von langsamem Wuchs und dunkelgrüner Färbung.				

Podocarpus, siehe **Cephalotaxus**.**Pseudotsuga Carr.** (Abietineae).

Douglasi glauca Hort.	55—70	4.—	35.—	—
Eine prächtige, blaugrüne, harte Gebirgsform.				
» mucronata Hort.	55—70	4.—	35.—	—
Eine grüne Form, von schwächerem und dabei dichterem Wuchs als die Art.	70—85	5.—	45.—	—

Sciadopitys S. & Z. Schirmtanne (Taxodiaceae).

verticillata Sieb. & Zucc. Japan. Schirmtanne.....	40—55	6.—	55.—	—
Sehr wertvolle, ganz harte, ornamentale, seltene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausgebreitet sind.	55—70	7.—	65.—	—

Sequoia Endl. (Wellingtonia Lindl.) Taxodiaceae

gigantea Torr. Riesen-Sequoie, Mammutbaum.....	20—30	5.—	—	—
Riesiger Baum bis 120 m hoch werdend. Bildet vom Boden an bestete, regelmässige, spitze Pyramiden.				

Taxodium Rich. Sumpfyzypresse (Taxodiaceae).

distichum pendulum novum	40—55	6.—	—	—
Zierlich hängende Form, dekorativ und wertvoll.				

Taxus Tourn. Eibenbaum (Taxaceae).

baccata L. Gemeiner Eibenbaum. 1000 St. M. 1000.—	20—30	2.—	15.—	120.—
1000 » » 1800.—	30—40	3.—	25.—	200.—
1000 » » 2800.—	40—50	4.—	35.—	300.—
1000 » » 3500.—	50—60	4.50	40.—	375.—
1000 » » 4300.—	60—70	5.50	50.—	450.—
	70—80	6.50	60.—	550.—
	80—90	7.50	70.—	650.—
	90—100	10.—	90.—	800.—
	100—125	14.—	120.—	1000.—
	125—150	20.—	180.—	—
	150—180	25.—	200.—	—
	70—85	7.—	60.—	—
» adpressa Carr.				
Bildet breite, niedrige und unregelmässige Büsche mit dichter Verzweigung. Auffallende Form.				
» aureo-variegata Hort.	55—70	7.—	—	—
Sehr auffallende, goldbunte Form.	85—100	10.—	—	—
» Dovastoni aureo-variegata Hort.	100—125	15.—	—	—
Empfehlenswerte, goldbunte Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und überhängenden Seitenästen.	180—200	25.—	—	—

Taxus (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
baccata elegantissima Hort.	85—100	10.—	—	—
Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.				
» erecta aureo-variegata Hort.	70—85	8.—	75.—	—
Zierliche, hellgelb-bunte Spielart.	85—100	10.—	95.—	—
» fastigiata Loud. (<i>Taxus bacc. hibernica Hort.</i>)				
Irlandischer oder Säuleneibenbaum; echt! . . .	30—40	4.—	35.—	300.—
aus Samen	20—30	2.—	15.—	120.—
gezogene Pflanzen	30—40	3.—	25.—	200.—
	40—55	4.—	35.—	300.—
	55—70	4.50	40.—	375.—
Wertvolle, dunkelgrüne, steife Säulenform, welche Empfehlung verdient.				
» fastigiata aureo-variegata Hort.	55—70	6.—	—	—
Sehr schön goldbunt.	70—85	8.—	—	—
	85—100	10.—	—	—
	100—120	12.—	—	—
	120—140	14.—	—	—
» Jacksonii Gord.	100—120	12.—	—	—
Form mit ausgebreiteten, an den Spitzen überge- bogenen Trieben. Benadelung hellgrün.				
» major Hort.	ca. 100	10.—	—	—
Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.				
» nana Knight	100—125	12.—	110.—	—
Bildet schöne, dunkelgrüne, extra breite, dichtgedrun- gene Pyramiden.	125—150	15.—	—	—
» Nedpath Castle Hort.	100—120	10.—	—	—
Von breit säulenförmigem Wuchs mit langen, auf- strebenden Zweigen und feiner, blaugrüner Benadelung.				
» pyramidalis Hort.	20—30	2.50	20.—	180.—
Üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dicht- bezweigte, sehr empfehlenswerte Form.	30—40	3.50	30.—	250.—
	60—70	6.—	55.—	500.—
	70—80	7.—	65.—	—
	80—90	8.—	75.—	—
	100—125	15.—	—	—
	125—150	20.—	—	—
brevifolia Nutt. Kurzblättriger Eibenbaum	55—70	10.—	90.—	—
Kleiner Baum des westlichen Nordamerikas, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, breiten, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern.	70—85	12.—	—	—
cuspidata S. & Z.	40—50	4.—	35.—	300.—
Echte Art mit aufstrebenden bis ausgebreiteten Ästen und von gedrungenem Wuchs. Einzige im östl. Nordamerika harte Art, daher sehr gesucht.	50—60	4.50	40.—	375.—
	60—70	5.50	50.—	450.—
	70—80	6.50	60.—	550.—
Thuja Tourn. Lebensbaum (Cupressineae).				
gigantea Nutt. (<i>Thuja Lobbi Hort.</i>) Riesen-Lebensbaum	40—55	1.50	12.—	100.—
Ein prächtiger, harter, schlank und üppig aufwach- sender, spitz pyramidaler Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.	55—70	2.—	18.—	—
» atrovirens Hort.	30—40	2.—	18.—	—
Höchst dekorative Form von ganz dunkelgrüner, glänzender Färbung.				
» aureo-variegata Hort.	70—85	5.—	—	—
Sehr auffallende, goldbunte Varietät.				
» aurescens Hort.	40—55	3.—	25.—	—
Schöne Form von ausgeprägt gelber Färbung, die auch beständig bleibt.	55—70	4.—	35.—	—
occidentalis L. Abendländischer Lebensbaum	40—55	1.—	8.—	60.—
Allgemein bekannter Lebensbaum, lässt sich durch Beschneiden zu jeder Form erziehen und wird als Hecken- pflanze sehr geschätzt.	55—70	1.50	10.—	80.—

Thuya (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
occidentalis albo spica Hort.	120—140	8.—	—	—
Die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiss, und daher ist diese Form im Sommer sehrzierend.				
» Bodmeri Hort.	30—40	3.—	25.—	—
Eigentümliche Form von aufstrebendem Wuchs, mit kurzen, monströsen, dicklichen und übergebogenen Zweigen.				
» Buchononi Arnold Arb.	100—120	12.—	—	—
Eine selten schöne, graugrüne Form, sehr zierlich und feinzweigig.				
» Cloth of Gold Hort.	20—30	2.—	—	—
Sehr hübsche Form von leuchtend hellgelber Färbung, die nach den unteren Zweigen zu in goldgelb übergeht.				
» Columbia Hort.	40—55	3.—	25.—	—
Eine schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen.				
» Columna Späth	40—55	3.—	25.—	200.—
Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen.				
	55—70	4.—	35.—	320.—
	70—85	5.—	45.—	—
	120—140	8.—	—	—
» cristata Hort.	30—40	2.—	—	—
Eigentümliche Form mit kurzen, hahnenkammförmigen Zweigen.				
» Douglasi pyramidalis Arnold Arb.	55—70	4.—	35.—	—
In der Bezweigung der <i>Chamaecyparis obtusa filicoides</i> ähnelnde, langsam und gedrun-gen wachsende Pyramidenform.				
	70—85	5.—	45.—	—
	85—100	6.—	55.—	—
	100—120	8.—	75.—	—
	120—140	10.—	95.—	—
» Ellwangeriana Hort.	30—40	2.—	18.—	—
Übergangsform mit zweierlei Zweigen. Bildet zierliche, dichtbezweigte, gedrungene Pyramiden; ganz hart.				
	40—55	3.—	25.—	—
» Ellwangeriana aurea Späth	20—30	2.—	—	—
Zierliche Zwergform von hellgoldgelber Färbung und gedrun-gen rundlichem Wuchs.				
	40—55	4.—	—	—
» Ellwangeriana Rheingold Vollert	20—30	2.—	—	—
Spielart von hellgoldgelber Färbung. Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.				
	40—55	4.—	—	—
» erecta Hesse	55—70	4.—	35.—	—
Schöne, schlank aufstrebende, dicht und fein bezweigte Form von glänzender, dunkelgrüner Färbung.				
» filiformis Beissner	20—30	3.—	—	—
Schöne und dekorative Form von gedrun-genem, kegelförmigem Wuchs mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung.				
	40—55	4.—	—	—
» Froebeli Hort.	30—40	4.—	38.—	—
Eine schöne, eirunde, gedrungene Form, die sich durch eine frischgrüne Färbung auszeichnet.				
» globosa Hort.	30—40	4.—	38.—	—
Besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen, dichtgedrängten Zweigen.				
» globosa compacta Hort.	30—40	4.—	38.—	—
Dunkelgrün belaubte Kugelform.				
» Hoveyi Hort.	40—55	3.—	25.—	200.—
Eine gedrun-gen wachsende Form von eirundlichem Wuchs. Belaubung hellgrün.				
	55—70	4.—	35.—	—
	70—85	5.—	45.—	—
» lutea Hort.	30—40	2.—	18.—	—
Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, mit prächtig gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung.				
	55—70	4.—	35.—	—
	70—85	5.—	45.—	—
	85—100	6.—	55.—	—

Thuya (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
occidentalis Ohlendorffi Beissn (Th. occ. Späthi <i>P. Smith</i>).....	40—55	4.—	—	—
Eigentümliche, monströse Form, von aufstrebendem Wuchs. Zweige oft fadenförmig mit vierreihigen, dicht schuppenförmigen, scharf zugespitzten Blättern besetzt.				
» pendula Hort.	40—55	3.—	—	—
Sehr dekorative Form mit stark abwärtshängenden Ästen und Zweigen.	200—225	25.—	—	—
» recurva Hort.	100—120	8.—	—	—
Eigentümlich gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweigspitzen.				
» Riversi Hort.	40—55	3.—	25.—	—
Schlank und gedrungene wachsende Pflanze mit gelblichgrüner Belaubung.	55—70	4.—	35.—	—
	70—85	5.—	45.—	—
	100—120	8.—	—	—
	120—140	10.—	—	—
» Rosenthali Ohlendorff	30—40	2.—	18.—	—
Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	40—55	3.—	25.—	200.—
	55—70	4.—	35.—	—
» Späthi P. Smith , siehe Ohlendorffi				
» umbraculifera Beissner	20—30	4.—	35.—	—
Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrundem Wuchs.				
» var. Waxen Arnold Arb.	100—120	8.—	—	—
Zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung von grünlichgelber Färbung.				
» Vervaeana V. Geert	40—55	3.—	25.—	200.—
Breit pyramidale Form mit feiner, leichter Bezweigung. Die sommerliche, gelbliche Färbung geht im Winter in ein schönes Goldbronze über.	55—70	4.—	35.—	—
	70—85	5.—	45.—	—
	85—100	6.—	55.—	—
	100—120	8.—	75.—	—
» Wagneri Froeb.	30—40	2.—	18.—	—
Bildet ganz regelmässige, dichtgeschlossene Pyramiden mit sehr feiner Bezweigung.				
» Wareana Hort.	30—40	2.50	20.—	—
Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungener Wuchs. Unstreitig eine der wertvollsten Formen.	40—55	3.—	25.—	200.—
	70—85	5.—	45.—	—
	85—100	6.—	55.—	—
	100—120	8.—	—	—
» Wareana lutescens Hesse	70—85	5.—	—	—
Wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung.	85—100	6.—	55.—	—
	100—120	8.—	75.—	—
plicata Don. Gefalteter Lebensbaum	30—40	2.—	18.—	—
Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahestehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung.				
» pyramidalis Hort.	40—55	3.—	25.—	—
Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.	55—70	4.—	35.—	—
	70—85	5.—	45.—	—
Standishi Carr. (Thuyopsis Standishi Gord.)	30—40	3.—	28.—	—
Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelbgrüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.	40—55	4.—	—	—
Thuyopsis Sieb. & Zucc. Hibalebensbaum (Cupressineae).				
dolabrata S. & Z.	30—40	2.—	18.—	—
Bildet ebenmässige, breit pyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hellgrüne Belaubung ein interessantes Aussehen erhalten.				

Torreya Arn. (Taxaceae.)**californica Torr.** (T. Myristica). Kalifornische Torreya.

Baum von etwa 20 m Höhe mit pyramidalen bis runder Krone. Äste quirlförmig absteigend. Blätter steif lederartig, scharf zugespitzt, von glänzend dunkelgrüner Färbung.

Tsuga Carr. Hemlocks- oder Schirlingstanne. (Abietineae.)**canadensis Carr.** Kanadische Hemlockstanne.

Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Verzweigung.

canadensis albo-spicata Hort.

Zierliche Form mit weißen Zweigspitzen. Die aller schönste bunte, von großem Effekt.

» **macrophylla Hort.**

Rasch und üppig aufwachsende, dekorative Form.

» **minima Hesse.**

Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmaler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.

» **(Sargentii) pendula Hort.**

Eine sehr dekorative, dicht wachsende Form mit stark hängenden Ästen und Zweigen.

caroliniana Engelm.

Mittelhoher bis kleiner Baum mit ausgebreiteten Ästen und leicht überhängenden Zweigen. Die dichtgestellten, dunkelgrünen Blätter sind 23 mm lang und 2 mm breit.

diversifolia Maxim.

Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte, japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht überhängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkelgrün glänzenden Nadeln dicht besetzt sind.

Mertensiana Carr. Westamerikanische Hemlockstanne.

Im Vaterlande bis 60 m hoch werdender Baum, der nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit, sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner Raschwüchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.

Wellingtonia, siehe Sequoia.

Höhe in Zentimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
70—85	6.—	—	—
85—100	8.—	75.—	—
100—120	10.—	90.—	—
120—140	12.—	110.—	—
30—40	3.—	28.—	—
55—70	8.—	75.—	—
100—120	15.—	—	—
120—140	20.—	—	—
100—120	12.—	—	—
55—70	8.—	75.—	—
70—85	10.—	95.—	—
85—100	12.—	—	—
100—120	15.—	140.—	—
120—140	20.—	—	—
20—30	2.—	18.—	—
70—85	10.—	90.—	—
85—100	12.—	110.—	—
40—55	4.—	35.—	300.—
70—85	8.—	75.—	—
85—100	10.—	95.—	—
100—120	12.—	110.—	—
120—140	15.—	—	—

Rauchharte Nadelhölzer.

Für Industriegegenden erprobt.

Ziemlich hart.**Abies arizonica.****Chamaecyparis Lawsoniana.**» **Laws. Fraseri.**» **» glauca.**» **» robusta.**» **nutkaënsis glauca.**» **pisifera filifera.**» **» plumosa.**» **» squarrosa.****Larix europaea.**» **» leptolepis.****Picea alba.**» **» Omorica.****Pinus Cembra.****Pseudotsuga Douglasi**
glauca.**Taxodium distichum.****Taxus baccata Dovastoni.**» **brevifolia.**» **» cuspidata.****Thuja occidentalis.**» **» filiformis.**» **» lutea.**» **» recurva nana.****Thuyopsis dolabrata.****Juniperus Sabina.**» **» virginiana.**» **» glauca.****Picea Engelmanni.**» **» pungens.****Pinus Laricio austriaca.**» **» montana.****Taxus baccata.**» **» » fastigiata.****Thuja occidentalis Bodmeri.**» **» » compacta.**» **» » Ellwangeriana.**» **» » aurea.**» **» » globosa.**» **» » Hoveyi.**» **» » Vervaeana.**» **» » Wareana.**Besonders hart.**Abies concolor.**» **» nobilis glauca.****Juniperus chinensis.**» **» communis.**

Beim Auftreten unbekannter

Pflanzen - Schädlinge **und -Krankheiten**

sowie zwecks Beratung beim Kampf gegen alle Pflanzenfeinde wende man sich an die

**Biologische Reichsanstalt für Land-
und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem,**

Königin - Luise - Strasse 19,

und ihre Zweigstellen in den einzelnen Provinzen; für die Provinz Hannover die „Hauptstelle für Pflanzenschutz der Landwirtschaftskammer für die Provinz Hannover“, Göttingen, Nikolausberger Weg 7.

Auf die wertvollen Flugblätter dieser Anstalten sei hier besonders hingewiesen. Sie umfassen weite Gebiete der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung und sind zu geringem Preis bei den angegebenen Stellen erhältlich.

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
	100 Kg.	5000 Kg.	10 000 Kg.		100 Kg.	5000 Kg.	10 000 Kg.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Aachen	5.31	90.—	150.—	Eydtkuhnen transito ..	10.08	168.—	280.—
Allenstein	9.73	162.—	270.—	Falkenberg b. Torgau ..	7.28	122.50	204.—
Altenbeken	4.54	78.—	130.—	Flensburg	6.23	105.—	175.—
Altenburg	7.47	125.50	209.—	Frankfurt a. M.	6.82	115.—	181.—
Arnswalde	8.22	137.50	229.—	Frankfurt a. O.	7.56	127.—	211.—
Aschaffenburg	7.05	118.50	198.—	Freiburg (Breisgau) ..	8.86	148.—	246.—
Aschersleben	6.17	104.50	174.—	Freilassing	9.67	161.50	269.—
Augsburg	9.18	152.50	254.—	Friedrichshafen(Baden)	9.40	157.—	261.—
Bad Blankenburg i. Th.	7.38	124.—	206.—	Fulda	6.85	115.—	191.—
Baden-Baden	8.24	138.—	230.—	Furth i. Wald	9.29	154.50	258.—
Bamberg	8.29	139.—	231.—	Gera (Reuss)	7.60	127.50	213.—
Barmen	4.39	75.—	125.—	Glatz	9.33	155.50	259.—
Bayreuth	8.50	142.—	236.—	Gleiwitz	9.63	160.50	268.—
Bebra	6.27	106.—	176.—	Glogau	8.65	144.—	240.—
Belzig	6.70	112.50	188.—	Görlitz	8.43	140.50	234.—
Berlin	6.71	112.50	188.—	Göttingen	5.50	93.—	155.—
Beuthen (O.-Schl.) ..	9.65	160.50	268.—	Goslar	5.30	90.—	150.—
Bielefeld	3.89	67.50	113.—	Gotha	6.76	113.50	189.—
Blankenburg i. H.	6.32	106.50	178.—	Gronau i. W.	2.77	49.—	81.—
Bochum	3.89	67.50	113.—	Guben	7.98	133.50	223.—
Bodenbach i. Böhmen ..	8.46	141.—	235.—	Güstrow	6.28	106.—	176.—
Bonn a. Rh.	5.20	88.50	148.—	Gütersloh	3.75	65.50	109.—
Braunschweig	4.87	83.50	139.—	Hadersleben	5.78	97.50	163.—
Bremen	2.28	40.50	68.—	Hagenow	5.19	88.—	146.—
Breslau	9.15	152.50	254.—	Halberstadt	5.80	98.50	164.—
Cassel	5.64	95.50	159.—	Halbstadt	9.18	152.50	254.—
Chemnitz	7.82	131.50	219.—	Halle a. d. S.	6.74	113.50	189.—
Coblenz	5.89	100.—	166.—	Hamburg	4.01	69.—	115.—
Coburg	7.91	133.—	221.—	Hameln	4.43	76.—	126.—
Cöln a. Rh.	4.86	82.50	138.—	Hamm i. W.	3.42	60.—	100.—
Cottbus	7.82	131.50	219.—	Hannover	4.10	70.50	118.—
Crefeld	4.23	73.—	121.—	Heide i. Holst.	5.59	94.50	158.—
Cüstrin	7.54	126.—	210.—	Heidelberg	6.69	112.50	188.—
Cuxhaven	3.89	67.50	113.—	Heilbronn	8.05	135.—	225.—
Darmstadt	7.08	118.50	198.—	Hildesheim	4.62	79.—	131.—
Dessau	6.48	109.—	181.—	Hirschberg i. Schl.	8.88	148.—	246.—
Dortmund	3.84	67.—	111.—	Hoyerswerda	7.93	133.—	221.—
Dresden	7.93	133.—	221.—	Ingolstadt	9.08	151.—	251.—
Düsseldorf	4.24	73.—	121.—	Insterburg	9.97	166.—	276.—
Eberswalde	7.15	120.—	200.—	Iserlohn	4.12	71.50	119.—
Eger (Böhmen)	8.56	142.50	238.—	Jena	7.33	123.—	205.—
Einbeck	5.18	88.—	146.—	Johannisburg	9.91	165.—	275.—
Elbing	9.61	160.—	266.—	Jüterbog	7.08	118.50	198.—
Emmerich	4.15	71.50	119.—	Kaiserslautern	7.31	122.50	204.—
Erfurt	6.93	116.50	194.—	Karlsruhe	8.01	134.50	224.—
Essen	3.94	68.50	114.—	Kempen (Rhein)	4.38	75.—	125.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	5000	10000		gut	5000	10000
	100 Kg.	Kg.	Kg.		100 Kg.	Kg.	Kg.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Kiel	5.43	92.50	154.—	Osnabrück	3.—	52.50	88.—
Königsberg (O.-Pr.)	9.82	163.50	273.—	Osterode a. H.	5.49	93.—	155.—
Köslin	8.85	147.—	245.—	Passau	9.55	159.—	265.—
Kolberg	8.64	144.—	240.—	Plathe	8.26	138.—	230.—
Konstanz	9.35	155.50	259.—	Plauen i. V.	8.06	135.—	225.—
Korschen	9.85	164.50	274.—	Pritzwalk	5.87	99.—	165.—
Kreienzen	5.04	85.50	143.—	Quakenbrück	2.52	45.—	75.—
Kreuz	8.35	139.50	233.—	Ratibor	9.63	160.50	268.—
Kreuzburg (Oberschl.)	9.48	157.50	263.—	Rastenburg	9.87	164.50	274.—
Kufstein	9.64	160.50	268.—	Regensburg	9.13	151.50	253.—
Kulmbach	8.27	138.—	230.—	Reutlingen	8.77	146.50	244.—
Landsberg (Warthe)	7.93	133.—	221.—	Riesa	7.60	127.50	213.—
Landshut i. Bay.	9.37	156.—	260.—	Rostock	6.46	109.—	181.—
Langensalza	6.54	110.50	184.—	Rottweil	8.92	148.50	248.—
Leipzig	7.09	118.50	198.—	Sagan	8.25	139.50	233.—
Liegnitz	8.82	147.—	245.—	Salzburg	9.68	161.50	269.—
Lindau	9.49	157.50	263.—	Sangerhausen	6.48	109.—	181.—
Lippstadt	4.05	70.—	116.—	Sassnitz	7.64	128.50	214.—
Lübben	7.48	125.50	209.—	Schleswig	5.81	98.50	164.—
Lübeck	4.91	83.50	139.—	Schneidemühl	8.74	145.50	243.—
Lüneburg	4.10	70.50	118.—	Schweinfurt	7.95	133.—	221.—
Luckenwalde	7.20	121.—	201.—	Schwerin i. M.	5.49	93.—	155.—
Lyck	10.01	166.50	278.—	Siegen	5.30	90.—	150.—
Magdeburg	5.81	98.50	164.—	Singen	9.25	154.—	256.—
Mainz	6.86	115.50	193.—	Sorau	8.26	138.—	230.—
Mannheim	7.50	125.50	209.—	Stargard i. Pom.	7.98	133.50	223.—
Marburg (Lahn)	5.36	100.50	168.—	Stendal i. Pom.	5.54	94.—	156.—
Marienburg i. Westpr.	9.56	159.—	265.—	Stettin	7.68	128.50	214.—
Meiningen	7.31	122.50	204.—	Stolp i. Pom.	9.19	153.—	255.—
Memmingen	9.23	153.—	255.—	Stralsund	7.20	121.—	201.—
Meppen	1.41	27.—	45.—	Stuttgart	8.40	140.50	234.—
Minden i. W.	3.99	69.—	115.—	Swinemünde	7.91	133.—	221.—
Mittelwalde	9.45	157.50	263.—	Templin	7.14	120.—	200.—
Mühlhausen i. Th.	6.36	107.50	179.—	Tilsit	10.05	167.50	279.—
München	9.40	156.—	260.—	Torgau	7.21	121.—	201.—
Münster i. W.	2.86	50.50	84.—	Trier	6.84	115.—	191.—
Naumburg (Saale)	7.19	121.—	201.—	Tübingen	8.82	147.—	245.—
Neumünster	5.06	86.50	144.—	Uelzen	4.15	71.50	119.—
Neustettin	8.84	147.—	245.—	Ulm	8.96	149.50	249.—
Neustrelitz	6.62	112.—	186.—	Waren i. Meckl.	6.45	109.—	181.—
Nordhausen	6.08	103.—	171.—	Warnemünde	6.58	111.—	185.—
Nürnberg	8.63	144.—	240.—	Weimar	7.13	119.50	199.—
Oberhausen	3.84	67.—	111.—	Wetzlar	6.—	101.50	169.—
Oderberg	9.68	161.50	269.—	Wesel	3.87	67.—	111.—
Offenbach a. M.	6.90	116.50	194.—	Wittenberge	5.44	92.50	154.—
Oldenburg i. O.	1.53	28.50	48.—	Würzburg	7.84	131.50	219.—
Oldenburg i. H.	5.86	99.—	165.—	Ziegenhals	9.50	158.50	264.—
Oppeln	9.46	157.50	263.—	Zittau	8.59	143.50	239.—

Angaben ohne Verbindlichkeit.

P. P. Um den wiederholt geäußerten Wünschen meiner geschätzten Kundschaft nachzukommen, halte ich ständig nachfolgend aufgeführte Werke der einschlägigen Fachliteratur auf Lager, die das Beste darstellen, was es bis heute auf diesen Gebieten gibt. Ich bin in der angenehmen Lage, die Werke zu nachstehend verzeichneten Originalpreisen zu liefern und werde auf sorgfältige Verpackung besonderen Wert legen, um tadellose Ankunft zu gewährleisten.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde

von Silva Tarouca und Camillo Schneider

Ausführlichen Prospekt auf Wunsch kostenlos

- Band I: **Unsere Freiland-Stauden**, 451 schwarze, 23 farbige Abbildungen. M. 14.—.
- „ II: **Unsere Freiland-Laubgehölze**, 499 schwarze, 27 farbige Abbildungen. M. 16.—.
- „ III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer**, 319 schwarze, 14 farbige Abbildungen. M. 12.—.

Bücher der Gartenschönheit

Ausführlichen Prospekt auf Wunsch kostenlos

- Band I: **Vom Blütengarten der Zukunft** von Karl Förster 128 Seiten großes Format mit 75 schwarzen und 25 farbigen Bildern. Neueste Auflage. M. 7.50.
- „ II: **Das Rosenbuch** von Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, mit Beiträgen von Karl Förster und Paul Landau. 136 Seiten großes Format mit zahlreichen schwarzen und farbigen Bildern. M. 7.50.
- „ III: **Einjahrsblumen** von Paul Kache und Camillo Schneider. Gehaltvolle Übersichten, eingehende praktische Hinweise und zahlreiche schwarze und farbige Blumenporträts. M. 10.—.
- „ IV: **Immergrüne Laubgehölze**, Erfahrungen in Malonya von Josef Mišák, Mitarbeiter des Grafen Istvan Ambrózy-Migazzi bei der Schaffung des einzigen immergrünen Parkes Mitteleuropas in Malonya. 80 Seiten auf holzfreiem Kunstdruckpapier mit 50 Bildern. In Halbleinen M. 6.—.

Praktisches Lehrbuch des Obstbaues von Johannes Böttner. 7. Auflage, mit 553 Abbildungen. M. 8.—.

Hecken- und Randpflanzungen in Forst- und Landwirtschaft, nebst praktischer Unterweisung und der Vernehrungsart des verwendeten Pflanzenmaterials von Hans Schmidt, staatlich dipl. Gartenbauinspektor, Dessau, D. W. B., V. d. G. 60 Seiten mit 11 Abbildungen, broschiert M. 2.—.

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Lieferungsbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark, 1 Reichsmark = $\frac{10}{42}$ U.S.A. Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Jeder Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er durch Drucksache oder Brief bestätigt ist; bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht massgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei der dem Lieferant überlassenen Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Gegenwertes geliefert.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ich bitte, für Geldsendungen mein Postscheckkonto (Hannover No. 1342) zu benutzen. Banküberweisungen erbitte an die Spar- und Leihkasse in Weener (Ems) oder an die Ostfriesische Bank, Zweiganstalt der Osnabrücker Bank in Weener (Ems).
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung in der Ordnung des Einlaufens besorgt. Während der Hauptversandzeit werden Nachbestellungen als neue Aufträge behandelt und finden demgemäss ihre Erledigung.
2. Für auf dem Versandweg durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Sollte durch irgendwelche Umstände wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügungen usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.
4. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.
5. Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf deutschen Bahnen werden als Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 kg und eine Länge von $3\frac{1}{2}$ m nicht überschreiten; bei Aufgabe als Wagenladungen ohne diese Beschränkung.

Bei den besonderen Vorschriften für bestimmte Gegenstände ist besonders folgender Absatz zu beachten: Werden Gegenstände von mehr als 7 m Länge als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbriefsendung die Fracht für mindestens 1500 kg nach dem Satze der allgemeinen Stückgutklasse bzw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder (bei Beförderung als Eilgut) nach dem Eilgutfrachtsatz berechnet.

6. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlohne berechnet.

Gewährleistung.

1. Gewähr für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt. Bei solchen Ersatzforderungen muss der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.
3. Gewähr für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

Beschwerden und Ersatz.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
3. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist. Dies ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, und die Stückzahl der einzelnen Sorten über zehn nicht hinausgeht.

Muster und Maße.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versandes sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Bei telephonisch erteilten Aufträgen muss ich jede Verantwortung infolge der Möglichkeit von Hörfehlern ablehnen und bitte daher stets schriftliche Bestätigung des Gesprächs alsbald folgen lassen zu wollen.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne

hochachtungsvoll

Weener, im September 1926.

Herm. A. Hesse,

Baumschulen, Weener (Ems).

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)